



Ch. XV
Malacca 10/11/1791
Officer
Sutano 1791

15. 3. 268.

LA ESPLORAZIONE
PROPOSTA COME FONDAMENTO
DELL' ARTE OSTETRICA

DA D. VINCENZO MALACARNE SALUZZESE
R. PUBBL. PROFESS. DI ISTITUZIONI CERUSICHE,
E DI OSTETRICIA, DECANO DELLA FAC. MEDICA
NELLA REGIA IMPERIALE UNIVERSITA' DI PAVIA,
CERUSICO PENSIONARIO DI SUA MAESTA' SARDA,
MEMBRO DELLE ACCADEMIE ITALIANA DI VERONA,
DI CORTONA, DI FOSSANO, DI PAVIA, DI TORINO,
E DELLA R. I. GIOSEFFINA MED. CERUSICA DI VIENNA

COLL' INDICE

DELLE DIMOSTRAZIONI, CHE SI FANNO
NELLA SCUOLA PRATICA DELLA ARTE OSTETRICA
ERETTA NELLA MEDESIMA REGIA UNIVERSITA'



MILANO MDCCXCI.

NELLA STAMPERIA DI GIACOMO BARELLE



1. 1. 1.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

100

4

—

$$f_{\text{max}} = 2.5 \times 10^4 \text{ Hz}$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

A SUA ALTEZZA REALE
IL SERENISSIMO ARCIDUCA
FERDINANDO DI AUSTRIA
PRINCIPE REALE DI UNGHERIA
E DI BOEMIA
DUCA DI BORGOGNA E DI LORENA
GOVERNATORE E CAPITANO GENERALE
DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA

A L T E Z Z A R E A L E .

*Il favore, che V. A. REALE si degn
di compartirmi coll' accogliere sotto i R.
Auspicii suoi questo mio lavoro appartenente
alla Scuola Pratica tanto necessaria dell' Arte
Ostetricia , è di valor così grande , che non*

ò termini per esprimerne come pure vorrei
l'ossequiosa mia gratitudine : Supplico perciò
umilmente l'*A. V. REALE* di aggradire
il mio buon volere , e il vivo desiderio che
nudirisco di potere col zelo , e l'assiduità
nell' adempimento de' miei doveri , meritar
la Protezione della *R. A. VOSTRA* per
me , e per la mia famiglia .

Da questa soavissima speranza animato ,
e per tanta *SUA* degnazione , e clemenza
consolatissimo , ò l'onore d' essere col più
profondo rispetto

Della *REALE ALTEZZA VOSTRA*

Umilmo Devmo ed Obbmo Servidore
Vincenzo Malacarne .

TAVOLA DE' CAPI PRINCIPALI.

V

I ntroduzione	pag. 1
Parte prima, in cui si contiene una breve descrizione degli <i>Organi Genitali Femminili</i> d'intorno a' quali s'aggira l' <i>Esplorazione</i>	7
Le <i>Ossa</i> , e le <i>Cartilagini</i> dalla union delle quali risulta il <i>Catino Femminile</i>	8
Le ossa, delle quali è formato il <i>Catino</i>	8
L'osso <i>Ilio</i> , e i difetti a' quali va soggetto	10
L'osso <i>Pube</i> , e i vizii a' quali va esposto	11
L'osso <i>Ischio</i> , e i suoi difetti	12
Le due <i>Vertebre inferiori de' Lumbi</i> , e i difetti loro	13
L'osso <i>Sacro</i> , e i suoi difetti	14
Il <i>Coccige</i> naturale, e difettoso	15
I <i>Ligamenti</i> , e le <i>Cartilagini</i> del <i>Catino</i>	15
Vantaggi, risultanti dal rilassamento delle unioni del <i>Catino Femminile</i> al fin della <i>Gravidanza</i>	16
Vantaggi, che per il <i>Parto</i> ridondano dalla struttura, e figura del <i>Catino Femminile</i> dal <i>Maschile</i> diversa	17
Sezioni, in cui è stato diviso dagli <i>Ostetricanti</i> l'interior del <i>Catino</i> , perchè riesca più chiara l'esposizione di quanto concerne l' <i>Esplorazione</i> , e il <i>Parto</i>	18
<i>Sezione Scema</i> , o <i>Superiore</i>	19
Larghezza della <i>Sezione Scema</i>	19
La <i>Sezione Inferiore</i> , o sia <i>Esecavazione</i> , e le sue dimensioni	20
Lo <i>Stretto inferiore</i>	21
Parti molli, che occupan la cavità del <i>Catino Femminile</i>	22
Nomi degli <i>Organi Genitali Femminili</i> tanto esteriori, quanto interiori	23
<i>Organi Genitali esteriori</i> , e prima il <i>Pettignone</i>	24
La <i>Vulva</i>	24

VI

Le <i>Grandi Labbra</i> , e le <i>Commessure della Vulva</i>	25
Il <i>Perinéo</i> , la <i>Forchetta</i> , la <i>Fossa Naviculare</i> , e il <i>Raffe</i>	25
<u>L' <i>Ano</i></u>	26
<u>Le <i>Ninfe</i></u>	27
<u>La <i>Clitòride</i></u>	28
<u>L' <i>Orificio dell' Uretra</i></u>	29
La <i>Imene</i>	29
Le <i>Atrète</i> , o sia <i>Imperforate</i>	30
Le <i>Caruncule Mirtiformi</i>	30
La <i>Vagina</i>	31
Gli <i>Organi Genitali Interiori</i> , e prima l' <i>Utero</i>	35
La <i>Cavità del Collo dell' Utero</i>	37
Quattro <i>Caratteri del Collo</i> , e della <i>Bocca dell' Utero</i> , da' quali si rilèva se la Donna sia <i>Gravida</i> , o no	38
<u>Effetti del <i>Parto</i> relativi a' caratteri suddetti</u>	38
<u><i>Vasi</i>, e <i>Nervi dell' Utero</i>, e della <i>Vagina</i></u>	39
<u>I <i>Ligamenti dell' Utero</i></u>	40
<u><i>Ligamenti larghi</i></u>	41
<u>Quattro <i>Ligamenti Rotondi principali</i></u>	42
<u>Due <i>Ligamenti larghi anteriori inferiori</i></u>	43
<u>Le <i>Trombe Falloppiane</i></u>	43
Le <i>Ovaja</i>	45
La <i>Esplorazione</i> , e il metodo di farla	47
<i>Avvedutezza</i> , e <i>Probità</i> necessarie all' <i>Esploratore</i> specialmente in otto circostanze	48
Come si perfezioni l' <i>Esploratore</i>	49
Tre attenzioni, che rendono utile la <i>Esplorazione</i>	50
<u>Metodo di <i>Esplorare</i></u>	50
<i>Fecondità</i> , e <i>Sterilità</i> in generale	51
la <i>Fecondità</i> , e la <i>Fecondazione</i>	52
Se si diano indizi, che assolutamente <i>Feconda</i> sia una Donna, o assolutamente <i>Sterile</i>	53
Della <i>Sterilità</i> nelle Donne <i>Congénita</i> , o <i>Accidentale</i> , e delle cagioni d'essa	55
<u>Di tre specie di <i>Sterilità</i> nella Donna</u>	45

<u>Sterilità Assoluta</u>	54
<u>Sterilità Relativa</u>	54
<u>Sterilità Possibile</u>	55
Vantaggi, che si traggono dall' esame delle circostanze esposte	55
<u>Il Concepimento</u>	56
Indizi Fisiologico-Parologici del <u>Concepimento</u>	56
Indizi confermantì il <u>Concepimento</u>	58
Della <u>Gravidanza</u>	59
Prima Classe degli Indizi della <u>Gravidanza</u>	59
Indizi della seconda Classe tratti dalla <u>Esplora- zione</u>	60
<u>Come si riconosca che una Pulcella è tuttavia Vergine</u>	60
Segni, che la Pulcella è <u>sforata</u>	61
Indizi dell' <u>Aborto procurato</u> , o del <u>Feto nascosto</u>	62
Parte seconda, che s' aggira intorno a tutto quel- lo, che la <u>Esplorazione</u> medesima è atta a ma- nifestare nelle <u>Gravide</u> , nelle <u>Partorienti</u> , e nelle <u>Puerpere</u> , eseguita con le necessarie av- vertenze	65
Tre oggetti principali per cui si fa l' <u>Esplora- zione</u> nella <u>Donna Gràvida</u>	65
Che cosa l' <u>Esplorazione</u> c' insegna dal principio al terzo mese della <u>Gravidanza</u>	66
<u>Moderazione necessaria tanto negli Ostetricanti quanto nelle Mammare</u>	67
Elezione del tempo, e del modo d' <u>Esplorare</u> a tal epoca	67
Quattro indizi di <u>Gravidanza</u> meno equivoci	68
Che cosa insegna dal terzo mese al quinto l' <u>Esplora- zione</u>	69
Spiegazione d' alcuni de' sintomi della <u>Gravidanza</u> a tal epoca	70
Utilità dell' <u>Esplorazione</u> dal quinto mese al tèr- mine della <u>Gravidanza</u>	71
Riflessioni sù i movimenti del <u>Feto</u> nell' <u>Utero</u>	72

VIII

Quando sia più utile <i>Esplorar</i> la Donna ritta in piedi	73
Serie più distinta de' segni della <i>Gravidanza</i> dedotti dalla <i>Esplorazione</i> di mese in mese, e specialmente dal quarto al <i>Parto</i>	74
Se il <i>Feto</i> faccia il <i>Capitomblo</i> nel settimo mese	75
Indizi dell' <i>Imminenza</i> del <i>Parto</i> tratti dalla <i>Esplorazione</i>	76
Fallacia di tali indizi	77
Quattro argomenti onde eluder la fallacia suddetta, e quella di sei altri indizi più prossimi del <i>Parto</i>	77
La <i>Retroversione</i> , e l' <i>Antiversione</i> dell' <i>Utero</i> in generale	79
La <i>Retroversione</i> dell' <i>Utero</i> in particolare	79
<i>Retroversione</i> perfetta e la imperfetta	82
<i>Retroversione</i> parziale	83
Segni della <i>Retroversione</i> principiante	84
Sintomi della <i>Retroversione</i> confermata	84
Effetti funesti della <i>Retroversione</i>	85
Notizie, che ne dà la <i>Esplorazione</i>	86
Prognosi della <i>Retroversione</i>	87
Metodi più opportuni di curarla	89
Quattro cose, che comprendonsi nella <i>Ricomposizione</i> dell' <i>Utero</i> retroverso	89
Ostacoli, che vi si oppongono, e maniera d'evitarli	90
Come si mantenga ricomposto l' <i>Utero</i>	92
Se la <i>Sinfiseotomia</i> al <i>Pube</i> , e la <i>Paracentesi</i> dall' <i>Utero</i> convengono nella <i>Retroversione</i> insuperabile	93
Battesimo nell' <i>Utero</i> retroverso	94
<i>Antiversion</i> della <i>Matrice</i>	94
Quali Donne vi siano soggette	95
Indizi esteriori dell' <i>Antiversione</i>	95
Indizi somministrati dalla <i>Esplorazione</i> per la <i>Vagina</i>	96

Sintomi dell' <i>Antiversione</i>	96
Altri indizi tratti dalla <i>Esplorazione</i>	97
Tre consigli , che l' <i>Osteiricante</i> può dare nella <i>Antiversione</i>	97
Come s' impedisca nelle <i>Puerpere</i>	98
Come si rimedii all' <i>Antiversione</i> esistente	98
Danni , che posson recare gli strumenti duri	99
Come si minorino gli effetti dell' <i>Antiversione</i>	99
Otto Motivi per cui si fa l' <i>Esplorazione</i> nel tem- po del <i>Parto</i>	100
Denominazione delle diverse specie de' <i>Parti</i>	100
Moderazione indispensabile all' <i>Esploratore</i> nel <i>Parto</i>	101
Motivo I. Conoscere lo stato delle <i>Parti Genita-</i> <i>li</i> , e delle <i>Secondine</i>	102
Quali rimedii possa usar l' <i>Esploratore</i> nelle an- gustie morbose delle <i>Parti Genitali</i>	103
Osservazioni intorno alle <i>Procidenze</i>	103
Come si conoscano , e vi si rimedii	104
Come l' <i>Esplorazione</i> indichi i vizii della struttura del <i>Catino</i>	105
Motivo II. Assicurarsi della buona , o rea dire- zione della <i>Matrice</i>	106
Osservazioni intorno alle varie situazioni , e dire- zioni della <i>Matrice</i> nella <i>Imminenza del Parto</i>	107
Motivo III. Distinguer la qualità delle <i>Doglie</i> , e dedurne la <i>prestezza</i> , o la <i>lentezza del Parto</i>	108
Effetti delle <i>Doglie vere</i>	109
<i>Parto natural felice</i>	110
Altre osservazioni sulle <i>Doglie vere</i>	110
<i>Doglie vaghe e false</i>	111
<i>Doglie</i> , che si debbono calmar coll'Arte nel fine della <i>Gravidanza</i>	111
<i>Doglie</i> che, nel <i>Parto</i> stesso debbonsi calmare	112
Otto notizie rilevantissime , che si ricavano per mezzo dell' <i>Esplorazione</i> in tempo del <i>Parto</i>	113
Prognosi del <i>Parto Felice</i> , e <i>Pronto</i>	114

X

Prògnosi del <i>Parto Lungo</i> , e <i>Laborioso</i>	114
Motivo IV. Convincerci che il <i>Parto</i> è <i>Non-naturale</i>	115
Prògnosi tratta dalla <i>Borsa delle Acque</i>	115
Prògnosi tratta dalle diverse parti del <i>Feto</i> , che l' <i>Esploratore</i> distingue	116
Motivo V. Ricavarne se il <i>Feto</i> sia <i>Unico</i> , <i>Gemello</i> , o <i>Multiplice</i>	117
Quattro maniere di presentarsi i <i>Feti Multiplici</i> al dito dell' <i>Esploratore</i>	118
Indizi della <i>multiplicità de' Feti</i>	118
Dopo l'uscita d'un <i>Feto</i> , <i>indizi</i> positivi dell' esistenza d'un altro uella <i>Matrice</i>	120
<i>Feti Gemelli</i> , che si presentano ad un tratto nell' orificio dell' <i>Utero</i>	121
Motivo VI. Dedurne se il <i>Feto</i> sia bene, o mal situato	122
Sei <i>Situazioni</i> , che nel <i>Parto</i> può prendere la testa, o qualsivoglia altra parte del <i>Feto</i>	123
Precetti pratici, che in casi simili dedùconsi dalla <i>Esplorazione</i> ben eseguita	124
<u>Per la situazione della <i>Fronte</i></u>	124
<u>Per la situazione del <i>Mento</i></u>	124
<u>Per la situazione delle <i>Tempie</i></u>	125
<u>Per la situazione della <i>Nuca</i></u>	126
<u>Per lo presentarsene altre parti del <i>Capo</i></u>	126
<u>Per lo presentarsene le <i>Mani</i></u>	126
<u>Per lo presentarsene il <i>Gomito</i>, o il <i>Ginocchio</i></u>	128
<u>Indizi della <i>Cangrena</i> delle membra che il <i>Feto</i> presenta all' orificio dell' <i>Utero</i></u>	128
<u><i>Feto Avversato</i></u>	129
<u><i>Torcio Umbilicale</i>, che precede il <i>Feto</i></u>	130
<u>Indizi delle varie parti del <i>Tronco</i>, che si presentano all' orificio dell' <i>Utero</i></u>	130
<u>Qual <i>Fianco</i> prescurisi dal <i>Feto</i></u>	130
<u>Qual <i>Anca</i>, e qual <i>Natica</i></u>	131
<u>Il presentarsi dell' <i>Ano</i></u>	132

Il presentarsi d' una Spalla	132
Motivo VII. Rilevarne se il <i>Feto</i> sia vivo . . .	132
Dodici cagioni principali della morte del <i>Feto</i> nell' Utero	132
Dieci indizi più frequenti di tal morte . . .	133
Cinque indizi più prossimi	134
Altri tre indizi ancora più prossimi tratti dal <i>Feto</i> <i>medesimo</i>	134
Cautete, e riguardi nell'applicazion degli stru- menti, anche posti tutti gli indizi mentovati .	135
Motivo VIII. Discernere gli ostracoli, o i danni a' quali dan luogo le <i>Secondine</i>	135
Come si condisca la sovrèchia robustezza delle <i>Membrane</i> , e come vi si rimèdii	136
Indizi della <i>Placenta</i> sbarbicatasi troppo presto .	136
Indizi delle <i>Secondine</i> già discèsc nella Vagina e nella Escavazione del Catino	138
Diagnosi, e cura dello <i>Sirangolamento</i> delle ac- cartocciate <i>Secondine</i> , affacciatesi al collo dell' Utero contratto	138
Indizi dell' <i>Attaccamento Laterale della Placenta</i> .	140
Gozzi della <i>Matrice</i> come si formino, e come se ne preservi dall' <i>Incarceramento</i> la <i>Placenta</i> .	141
Cura di questo serio accidente	142
Cura dell' <i>Aderenza Laterale della Placenta</i> .	143
Al volume eccessivo delle <i>Secondine</i> come si soc- corra	143
Come si conosce il <i>Rovesciamento</i> , e l' <i>Ingonia-</i> <i>mento del Fondo dell' Utero</i>	144
Come vi si rimèdii	145

Pag. 9. lin. 27. *Utero*, gràvido, leggi *Utero gràvido* = 10. 18. Feto e -- Feto; e = 16. 23. rilassamento -- rilassamento = 18. 20. renderlo -- renderla = 19. 15. dell' altro conseguentemente -- dell' altro -- conseguentemente = 20. 24. della detta falsa -- della quarta falsa = 22. 13. clitrice -- elitrice = 23. 13. , 44. 6. , 49. 14. massime -- massimamente = 28. 19. affarò -- affatto = 31. 32. che la -- che le = 35. 32. sicchè pòssano -- sicchè si pòssano = 40. 12. l'utero mantenuto -- l' *Utero* è mantenuto = 41. 4. e tale -- è tale = 42. 4. inoltrandosi -- inoltrandosi = 44. 19. e FALLOPPIA -- e il FALLOPPIA = 45. sotto la linea 12. leggasi -- Le Ovaie = 51. 1. in esso -- sia esso = 53. 16. alla destra -- alla sinistra = 54. 20. che -- che posson esser o *congenite*, o *accidentali* = 60. 26. loro -- gli = 64. 23. che lo -- che lo = 66. 6. della Donna -- delle Donne = 74. 4. de' dottì -- dedottì = 81. 1. cachèrice -- cachèriche = 81. 20. Cartshore -- Gartshore = 85. 19. XLIII. = 86. 34. a farla -- e farla = 125. 5. inoltrarla -- inoltrarla = 126. 19. futura -- sutura = IV. 9. Micidiale -- Micidiale, ognuno di essi potendo essere semplice, o composto. IV. 10. sua -- sua in Abortivo, e Precòce = IV. 12. In Impossibile -- In Isforzato, e in Impossibile = V. 35. costituzion; Vera -- costituiscon Vera = VIII. 28. strangolata -- strangolate = VIII. 34. piedi -- piedi Naturale, o sforzato = XIV. 15. inseparabile -- insuperabile = XVI. 12. costringessero -- costringesse.

INTRODUZIONE.



I. **O**gni *Levatrice*, ogni *Ostetricante* si truova ben sovente nella necessità d'assicurarsi se una *Femmina* è gràvida, o se già lo fu.

II. Tal ricerca si fa per cinque motivi principali.

Il 1. si è per appagare la giusta, e prudente curiosità del *Médico*, il quale non abbastanza istruito per pratica delle mutazioni, cui vanno soggette in circostanze così diverse le *Parti Genitali Femminili*; o per eccellenza d'educazione, e per principio di modesta civiltà, disposto a rispettar il pudore, esimio frègio del Bel Sesso, vedendosi nel frangere di dover suggerire qualche operazione, o prescrivere qualche rimedio enèrgico alla Donna, che conghiettura esser gràvida, ama mèglio lasciar la cura d'assicurarsene alle persone, che professano l'*Arte Ostetricia*.

Il 2. motivo di far tali ricerche si presenta qualora cade sospetto intorno all'esser intatta e *vèrgine*, o all'aver sofferto violenza, una zitella; ovvero intorno all'*impotenza* del maschio, al quale si vuol legare, o è stata legata in matrimonio, per darne le notizie indispensabili al Fisco, o a' Giudici, affinchè nel primo caso abbia il dovuto corso la giustizia, nel secondo si sciòlgano, o s'evitino i vincoli insussistenti, e illegittimi.

3. Altre volte la Donna medesima, o i Parenti, esigono questa certezza, allorchè si tratta d'intraprender viaggi lunghi, disastrosi; di perseverare in

esercizii faticosi ; di dar esecuzione a disposizioni testamentarie , e simili .

In 4. luogo non si dà *Parto* un po' lungo , o difficile , che non obblighi tratto tratto la *Mamma* , o l' *Ostetricante* ad informarsi col tatto della disposizione , in cui sono le vie , che il *Feto* dee percorrere , se à da venire alla luce .

5. Finalmente si fa l' *Esplorazione* , dopo l' uscita di questo per riconoscer lo stato delle *Secondine* , o dell' *Utero* voto , e delle rimanenti *Parti genitali esteriori* .

III. Simili esami , tali ricerche , affinchè riescano di vantaggio al Pubblico , o al Privato , che le esige , ed avvaldrino la perizia delle *Mammæ* , e degli *Ostetricanti* , intanto che , manifestandola già ben fondata , ridondano in decore , e gloria loro , richiedono , che tanto le une , quanto gli altri sovente richi amino alla memoria lo stato naturale delle *Parti* destinate alla *Còpula* , alla *Generazione* , alla *Gravidanza* , ed al *Parto* ; e i cangiamenti , le alterazioni , che per malattia possono avere sofferto , se àno da ravvisare sul fatto quelle , che ricondcono soltanto per cagione la *Còpula* , cioè il congiungimento del *Maschio* colla *Femmina* per la propagazione della specie , e se àno da assicurarsi della *Gravidanza* attuale , o passata .

IV. L' *Esplorazione* adunque , parte essentialissima dell' *Arte Ostetricia* , è quella ricerca , che si fa per mezzo della vista , e del tatto , sopra una *Donna* , per assicurarsi della *Verginità* , della *Sterilità* , della *Gravidanza* , delle diverse epoche di questa , dell' imminenza del *Parto* , delle circostanze , che lo accompagnano , e che lo sieguono , specialmente in riguardo agli organi , per mezzo de' quali questa funzione si compie .

V. Ella è pertanto una operazione importante , oggetti primarii della quale sono :

1. La cognizione esatta della figura, e della disposizione degli organi femminili destinati

Alla Copula; alla Concezione;
Alla Nutrizione; al Perfezionamento;
All' Espulsione del Feto:

2. La notizia adeguata della figura, e delle qualità naturali di tutte le membra, di tutte le parti esteriori del *Feto* medesimo all'ora ch'è ancora nell' *Utero*, o quando è nell'atto d'uscirne.

3. Della struttura, e delle apparenze delle *Membrane*; in cui il *Feto* è contenuto, e di quelle, che prendono quando ne sono sgombrare.

4. Dell' esser libere tali *Membrane*, e sciolte nella cavità dell' *Utero*, o nella *Vagina*; o dell' essere tuttavia queste aderenti al *pariete interior della Matrice*.

5. Dell' esser questa viscera o rilassata, e arrendevole; o contratta, e ristretta intorno a tutta, o a qualche porzione soltanto delle *Secondine*, cioè delle *Membrane* suddette.

VI. *Oggetti secondarii dell' Esplorazione sono,*
La Verginità, la Deflorazione :

La *Gravidanza reale*, e la *supposta* :
La *Gravidanza naturale*, e la *preternaturale* :

Lo stato delle Parti Genitali dopo la Gravidanza reale, o supposta, ne' sospetti d'Aborto procurato, e di nascondimento, o d'uccisione del Bambino.

VII. Tutte le cose accennate sono altresì oggetto dell'*Arte Ostetricia*. Il primario e principale però relativamente a questa, consistendo nell'agevolare l'uscita opportuna del *Feto*, e delle *Secondine* dall'*Utero*, esige, che se ne conoscano le vie: perciocchè mancando l'*Ostetricante* delle cognizioni anatomiche sufficienti, rimarrassene pur troppo spesso incapace di giovare; anzi non di rado riuscirà dannoso perchè opererà temerariamente. Ma per l'*Esplorazione* non è indispensabile quella tanto profonda, e minuta

4
serie di cognizioni, che abbisogna ad un perfetto Notomista, ad un egrégio Fisidologo.

VIII. E giacchè con questo nostro discorso prendiamo soltanto in mira gli effetti della *Còpula volontaria*, o *sforzata*, il meccanismo del *Parto*, e i cambiamenti nel corpo femminile, che lo precedono, e che gli vengono dietro, sempre col medesimo connessi, per le relazioni immediate, o mediate, che passano tra questi, e quello; per conseguenza ne ricorderemo soltanto quello, che è per bastare all'uopo, senza ingombrar la memoria, nè la fantasia delle *Mammæ*, e degli *Ostetricanti* di Contàdo con una farragine di noizie allo scopo loro straniere, e capaci per avventura di generar confusione, piuttosto che atte a porger lume nè agli ultimi, nè alle prime, bisognose della semplicità, dell'ordine, e amiche della brevità, e dell'evidenza.

IX. Così appagheremo anche i più istruiti, che vedranno volentieri quest'argomento trattato con molto maggior ampiezza da noi, di quello, che nissuno fin ora abbia osato intraprendere, sebbene lo meritasse per tanti titoli.

X. Vogliamo esser brevi, e chiari: ma siccome l'*Esplorazione* riguarda specialmente le *Parti genitali femminili*, nelle quali l'*Ostetricante* dee per ordinario insinuar la punta dell'indice, o del dito mezzano, per ispiare la loro disposizione; così giudichiamo indispensabile dividere questo ragionamento in due Parti, che mettano gli *Ostetricanti*, e le *Mammæ* distintamente al fatto, delle cose opportune a sapersi.

XI. Comprenderà la prima, tutto quello, che concerne gli *organi* su i quali dee cadere l'*Esplorazione* medesima; non potendosi riconoscere alterazione in quelle parti, delle quali s'ignora la figura, la consistenza, la disposizione, e l'uso: successivamente vi si tratterà di quanto spetia al meccanismo della *Esplorazione* medesima; alla *Fecondità*; alla *Sterilità*;

5
alla *Verginità* ; alla *Deflorazione* ; al *Concepimento* , e
alla *Gravidanza* .

XII. La seconda parte instruirà l'*Ostetricante* ,
di tutto quello , che l'*Esplorazione* è capace di ma-
nifestare allorchè vien fatta nella foggia , e con le
avvertenze , e le cautèle , che si avrà cura d' espor-
re , tanto nel corso della *Gravidanza* , e nel *Parto* ,
quanto nel *Puerpério* .

XIII. Abbiamo declinato da ogni teoria , e tanto
più da ogni erudizione , affinchè riescendo minòre il
libro non ispaventi que' parchi Leggitòri , che ci au-
guriàmo , e non òbbighi a spesa notàbile i medèsimi ;
che giudichiàmo non tutti opulenti abbastauza per
impiegar senza frutto qualunque anche mèdiocre som-
ma . Riguàrdo , che ci trattenne dall' inserirvi qual-
che Tàvola rappresentante il *Pelvimètro* da noi ridot-
to a misurare i *diàmetri diretto* , e *traverso* delle
aperture del Catino , non potendo queste avèrvi luògo
senza aumentarne il prezzo .

XIV. Ripèto , che questo non è un Trattato di
tutta l'*Arte Ostetricia* , egli è un *Discorso intorno all'*
Esplorazione , fatto per risparmiare agli *Ostetricanti*
di Villa l' inèdmodo di andare per molti volùmi ,
in traccia delle noìzie , delle quali abbisògnano più
spesso , e sovente la noja d' avèrvele ficercate a
lungo inutilmente .

XV. Possa questo mio rène lavòro , forièro d'al-
tri dello stesso gènere , che forse non disgradirànosì
da' miei Collèghi Maestri dell'Arte , propensi a se-
condare coll' approvazione loro gli sforzi di chi va
in traccia della verità , e de' mezzi di recar sollièvo
alle *Partorienti* , e di tramandar più robùsti , e più
sani alla Posterità i sostegni della medèsima : possa ,
dissi , ottenère quel fine per cui fu intrapreso , passan-
do per le mani degli *Ostetricanti* , e delle *Levatrici*
atte a comprènderlo ; e indurre i *Mèdici* , e i *Cerù-*
sici delle condotte a spiegarne il contenuto a chi ,

esercitando l'*Ostetricia* come si dice per pratica, non à avuto dalla sorte i mezzi opportuni onde trarne da se quel profitto, che se ne desidera.

Così tutti ci unirèmo a contribuire coll' opera nostra, qualunque siasi, all' aumento universale di quelle cognizioni, che più impòrtano in un Arte, che à tratti a se gli sguardi benèfici dell' *AUGUSTO SOVRANO*, e i pensieri più sèrri del *R. Imperial Governo*, onde sarà quanto prima richiamata a novella energia in queste contrade, mercè degli utili, grandiosi e comodi stabilimenti, de' quali si sta maturando l'esecuzione.



DELLA ESPLORAZIONE

FONDAMENTO DELL' ARTE OSTETRICA

PARTE PRIMA

In cui si contiene una breve descrizione degli Organi Genitali Femminili, d' intorno a' quali s' aggrava l' operazion di cui si tratta.

I. Gli Organi, de' quali ogni Ostetricante dee aver cognizione per fare l'Esplorazione con frutto, sono di due sorta, cioè alcuni *Duri*, altri *Molli*.

II. Tra i *Duri* si contano le *Ossa*, e le *Cartilagini* del *Catino Femminile* detto latinamente il *Pelvi*.

III. Tra i *Molli* vengono compresi i *Visceri*, i *Ligamenti*, i *Canali*, le *Glándule*, i *Muscoli*, i *Vasi*, e i *Nervi* appartenenti alla *Generazione*, annessi allo stesso *Catino*, o nel medesimo contenuti, cioè nella parte inferiore del *Basso-ventre* della Donna; tutti sostenuti e coperti dagli *Integumenti comuni*; e *propri*, *esteriori*, ed *interni*.

IV. E' necessario che se ne conosca la *naturale*, l'*ordinaria disposizione* da chi brama di ricondscerne le *alterazioni*. Ne' casi ambigui ed intricati colui, che ne ignora il sito, la figura, le connessioni, e le relazioni scambievoli loro, a che pro gli esaminerà egli esplorando?

V. E per avere il solo *Parto* in mira, siccome gli ostacoli più considerabili a questo dipendono più frequentemente, che da nissun' altra cagione evidente, dalla incorrispondenza delle ossa del *Catino*, ossia del *Pelvi*, col volume, e con la situazione del *Feto*; così sommamente importa un' esatta cognizione della struttura e delle dimensioni naturali di questo, se vuolsi con prontezza e giustamente

ravvisar il diverso grado di deformità, a cui può esser giunta qualche parte del *Catino*, e dirigere l'*Esplorazione* a far evitare alcune operazioni dannose, e a farne intraprender altre, che conserveranno in vita, e la *Donna*, e il *Feto*.

VI. Appoggiandosi alle ossa del *Pelvi* tutte le altre parti, che converrà mentovar, e descrivere, incominceremo a favellar degli *Organi Duri* per farci strada alla più chiara intelligenza di quanto dovremo soggiungere in riguardo a' *Molli*.

Le Ossa, e le Cartilagini, dalla union delle quali risulta il Catino Femminile.

VII. Recatevi davanti agli occhi un *Catino* ordinario, femminile, ben costruito, paragonatelo con un altro vizioso, e deforme, affinchè abbiate lume bastante intorno a qualche cagione delle difficoltà del *Parto*, e a suo tempo sappiate trovar i mezzi capaci di condurlo a buon fine; o fissar con ragione il pronostico dell'impossibilità d'estrarre intiero, e vivente per le vie naturali il *Bambino* dall'*Utero* materno, allorchè nè la mano vostra, nè gl'istrumenti meno micidiali, non potranno penetrarvi per operare con la necessaria libertà.

VIII. Il *Catino* ben costruito è un complesso d'ossa insieme congiunte, nominato così per la sua figura, e per l'ampia cavità, che da tal unione risulta; le principali aperture della quale sono due, la più grande in alto, la più angusta in basso; amendue mancanti, la prima all'innanzi, l'altra anche alla parte posteriore de' lati.

Le Ossa, delle quali è formato il Catino.

IX. Le ossa, che formano il *Catino* nella *Donna* Adulta sono quattro, due ossa *Innominate*, o delle *Anche*, il *Sacro*, e il *Coccige*.

X. Delle due ultime *Vértebre Lumbàri*, le quali anno tanta influenza sul sostegno e sulla direzione della *Matrice*, sul movimento del *Feto*, e della mano dell' *Ostetricante*, sulla determinazione delle forze principali della *Partoriente*, si à motivo ragionevole di stupire, che tanto profondo silenzio ne àbbiano tenuto i sommi Pratici, che di quest' Arte con tanta precisione, e d' ogni parte del *Catino* con tanta minutezza trattarono, e ci dièdero le dimensioni, e calcolarono l' importanza d' ogni minimo cangiamento, ad ogni minima porzioncella del medesimo accaduto, o possibile. Egli è certo, che un *Esplorator* esatto tanto all' esterno, quanto nell' interno diligentemente esaminandole, ne può ricavar lumi di grande rilievo.

XI. Uno sguardo allo schèletro femminile sostenuto da' ligamenti naturali; o al fondo dell' interno dell' *Abdòmine* d' un cadàvero fresco di Donna, sgombro di tutte le viscere; un solo sguardo basta a manifestare qual protuberanza faccia nella parte superior interna posteriore del *Catino* l'ultima delle nominate *Vértebre*, alla quale sta unita, per darle maggior estensione e fermezza col suo corpo, e colla sostanza *cartilagineo-ligamentosa* ad amendue comune, la penultima.

XII. Considerate come parti dure indispensabilmente necessarie a conoscersi per l' *Ostetricante* le due *Vértebre Lumbàri* inferiori, giacchè l' *Utero*, *gràvido* à sulle medesime costante appoggio negli ultimi mesi; e posto che nelle diverse circostanze del parto non è impossibile inarcarle, o deprimerne all' uopo il corpo, onde rièscano più agèvoli le diverse operazioni eseguibili nelle *Matrici gràvide*, a chi avrà meglio imparato a determinarne secondo l' urgenza le varie accennate direzioni, soggiungeremo, che...

XIII. Tre osi formano da amendue i lati l' osso *Innominato*, o delle *Anche*, i quali ritengono ancora i nomi, che (trovandosi divisi ne' *Feti*), avèano di *Ilio*, di *Pube*, e d' *Ischio*.

XIV. Tali divisioni erano necessarie sì per favorire colla flessibilità, che ne risultava, le differenti attitudini, che il corpicciuolo dovèa prendere nella *Matrice*, come per agevolare il *Parto per le natiche*; nel qual caso i varii pezzi, che costituiscono il *Catino*, fanno a un di presso ciò, che nel *Parto naturale* sogliono fare (checcchè ne dicano alcuni in contrario) le pieghevole, e disgiunte ossa del cranio, massime i due *Ilii* accostandosi, e restringendo il *Catino*.

XV. Nell'*Adulta*, in cui que' tre pezzi per loro costituiscono un sol osso, la porzion superiore del quale è formata dall'*Ilio*, la anteriore dal *Pube*, l'inferiore dall'*Ischio*, tali denominazioni servono a fissare i diversi *Assi* del *Catino*, il sito delle varie parti della generazione, e le indeterminabili posizioni d'alcune parti del *Feto*; non meno che le direzioni, che à, o che si debbono procurare all'*Utero*, o al *Capo*, e a qualsivoglia altra parte del *Feto*: e affinchè l'*Esploratore* ne tragga le desiderate notizie, e all'occorrenza possa darne à Maestri dell'Arte preventivamente l'opportuno ragguaglio.

L'Osso Ilio, e i difetti, a' quali va soggetto.

XVI. L'*Ilio*, che forma la parte lateral superiore, e un pò diretta delle ossa *Innominate*, rappresenta da tutt'edue i lati un'ala larga, rivolta obliquamente in fuòri, concava e liscia alla faccia interiore, più divergente nella *Femmina*, che nel *Maschio*: e per questa divergenza loro questi ossi, per la loro inclinazione di dentro, e dal di dietro in avanti, e in fuòri, lasciano una grande ed assai profonda incavatura, che permette all'*Utero* d'inclinare ora più ora meno all'innanzi, e d'appoggiarsi come sopra base più larga a' lati.

XVII. I difetti, a' quali è soggetto ognuno degli *Ilii*, consistono nell'esser troppo accostato l'uno all'

altro, il che diminuisce la capacità del *Catino*; come la diminuisce al davanti un altro difetto, qual' è l' incurvamento delle *Spine anteriori*, se sono troppo lunghe, indentro. Il terzo difetto è la troppa elevazione, ed acutezza della *Linea semicircolare*, che divide la *Sezion superiore* del *Catino* detta anche *Scema*, dalla *inferiore*.

XVIII. Gli stravolgimenti in oltre, le protuberanze tanto ossose, quanto gommose di queste ossa, dipendenti dalla *Rachicace*, e da altre malattie universali, o locali, producon pure pessimi effetti, de' quali a torto vengono incolpati gli *Ostetricanti*: e costoro se gli hanno preveduti, e se hanno con diligenza procurato d' iscansargli, ove non abbian ottenuto l' intento, non meritano biasimo alcuno, purché mediante l' *Esplorazione* avèndogli conosciuti, ne abbian tratto le opportune indicazioni, e dedotto il più ragionevole prognostico.

L'Osso Pube, e i vizii a' quali è esposto.

XIX. Il *Pube* collocato anteriormente si allunga da' lati dell' *Ilio* per mezzo del suo corpo, che concorre a formare quella profonda *cavità* circolare, in cui s'articola l'osso della coscia detto il *Fémore*, e che dicesi *Cavità Cotiloidèa*. Il corpo dell' osso *Pube* alla sua estremità più lontana dall' *Ilio* col suo braccio, che discende obliquamente, forma un angolo grossolano, irregolare, che congiungendosi coll' angolo corrispondente del *Pube* del lato opposto, presenta al di dentro una superficie liscia, e concava, la quale dà sufficiente ampiezza alla *Sezione inferiore* del *Catino*, che dicesi *Escavazione*, intanto che non elevandosi all' innanzi al par dell' *Ilio*, permette all' *Utero* d' ampliarsi liberamente senza costringerlo a salire verso il Petto più del dovere, lasciando illimitata anteriormente la *Sezion superiore*.

XX. Il Braccio discendente di quest'osso unito coll' ascendente dell' *Ischio*, di cui favelleremo tantosto, forma il *Forame ovale*, ch'è tra la *Cavità Cotiloidèa*, e il margine anteriore di queste ossa.

XXI. Scostandosi notabilmente da quello del *Pube* dell' opposto lato dà luogo, ad una incavatura divergente in basso, nominata *Arco del Pube*: questa rende molto più capace la *Escavazione del Catino*.

XXII. I vizii di struttura, e di figura del *Pube* sono ora la convessità del corpo, e dell' angolo indentro, che restringe lo *Stretto superiore* del *Catino*: ora la sovrèchia depressione dell' *Arco del Pube*, la convergenza scambievolmente delle *Braccia*: ora la depressione delle medesime verso l'osso *Sacro*, e il *Coccige*, che accenneremo a suo tempo; quindi la sovrèchia angustia dello *Stretto inferiore*; quindi la difficoltà d'inoltrarsi le dita Esploratrici quanto sarebbe opportuno.

L' Osso Ischio, e i suoi difetti.

XXIII. L' *Ischio* considerato insieme con quello del lato opposto fa le parti laterali inferiori del *Catino*; e colla punta dell' osso *Sacro* guernita del *Coccige*, costituisce lo *Stretto inferiore* di tal cavità. Vi consideriamo un corpo, che concorre a terminar in basso la *Cavità Cotiloidèa*, e che discendendo getta all' indietro una *Spina* considerabile, nel bel Sesso destinata a determinare, e dirigere il *Capo del Feto* verso la *Vulva*, e a difendere i *Nervi* e i *Vasi* principali, e l' *Intestino retto*, dalle dannose compressioni, che il *Capo* medesimo vi farebbe, se queste due *Spine* degli *Ischi* non vi si opponessero. Indi finisce in una *Tuberosità*, dalla quale s'elèva, e sale obliquamente innanzi un *Braccio*, che congiungendosi col *Braccio* discendente del *Pube*, mentre con un margine concorre a perfezionar il *Forame ovale*, coll' altro contribuisce a terminar in basso l' *Incavatura*, in cui finisce l' *Arco del Pube*.

XXIV. La lunghezza, la larghezza, e la spessezza eccessive della *Spina* di quest' osso; l' incurvamento della medesima indentro; l' avvicinamento, o il volume soverchio della *Tuberosità* dell' uno di questi ossi all' altro; la soverchia larghezza, ed obbliquità del *Braccio*, diminuendo la *Escavazione del Pelvi*, oppongono ostacoli al *Parto*, e perciò dee la possibilità di tali difetti esser nota all' *Ostetricante*, che gli avrà riconosciuti mediante l' *Esplorazione*.

XXV. Abbiamo considerate come disgiunte le tre ossa dalle quali risulta un osso solo per lato, benchè nelle Adulte, come abbiamo già accennato, appena rimangano vestigie dell' antica loro divisione, e non cedano punto nè poco agli *sforzi* indispensabili nel *Parto*. Resta ora a parlare delle *due ultime Vèrtebre Lumbàri* dell' osso *Sacro*, e del *Coccige*, che danno compimento al *Catino* verso la faccia posteriore, e ne fanno il punto di comunicazione fra il *tronco*, e le *Estremità inferiori*, ossia le *Coscie*, le *Gambe*, e i *Pièdi*.

Le due Vèrtebre inferiori de' Lumbi, e i difetti loro.

XXVI. Le dette *Vèrtebre* sono due ossa convesse ovalmente al davanti, appiattite in alto, e in basso per quella faccia loro, onde scambievolmente si combaciano, e si trovano mobilmente unite per mezzo d' un *Ligamento cartilagineo* pieghevole, compressibile, ed elastico, che a strati concèntrici è collocato tra una *vèrtebra* e l' altra, fra l' ultima, e la base dell' osso *Sacro*. Ciascheduna *vèrtebra*, oltre al *corpo*, à posteriormente, ed a' fianchi, sette *apòfsi* dalla direzione, uso, e figura loro nominate *articoli*, o anche *obbligue* le quattro prime, due superiori, e due inferiori; *traverse* le due seguenti di mezzo, e *spinosa* l' ultima, ch' è posteriore.

XXVII. Formano queste *Vèrtebre* fra di loro, unendosi, e colla base dell' osso *Sacro*, una prominezza

convessa, della quale fa d'uopo, che l'*Ostetricante* abbia cognizione prima di far l'*Esplorazione* per non giudicarla effetto di cattiva conformazione, - allorchè introducendo la man nell' *Utero* viene ad accorgersene, e sente che fa ostacolo à rivolgimenti del *Capo*, o del *Corpo del Feto*. Conoscendone a un di presso la figura, e l'estension naturale, saprà distinguerne i difetti consistenti nell'irregolarità della superficie, e nel piegar ora piuttosto ad un lato, che all'altro; come altresì nel porgere troppo in avanti: cose tutte che angustiano ora a destra, ora a sinistra la *Sezion superiore*, ora diminuiscon troppo il diametro minore della *Escavazione del Catino*: e cose tutte, delle quali, la sola *Esplorazione* è atta ad istruirci.

L'Osso Sacro, e i suoi difetti.

XXVIII. L'osso *Sacro* situato alla parte posteriore di questo, immediatamente sotto l'*ultima vertebra Lumbare*, è triangolar di figura, e delle due faccie, che à, l'anteriore è concava, liscia, traforata da due ordini verticali di fori, che danno uscita à nervi procedenti dalla spinal midolla, destinati al moto, e alla vita non solo delle parti circonvicine, ma eziandio delle coscie, e delle rimanenti estremità inferiori. Circostanza importantissima a sapersi dall'*Ostetricante* affinchè usi tutta la discrezione, e la delicatezza immaginabile, allorchè dee adoperarsi colle mani, o con gli strumenti in quella parte. Ritornando all'osso *Sacro*, questo à la base in alto, e la punta in basso: è composto di cinque vertebre false unite solidamente insieme; la prima delle quali, che è la maggiore, articolata coll'*ultima vertebra Lumbare*, fa quella prominenza, che già notammo, la giusta proporzione della quale agèvola altrettanto, quanto le difformità ritardano il *Parto*. Così l'*ultima* in basso, naturalmente rivolta all'innanzi, quando è troppo piatta,

lascia impegnar il capo del *Feto* troppo profondamente nel *Perineo*, quando è troppo curva, angustia sovrachio lo *Stretto inferiore* della cavità del *Catino*.

XXIX. Dunque il *Sacro* ben situato, e ben formato, contribuisce alla maggior ampiezza del *Catino*, e alla più opportuna direzione del capo del *Feto* verso la *Vulva*, invece che la troppa, o minor sua concavità; la prominenzza sua superiore minor del dovere, o sovrachio inoltrata all' innanzi; la situazione sua troppo dritta o troppo obliqua verticalmente, o stravolta ad un de' lati, la rende viziosa, o gravemente vi si oppone, come dalla *Esplorazion* ci viene ad evidenza manifestato.

Il Coccige naturale e difettoso.

XXX. Il *Coccige* per lo più siègue colla serie delle picciole vertebre, ond' è costruito, la direzione della punta del *Sacro*, da cui pende. E' una picciola piramide rovesciata anch' esso, ed ogni sua particella mantiensì capace di qualche mobilità fino all' età molto avanzata, specialmente nelle *Femmine*.

XXXI. Questa mobilità d' ogni suo pezzo, e la mobile articolazion sua col *Sacro*, agevola talvolta maravigliosamente il *Parto*, dando luogo al capo, ancorchè voluminoso, d' inoltrarsi verso la *Vulva*, permettendo allo *Stretto inferiore del Catino* d' ampliarsi anche oltre al consueto.

XXXII. Il *Coccige* è difettoso quand' è troppo ricurvo all' innanzi, perchè l' accennato stretto allora n' è troppo angustiato; quando è troppo lungo; quando i pezzi; ond' è composto son così fattamente assodati insieme, che non è possibile rispingerlo indietro ne' casi di necessità. Difetti intorno a' quali l' *Esplorazione* non ci lascia dubbio veruno.

I Ligamenti, e le Cartilagini del Catino.

XXXIII. Tutte le ossa del *Pelvi* unite fin da

principio col mezzo di sostanza biancastra, elastica, ligamentosa-cartilaginosa, vanno perdendo la mobilità loro a poco a poco; la saggia Natura però à cura di ritardare l'ossificazione di tale sostanza nelle Femmine, specialmente in que' siti, la mobilità de' quali può molto contribuire alla facil uscita del *Feto* alla luce. Simili sostanze là dove uniscono gl' Ilii alle faccette laterali del Sacro, e all'incontro de' Pubi tra loro, si conservano flessibili, ed arrendevoli, anche nelle Adulte. Non è però da credere, che manchino in varie parti del *Catino* fasci di fibre ligamentose atti a resistere alle forze anche violentissime tendenti a disunir le ossa, che sembrano congiunte soltanto per via delle mentovate sostanze cartilagineo-ligamentose.

Per altro siccome le giunture delle ossa del *Pelvi* femminile soffron talora distensioni e distrazioni considerabili ne' *Parti difficili*; così uopo è, che la natura prepari anche preventivamente ogni circostanza onde tali distrazioni con minor danno abbiano luogo, ed allontanì le cagioni determinanti i cattivi effetti delle distrazioni violente e precipitose.

Vantaggi risultanti dal rilassamento delle unioni del Catino Femminile, al fin della Gravidanza.

XXXIV. Pochi *Ostetricanti* oggimai dubitano più, che le ossa del Pube alla *Sinfise* loro, e le Innominate là dove si congiungono col Sacro, e che nominiamo *Sinfisi Sacro-Iliache*, non si scostino, allungandosi ed ammolliendosi i ligamenti, onde quelle giunture sono tenute in sesto: alterazioni, che vengono preparate a facilità del *Parto* negli ultimi mesi della *Gravidanza*, a segno, che per correggere la *Claudicazione* che ne deriva, e ad impedir che più grave e più molesta non divenga, è indispensabile l'uso d'una cintura assai ristretta, com'è indispensabile

dopo il *Parto* a quelle Donne , in cui l' infiltrazione , e l'ammollimento sono stati più sensibili , e manifesti.

Vantaggi che per il Parto ridondano dalla Struttura, e figura del Catino femminile dal maschile diversa .

XXXV. La Natura nel costruire il *Catino* Femminile tanto differente nel Bel Sesso dal Maschile senza moltiplicar le ossa , e senza mutarne i contorni essenziali della figura , si valse del consueto suo mirabile magistero modificandone ogni porzione , ed imprimendovi tal meccanica forma , che sebbene il tutto , che ne risulta , sia tanto diverso , l'occhio più fino , e penetrante , a grande stento , anche mettendole al paragone , saprebbe individuarne e ricondurne le differenze nelle ossa disgiunte .

XXXVI. Ne indicheremo brevemente le più apparenti , che consistono nella capacità maggiore nella Donna di amendue le *Sezioni* del *Pelvi* ; nella maggior concavità della faccia interna degli *Ilii* ; nella convessità de' medesimi maggiore al di fuori ; nella maggior espansione , ed appiattimento delle ale loro , il che rende più eminenti le Anche femminili .

XXXVII. La faccia interiore della *Sinfise* , e de' corpi del *Pube* , è più incavata , e più liscia : e gli angoli , che la formano si toccano in alto per uno spazio minore , e sono congiunti , incollati per via di più molle , e più spessa sostanza cartilagineo-ligamentosa : al basso poi l'*Arco n'* è molto più largo , che negli uomini .

XXXVIII. Il contorno , o sia margine risultante dall' unione de' *Pubi* , degli *Ilii* , e del *Sacro* , che separa la *Sezion superiore* dalla inferiore , è per ogni verso più ampio .

XXXIX. Più divergenti sono altresì le braccia degli *Ischii* , e de' *Pubi* , sicchè contribuiscono a render più larga la *Sezion inferiore* , al che concorre pure

la maggior distanza delle Tuberosità degl' Ischii, per cui anche lo *Stretto inferiore* riesce più ampio.

XL. Il Sacro, ed il Coccige, più concavi all' innanzi, porgono colla convessità loro maggiormente indietro: quindi mentre se ne amplia la capacità della *Escavazione* detta anche il *picciolo Pelvi*, ne deriva puranco la maggior elevazione, e tumidezza delle natiche nel Bel Sesso.

XLI. Il Coccige resta più lungo tempo mobile, e restan più lungo tempo pieghevoli i ligamenti, che lo uniscono al Sacro, e che ne tengono insieme congiunte le ossa, ond' è composto.

XLII. Alle accennate varietà relativamente a' sessi nella struttura del *Catino*, debbono le Donne, oltre all' eleganza d' un' ottima conformazione, una serie di proporzioni quasi impercettibili, le quali per la grande concordanza loro colle parti del corpo del *Feto*, ne agevolano l' espulsione dall' *Utero*, e servono sempre, ora più ora meno, per quanto loro spetta, a renderlo naturale, e felice.

Sezioni, in cui è stato diviso dagli Ostetricanti l' interior del *Catino*, perchè riesca più chiara l' esposizione di quanto concerne l' Esplorazione, e il Parto.

XLIII. Prima di accennare come sieno coperte interiormente le parti finora descritte della *cavità del Pelvi*, è necessario indicare le divisioni, che a più chiara istruzione degli *Esploratori*, e degli *Ostetricanti*, si fissarono de' diversi spazii verticali della medesima cavità. Molti Maestri la divisero in due sole parti, che nominarono *Pelvi grande*, e *Pelvi picciola* ossia *superiore* il primo, l' altro *inferiore*. I Franzesi nominarono *Stretti*, o *Distretti* ciò che i primi aveano considerato come i limiti delli *Pelvi*. Qualche Moderno vi considerò tre spazii a' quali lasciò

i nomi di *Pelvi*, aggiungendovi i rispettivi epiteti *grande* o *superiore*; *coniugato*, *ellittico*, o *mezzano*; *picciolo*, o *inferiore*. A noi sembra che l'unico *Pelvi*, l'unico *Catino*, che ci presenta il complesso delle ossa fin qui descritte, si possa utilmente, e chiaramente considerar come divisibile in due *Sezioni* *superiore*, o *scema*, ed *inferiore*, o *Escavazione*.

Sezione scema, o superiore.

XLIV. La *Sezione superiore* è formata dal corpo delle due vertebre inferiori de' Lumbi, da tutta la porzione piatta superiore degli Ilii. E' mancante di margine all'innanzi per l'ampio tratto, che dalle spine anteriori d'un Ilio stendesi per la regione ipogastrica superiore, e per le anguinaje alle spine corrispondenti dell'altro conseguentemente non le disconviene la denominazione di *Scema*. Manca altresì addietro a' fianchi delle due ultime Vertebre accennate, e là due profonde incavature cuneiformi s'incontrano fra l'estremità posteriore degli Ilii, e le Vertebre, e le Carrilagini loro: però siccome a compiere in avanti il contorno di questa *Sezione* concorrono tutti i muscoli dell'Abdòmine, prescindendo dagli Integumenti universali, e dal Peritonèo, così ad empierle i due vori accennati, e a chiudere l'Abdòmine da quelle parti, oltre a parecchi muscoli, ed a robusti ligamenti Sacro-Iliaci, concorrono le apofisi trasversali, e le oblique delle menzionate Vertebre.

Larghezza della Sezione Scema.

XLV. Questa *Sezione* è larga dalle sette alle nove once del piè liprando nelle ossa secche; la larghezza dal davanti alle vertebre non ne può esser fissata per la mancanza del margine già notata. L'altezza supera le tre once, e confina colla *Sezione*

inferiore, o *Escavazione* per mezzo d'uno stringimento, cui si dà il nome di *Stretto Superiore*, o *Elittico*.

La Sezione inferiore, o sia Escavazione, e le sue dimensioni.

XLVI. La *Sezion inferiore*, o *Escavazione*, è men ampla della superiore, è più compita a tergo, dove scorrendo pel margine anteriore della base dell'osso Sacro, e per la faccia interna degl' Ilii, a seconda della linea saliente, che già vi osservammo, e che forma lo *Stretto superiore* viene a corrispondere alla cresta, o sia al margine superior interno del corpo de' Pubi. Così è circonscritta in alto questa *Sezione* detta da alcuni il *Coronamento* allora che il capo del *Feto* s'avanza in basso e sembra occuparla tutta; sebbene altri lo dicano *giunto al coronamento* quando l'orificio stesso dell' Utero dilatatosi ne lascia scoperta una porzione considerabile della testa, formandovi in tal guisa una specie di corona alla sommità del vertice, che vi si va facendo strada. La massima altezza della *Sezion inferiore* suole oltrepassar l'oncia e mezza del piè liprando, stendendosi assai più sotto all'unione del braccio discendente de' Pubi coll' ascendente degl' Ischii, e all'unione della detta falsa vertebra dell'osso Sacro colla quinta. L'estension diretta di questa *Sezione* detta pur *Diámetro diretto*, dalla sinfise del Pupe al margine superiore della faccia anteriore dell'osso Sacro supera le tre once; quella, che diciamo *Diámetro trasversale*, e che dall'uno all'altro corpo degli Ilii misura la maggior lunghezza della Elissi, arriva alle tre once e mezzo, il diámetro obbliquo dalle Cotiloidi alle sinfisi Sacro-iliache, è lungo quattro once. Il contorno superiore inclina obbliquamente dal Sacro al Pube, e ne varia fral trentesimo, e il quarantesimo grado.

XLVII. Ed ecco un novello avvedimento della provvida Natura, la quale ne' casi ordinarii fa, che tali diâmetri s'accordan ottimamente co' differenti diâmetri del capo del *Feto*, e con la situazion del medesimo nella Sezione inferiore nelle doglie del Parto, come per via dell' *Esplorazione* veniamo convinti. *

Lo Stretto inferiore.

XLVIII. Lo *Stretto inferiore* è se non il più angusto senza dubbio il più irregolare: termina il Catino al basso con tre angoli, fra i quali v'anno tre alte incavature. Gli angoli sono due laterali fatti dalle tuberosità degli Ischii, ed uno posteriore più acuto, fatto dalla estremità inferiore del Coccige. Questi tre angoli formano lo *Stretto inferiore*. Delle Incavature una è anteriormente nel mezzo fra le braccia de' Pubi, e degli Ischii sotto alla sinfise, e dicesi *Arco del Pube*. Le altre due nominate *Incavature Sacro-Ischiatiche* son a' lati posteriori inferiori del Catino, appuato fra i lati dell' estremità inferiore del Sacro, e gl' Ischii ed ivi i *Ligamenti Sacro-Ischiatici* ne compiscono in qualche foggia il margine inferiore.

XLIX. Vi considero gli stessi Diâmetri che nelle *Sezioni*, e nello *Stretto superiore*, cioè uno *Diretto*

* Tre sono i Diâmetri principali del capo del *Feto*: il maggior diâmetro è dalla fontanella anteriore alla punta del mento; il mezzano è dalla fronte all' occipite, il minore dall' uno all' altro orecchio. Ora la testa scorrendo per la Sezione inferiore volge la faccia in guisa, che guarda obbliquamente uno degl' Ilii, e allora il diâmetro mezzano della medesima testa corrisponde al massimo della Sezione. Senza questo natural movimento il capo troverebbe ostacoli alla discesa, che esigerebbero per essere superati la mano dell' *Ostetricante*, non potendo uscire senza ajuto quando presenta il Diâmetro maggiore.

dall' arco del Pube alla somma concavità della faccia anterior del Sacro; uno dal corpo dell' uno a quello dell' altro Ischio, detto *traversale*; e due *obblighi*, l' estension de' quali è minor di tre once. Sebbene il *traversale* sia talvolta alquanto più lungo, egli si dee tuttavia considerer come minore del *retto*, che dall' arco del Pube va al Sacro, appunto per la profonda concavità di questa in certe Donne uguale a cinque linee; aggiungasi poi anche la mobilità della punta del Coccige per cui agevolmente s' allontana dal Pube nel tempo del *Parto*, che allunga questo diametro notabilmente.

L. Il capo del *Feto* oltrepassato lo *Stretto ellittico* discende obliquamente per una delle incavature Sacroiliache nella concavità del Sacro, rivolgendo la nucha all' arco del Pube; mutazione per cui il suo maggior diametro si rende corrispondente al maggiore del piccolo Pelvi, che è lo *Stretto inferiore*.

LI. Allorchè le doglie son vicine a produrre l'effetto loro, il capo oltrepassa questo *Stretto*, e se il Coccige vi si oppone, lo spinge indietro di modo, che questo *Stretto* allor à quasi tanta estensione quanto il diametro obliquo della *Sezion inferiore*, o *Escavazione*.

Parti Molli, che occupano la cavità
del Catino Femminile.

LII. Tutto l' interior del *Catino* è tappezzato di cellulosa, di ligamenti, di muscoli, di tendini, di nervi, di vasi d'ogni specie, attorniatì, e collegati per via d'una membrana adiposa molto abbondante. Il voto n' è in parte occupato dalla vescica urinaria, e dall' intestino retto; e l'esser questi pieni d' escremento, e d' orina, allor ch' è vicino il *Parto*, può riescire di gravissimo ostacolo al compimento del medesimo, ritardandolo.

LIII. Le pressioni , a cui vanno soggette tutte le mentovate sostanze , ed organi , tanto nella Gravidanza inoltrata , quanto nel vigor delle doglie , cagionan talora gravi , e nojosi accidenti , quali sono peso , dolore , stupidità , tremor delle estremità inferiori , grandi , frequente stimolo d'urinare , o d'evacuar le feci ; impegni edematosi alla vulva , alle coscie ; varici , emorroidi , ritenzione , o troppo facil corso degli escrementi ec. Spariscono , è vero , per lo più questi accidenti dopo il Parto , perchè la cagion che impedia la circolazione degli umori , e angustiava l'azion de' nervi , e degli organi è tolta : ma qualor le compressioni sono state lunghe , costanti , gagliarde o indiscrete , e ripetute , massime avendosi dovuto replicar l'introduzione delle mani , del *Forcipe* , o d'altri strumenti , allora se non si ricorre a' risolvendi , agli antiflogistici , e specialmente a' salassi proporzionati all'urgenza del caso , non solo durano incomodissimi à lungo , che anzi danno luogo a serie , a funeste conseguenze.

Siàmo insensibilmente discesi a parlare delle parti molli , che contengono nel Catino , sicchè tempo è ormai , che si favelli del rimanente degli organi alla Generazione dedicati , che debbono trarre a se in modo particolare l'occhio e l'attenzione delle Mammàne , e degli Ostetricanti bramosi di riescir utili , e lodevoli *Esploratori* .

LIV. Oltre alle ossa , delle quali trattammo finora , servono alla *Generazione* , e al *Parto* varii organi , che si posson vedere , toccare , esaminare senza preparazione , senza taglio alcuno , e perciò diconsi *esterni* : altri si dicono *interni* , perchè profondamente nascosti in fondo al basso ventre non si vedono salvo co' mezzi accennati .

Nomi degli Organi Genitali Femminili
tanto esteriori quanto interiori .

LV. Le parti esterne sono dodici , vale a dire
1. Il Pettignone , o Monte di Vènere , o Pube ,

2. La *Vulva*, o *Natura*, le *Grandi Labbra*, e le sue *Commessure*,
3. Il *Perinéo*,
4. L' *Ano*,
5. Le *Ninfe*, o *Picciole Labbra della Vulva*,
6. La *Clitòride*,
7. L' *Orificio esteriore dell' Uretra*,
8. L' *Imène nelle Vergini*,
9. Le *Caruncule Mirtiformi*,
10. La *Vagìna*,
11. Il *Collo*,
12. L' *Orificio dell' Utero*.

LVI. Si dicono *interne* le seguenti quattro, cioè
 L' *Utero* o sia *Matrice*,
 I *Ligamenti dell' Utero*,
 Le *Trombe del FALLOPPIA*, o sia *Ovidutti*, e
 Le *Ovaja*.

Organi Genitali *esteriori*, e *prima il Pettignone*.

LVII. Il *Pettignone*, o *Pube* è quella regione, quello spazio coperto di peli, che in avanti, e in basso termina il Basso ventre. Dicesi anche la *Mot-
ra*, o il *Monte di Vénere*. L'elevazione, e la roton-
dità di questo spazio accordasi sempre colla corpulen-
za, e colla forma della Fèmmina. Dalla quantità,
dal liscio, e dalla lunghezza de' peli di questa par-
te, congiunti con altri indizi, che dirèmo a suo luo-
go, desumesi argomento della *Verginità*, come dall'
esser rasi, rari, rabbuffati, sudicci, si à, unendo
questi ad altri argomenti, sospetto della *Deflorazione*,
e della poca saviezza della Donna soggetta all' esame
dell' *Ostetricante*, all' *Esplorazione*.

La *Vulva*.

LVIII. *Vulva*, o *Natura* si nomina quella profonda,

e lunga fessura, che dal di sotto del Pettignone, corrispondentemente all' Arco del Pube, discende fra le coscie della Donna fino a certa distanza dall'apertura doue escouo gli escrementi, nominata *Ano*, o *Pòdice*.

Le Grandi Labbra e le Commessure della Vulva.

LIX. Per tutto il tratto della *Vulva* la pelle, e gli altri integumenti comuni sono come divisi in due morbidi coscinetti, sparsi di peli, i quali coscinetti incurvandosi alquanto si portano uno applicato mollemente contro l'altro fra le coscie fuu vicino al suddetto orificio, che è tra le Natiche; e che nominammo *Ano*, dove ricongiungendosi come le labbra della bocca verso le guancie, hanno essi pure il nome di *Labbrì*, distinti in *Labbro destro* e in *Labbro sinistro* secondo il lato, che occupano: e il ricongiungimento della pelle loro verso l'*Ano* tanto, quanto il principio della separazione loro all' Arco del Pube, si dicono *Commessure*, delle quali questa è detta *anteriore* o *superiore*, quella *posteriore*, o *inferiore*, dal sito in cui si trovano.

Il Perineo, la Forchetta, la Fossa Naviculare, e il Raffo.

LX. Lo spazio intiero formato dalla pelle fra la commessura posterior della *Vulva*, e l'*Ano*, sgombro di peli nella Donna, si dice il *Perineo*; e il margine anterior d'esso, ch'è nelle Vergini a foggia di sottilissimo velo semilunare, notabilmente incavato addentro, dicesi *Forchetta*; e l'incavatura, che addentro s'innoltra verso l'*Ano*, dicesi *Fossa naviculare*. *

* Tutto il contorno della *Vulva* è di color simile a quello dell' altra superficie del Corpo: le labbra di questa

Dalla Forchetta all' Ano il *Perinéo* è percorso direttamente da una linea in risalto, che appellasi *Raffe*.

L' Ano.

LXI. *Ano*, o *Podice* si nomina quel forame rotondo, rugoso, alcune volte circondato da vene gonfie, disuguali, coperto d'un tenue epitèlio, che s'incontra in fondo alla fessura scolpita fra le due natiche, al termine del *Perinéo*, un pollice circa più indietro della *commessura posteriore* della *Vulva*. A tutti è noto, che per l'*Ano* escono gli escrementi essendo esso dalla Natura a tal uso specialmente destinato; ma l'Arte se ne prevale ad utilità degli individui ora per introdurre nel corpo sostanze medicamentose; ora per isgravarlo dalle morbosc; ora per esplorar lo stato delle viscere circonvicine, ed ora per impedire al capo del *Feto* nascente d'impegnarsi troppo addietro nella concavità dell' osso Sacro, e di stracciare il *Perinéo*; ora per allontanare dal centro o asse del *picciolo Pelvi* tutto il *Coccige*, o soltanto la punta di quel osso.

questa dal margine loro addentro vestono lo stesso colore, che le labbra della bocca verso le gengive; e l' epitèlio, che le cuopre, è sempre umidetto per abbondante mucosità, che geme dalle Lacune, e da' Pori frequentissimi, corrispondenti alle glandule mucose o sebacee contenute nel tessuto cellulare, onde ogni labbro è composto, ricco di vasi d' ogni genere, fornito di molta pinguedine, elastico, e capace per li numerosi fascetti di fibre muscolari, che lo adornano, d' una contrazion pari a quella, che produce il corrugamento dello Scroto ne' Maschi.

La frequenza dell' accoppiamento, e la *Gravidanza*, ma molto più il *Parto*, producon nelle labbra della *Vulva* cangiamenti talor atti a indicar la *Destroazione*; alcuni favorevoli al *Parto*; altri capaci di porvi ostacolo, e d' esigere il soccorso della mano cerùtica, specialmente in certe infiltrazioni, ristagni, tumori follicolari, o varicelli, esulcerazioni, ascessi, cicatrici irregolari, callosità, e simili.

LXII. Ecco in quanti modi può valersene l'*Ostetricante*, il quale sa risuldar l'*Ano* dall' estremità inferiore dell' *Intestino retto* avvalorata da' *Muscoli Elevatori*, e rinforzata dallo *Sfintere*, o *Stringitore*, il tutto attorniato da molta pinguedine, da molti vasi, da molti follicoli mucosi, e capace di gran dilatazione, e di forte stringimento.

Le Ninfe.

LXIII. Nella Vulva fra le Labbra al davanti si trovano due corpi rossi incarnati, simili tanto in colore, quanto in figura, ed in volume, alle barbe delle Galline, a' quali è stato dato il nome di *Ninfe* per lo sito umido, che occupano, e di *picciole Labbra* da alcuni Anatomici, che ne riconobbero la struttura interiore somigliante a quella delle grandi, state quà sopra descritte. Pendono le *Ninfe* dalla sommità dell' Arco, e dal margine interiore delle braccia del Pube, e al principio loro superiormente sono strette, vicinissime l' una all' altra, e a misura che discendono s'allargano, s'allungano, e scostansi portandosi indietro, di modo che lasciano a tergo uno spazio simile a quello delle punte d' un compasso mediocrementemente aperto. Coll' estremità loro più stretta anteriore abbracciano la *Clitoride*, colla posteriore occupano in parte l'orificio della *Vagina*.

LXIV. Sono le *Ninfe* ordinariamente nascoste fra le Labbra della Vulva: qualche volta però nelle Giovauette, e più sovente nelle Bambine o una o amendue le *Ninfe* appariscono fuor di questa, superandone le Labbra. Cosa che à luogo altresì nelle malattie loro, perchè si rilassano, s'allungano, e pendono in modo da cagionar incòmodo per la fregagione, a cui van soggette, per la gonfiezza e l' esulcerazione, che ne nasce, massime nella còpula. *

* Si è veduta una delle *Ninfe* lunghe e grossa enormemente

La Clitòride .

LXV. Anteriormente , e al di sopra delle Ninfe avvi la *Clitòride* nascosta immediatamente dietro la commessura anterior della Vulva, cilindrica, ottusa a quella sua estremità , che se ne può vedèr scostando ivi le Labbra ; è simile a un picciolo capèzzolo di mammella , coperta da una pieghetta membràneo-spu-gnosa , che le serve come di *prepuzio* , da cui si sviluppa per poco che si sollètichino le vicine parti col tatto , cercandola nella Fémmina vivente , e sana .

LXVI. La lunghezza , e il volùme alcune volte uguaglia la punta del dito mignolo ; in altre il pòllice , ed in alcune Fémmine (credute perciò dal Vulgo *Ermafrodite*) eccède molto le accennate misure , assomigliandosi ad un membro virile , del quale gli Anatòmici sanno , che à la consistenza , gli attacchi , la figura in picciolo , e molte altre proprietà , fuorchè quelle , che dipendono dall' *Uretra* mancante affatto nella *Clitòride* .

a spese del vicin labbro , che n' era stato quasi abolito , costringer il Cerùfico a farne l'amputazione .

Fra gli usi , che si attribuiscono alle *Ninfe* , il più vulgare è quello di diriger in avanti , e in giù l'urina quando la femmina se ne sgrava ; e di concorrere mediante la vivacità del senso , onde sono fornite al desiderio , e all' ottimo fine dell' accoppiamento . Si vedono però tante volte questi mōrbidi corpicciuoli a sparire , gemendo per le porosità loro molto umor sebáceo nel tempo del *Parto* , allor che la testa del *Feto* viene a dilatare violentemente la Vulva , che di leggieri si considereranno come appendici , o pieghe comuni alla *Vagina* , e alle Labbra , per le quali ne' frequenti casi di necessità e quella , e queste riescono capaci d' assai maggior dilatazione , e dotate d' assai maggiore lubrificità .

L'Orificio dell' Uretra .

LXVII. Questa , che è il canale per cui la *Vescica* si sgrava dell' Urina , si apre nella Donna otto, o dieci linee dietro alla radice della *Clitoride* per un' apertura bislunga quasi verticale , detta *Orificio dell' Uretra* . E' circondato da un risalto rugoso, verrucoso, formato da un valido tessuto cellulare fornito di glandulette, bucherato da varie lacune corrispondenti alle glandulette mentovate, alle quali servono di canali escretorii, per versare in que' contorni un muco untuoso, il quale trattenendosi ne' vacui della Vulva la invernacia tutta, e fa, che le Femmine poco pulite, gravemente, e schifosamente in quelle parti ozzano .

La Imene .

LXVIII. Dietro , e superiormente alle Ninfe, e alla Forchetta , si apre la *Vagina* , all' entrata della quale ordinariamente molto più ristretta nelle Vergini , si osserva una membrana rappresentante una specie di mezza luna colla concavità rivolta all' innanzi, detta *Imene* , che propriamente significa *Membrana* , ed è considerata come irrefragabile testimònio della Verginità della Femmina in cui si trova intatta .

LXIX. Sebbene possa riescir equivoca alcune rare volte così fatta testimonianza per la picciolezza del Membro , che à potuto penetrare fra le angustie della apertura risultante tra le corna della *Imene* senza distruggerle, e per la facilità d' insinuarsi per la medesima apertura la sostanza prolifica senza lacerazione della *Imene* , onde ne segua la *Generazione* ; tuttavia la sua esistenza non è picciolo indizio della sazietà della Zitella , che si esplora .

LXX. Errano dunque coloro , che giudicano l' *Imene* una cosa immaginaria, una chimera . La Notomia

la scuòpre collo scalpello , e l' *Ostetricia* la sente col dito , di modo che se non incontrasi in tutte le tènere Ragazze , nella maggior parte almeno delle Bambine ella esiste . La figura però n' è molto incostante , sendo in alcune più larga da un canto , in altre simile ad un anello , quasi com' è l' *Iride* nell'occhio ; in altre finalmente è un vero tramezzo , che al di là dell' orificio dell' *Uretra* chiùde la *Vagina* , e la ottùra a segno d' opporsi non solo alla union conjugale , ma eziandio al libero scola del sangue mèstruo .

Le *Atrète* , o sia *Imperforàte* .

LXXI. Le *Fémmine* che ànno la *Vagina* così oturàta si nòminano *Atrète* , e dèe l' *Ostetricante* persuadersi che ve n' à , perchè , siccome le sàvie Donzelle di rado s' accòrgono di questa non ordinària conformazion loro prima del tempo della mestruazione , e allòra soltanto non potèndosene evacuàre quel sangue , v' à il medesimo accumulàndosi nella *Vagina* stessa , e nella *Matrice* , distendèndole amendue ; così può dare ingiusto sospetto di *Gravidanza* . L' *Ostetricante* conoscendo gli accidenti , per motivo de' quali è chiamato , essere prodotti da questo inconveniente , pronùncia con ragione francamente , che non pòssono essere dissipati eccetto coll' incision della *Imène* , la quale eseguita da valente *Cerùsico* non può riescìre d' alcun pericolo . Cognizioni , e determinazioni , alle quali la sola *Esplorazione* può guidàre .

Le *Carùncule Mirtiformi* .

LXXII. Pretèndesi comunemente , che la Lacerazion della *Imène* per la Còpula dia luògo alla produzion delle *Carùncule Mirtiformi* , che sono ora tre , ora quattro membràne incarnàte , simili appunto ad altrettante foglie di *Mirto* , pendenti dall' Orificio della

della *Vagina*, assai meglio visibili, e palpabili nelle Giovänette, e nelle savie Zitelle, e solite a sparire ne' *Parti lunghi e laboriosi*; come altresì a cancellarsi affatto nelle Madri molto feconde, avanzate in età. E' certo, che se non è lacerata la *Imène* le *Caruncule* non possono osservarsi, perchè nelle Bambine, in cui l'anatomia le manifestò immediatamente al di sopra dell' *Imène*, distrutta collo scalpello, quelle non si sarebbero manifestate persistendo l'integrità di questa membrana. La struttura e l'uso loro è analogo a quello delle Ninfè.

La Vagina.

LXXIII. Più oltre delle *Caruncule* suddette il dito dell' *Ostetricante* insinuandosi in alto, pénétra nell' ampio, rugoso, dilatabilissimo canale membranoso detto *Vagina* perchè è destinato a comprendere nella Còpula il Membro virile, a contenere nel suo passaggio successivamente tutto il *Feto*, e perchè contiene nella sua estremità superiore il *colio*, e l' *orificio della Matrice*, a toccar il quale il dito dell' *Ostetricante* diretto a dovere, e colla necessaria delicatezza, nello stato naturale, e in Femmina di statura ordinaria, non incontra difficoltà.

LXXIV. La *Vagina* più stretta nelle Vergini à però varie dimensioni secondo che mutansi le circostanze: perciocchè se all' ordinario non ammette tre dita di fronte eccetto a stento, e se la sua lunghezza non supera tre oncie del piè Liprando, riducesi ne' sommi distendimenti a tre oncie d' ampiezza, e può allungarsi oltre a mezzo piè Liprando: cosa, che nelle *Vagine* estratte da cadaveri ottiensì dall' Anatomico anche senza che la rugosità delle parèti interne vengano cancellate. Anzi nelle Procidenze delle Matrici scirròse, e talvolta eziandio delle gràvide, si osservano allungamenti molto più considerabili accompagnati

32
da dilatazion tale, che sembra impossibile *Vagina* umana esserne capace. * Lo stesso vedesi ora più, ora meno nelle *Anteversioni*, e nelle *Retroversioni* dell' Utero.

La parte anteriore n' è molto più corta della

* Altrettanto maraviglioso è poi il vedere, che ricomposta la procidenza, ridotto il tovesciamento, la *Vagina* riacquista le naturali sue dimensioni. Quindi si ricava quanto ne sia grande l'elasticità, e la contrattilità della tessitura, che consiste in una gran *Lacina cavernosa*, o spugnosa, corredata di fasce carnee traversali rare, anzi reticolate, perchè gettano frequenti neri obliqui, ramosi, qua in su, là in giù, i quali s' intracciano, s' uniscono con quelli, che partono a vicenda dalle lastre contigue fibrose; così formano un vero piano muscolare.

Questo piano è più facile, che l'Anatomico lo dimostri all' altezza di tre dita circa dalla *Vulva*, che più verso il *Collo dell' Utero*, dove la spugnosità della *Vagina* è più morbida, più molle, e meno elastica, il collo suddetto supplendo per la forma sua contrattilità al difetto della medesima nella parte di cui si tratta.

Il tessuto spugnoso-carneo della *Vagina* è nella cavità del ventre vestito d' una robusta cellulare comune a tutte le sostanze contenute al di sotto del Peritoneo nel Catino. Nell' interno poi, cioè nel canale che s' indesci dalla *Vulva* al *collo dell' Utero*, il parete n' è tappezzato d' una continuazione della cuticola tutta crivellata, detta *Epitelio*, tutta rugosa per adattarsi alle rugosità del canale, fornite di gran numero di papille nervose, e di molte glandulette mucipare.

Le rughe frequentissime, delle quali favelliamo, nello stato naturale restringono, ed accorciano la *Vagina*, e nel tempo del *Parto* spariscono, permettendole d' allungarsi, e d' allargarsi quanto fa di bisogno; al che contribuisce pur anco la spugnosità indicata, la quale nell' estro venereo gonfia per le medesime cagioni rimote, e congiunte, non ancora ben cognite a Fisiologi, per le quali si tumefà la *Clitoride* nelle stesse *Femmine*, e ne' *Maschi* il *Pene*.

posteriore perchè la *Matrice* è naturalmente inclinata in avanti, il che ne fa immergere il *Collo* più abbasso all' innanzi verso il fondo del Catino; e perchè l' *Orifizio* della *Vagina* è per così dire tagliato obbliquamente dall' alto dell' arco del Pube al Perineo. In questi contorni v' è un plesso * considerabile di vasi, e di nervi, compreso tra due fascie carnose, che dall' Arco del Pube verso le radici della Clitoride discendono fino allo sfintere dell' Ano, e possono considerarsi come un muscolo stringitore: infatti nell' estro gonfiando il plesso di vasi accennato, e contraendosi tali fascie, l' *Orifizio* della *Vagina* considerabilmente ne viene ristretto.

LXXVI. E' finalmente da notarsi, che la direzione della *Vagina* fa un gomito a tergo con quella dell' Utero; cioè la convessità di tal gomito è verso

* In mezzo a questo plesso, nella robusta cellulosa che lo sostiene, s' incontrano due Glándule grosse talvolta come fagiulli che hanno un canal escretorio assai lungo, e tortuoso, capace di serbar nelle sue sinuosità molto dell' umore dalle accennate glándule separato. Vengono questi canaletti a sboccar a' lati dell' *orifizio della Vagina* coperti dal lembo pendulo delle Caruncule mirriformi, rovesciate le quali in su nella copula, o nella *esplorazione*, sprizza con impeto dalle boccucce di questi l' umor untuoso, di cui si parla.

Sonovi molte altre glandulette destinate a separar dal sangue, e a tramandar nel voto della *Vagina* abbondante mucosità, fra le quali meritano d' esser annoverate quelle due, che sull' orlo superiore dell' orifizio di questo canale, sotto le braccia del Pube nascoste, danno origine a due condotti, che si aprono al di sopra dell' orifizio dell' Uretra, giacchè per lo volume che talvolta acquistano, e per la situazione loro, fuvvi chi le nominò *Prostate Femminili*. E questo basti perchè sappia l' *Ostetricante* da quali fonti zampilli quell' umore, che talora molto abbondante, e fluido riempie, ed inonda nelle Donne salaci la Vulva nell'atto, ch' egli ne tenta l' *esplorazione*.

l'osso Sacro, e la concavità verso l'Arco del Pùbe; il che dee sapersi per evitar i falsi giudicii quando occorra d' esplorar lo stato di queste parti nelle *Gravide*, nelle quali fino all' ottavo mese l'accennata curvatura s' aumenta, e riducesi poi quasi a nulla nell' imminenza del *Parto*; il che colla *Esplorazione* agevolmente si riconosce.

LXXVII. Le connessioni della *Vagina* sono col collo dell' *Utero* in alto, che ne viene inguainato: in basso e all' innanzi col canale dell' *Uretra*, e con parte della porzione inferior posteriore della *Vescica*: addietro coll' *Intestino Retto*, che è un largo budello comunicante coll' *Ano* per trasmettere fuori del ventre per esso gli escrementi, de' quali essendo ripieno, e la *Vescica* piena d'urina, tale stringimento ne nasce nella *Vagina* all'ora tra que' due *Visceri* compressa, che tanto l'*Esplorazione*, quanto il *Parto*, ne provano ostàcolo. Si tacciono le altre connessioni per via della cellulosa, de' *Vasi*, e de' *Nervi*, che la *Vagina* * à colle altre parti contenute nel fondo del

* Caso raro, ma pur possibile, e da varii Autori narrato, anzi rappresentato in Tavole, si è l' incontro di due *Vagine* terminanti in una *Vulva* sola costringuta all' ordinario. Men raro è trovar la *Vagina* come divisa in due, o longitudinalmente, per un tratto considerabile dall' orificio dell' *Uretra*, o dalla *Fossetta navicolare* in su, o in traverso, ad un' altezza non determinata, sicchè trovissi diviso il canale in due seni, de' quali uno confina colla *vulva*, e l' altro col collo dell' *Utero*. Queste difformità possono essere congenite, o prodotte da malattie precedentemente sofferte, o presenti, come *Vagina aperta nell' Ano*, cicatrici irregolari, calli, scirri, e simili. Il Sig. BARBAUT narra di certe Donne, la *Vagina* delle quali s' apriva nell' *Intestino retto* perchè mancavano le parti esterne destinate alla generazione, e specialmente la *Vulva*. Egli pretende, che tal viziosa conformazione non le abbia rese nè sterili, nè incapaci di partorir felicemente: comunque sia stata la cosa, l' occhio dell' *Ofetrice* in quest' ultimo caso, e il

35

Catino, perchè l'esatta cognizione delle medesime s'appartiene assai più all'Anatomico, al Medico-Cerusico, che al semplice Ostetricante, e alla Mammana.

Gli Organi Genitali Interiòri, e prima l'Utero.

LXXXVIII. Intraprendendo ora la descrizione compendiosa delle Parti interiòri destinate alla *Generazione*, alla *Gravidanza*, e al *Parto*, che come dissimo già sono l'*Utero* co' *Ligamenti* suoi, le *Trombe*, e le *Ovaja*, ne esporremo quanto occorre per l'*Ostetricante*, tenendo l'ordine con cui quegli organi sono stati nominati. L'*Utero*, o *Matrice*, è quel viscerò covo, simile ad un pèro schiacciato, che trovasi al di sotto delle intestina nel fondo del ventre quasi in mezzo al Catino, tra la Vescica urinaria, e l'Intestino retto, coperto in gran parte dal Peritonèò come da un velo aderente al fondo, e al corpo suo, perciocchè il *Collo* o sia l'estremità inferiore dell'*Utero* stesso, che s'allunga in basso, insinuasi, ed è strettissimamente abbracciata dalla Vagina. Nello stato naturale tutto l'*Utero* è lungo due once circa, largo una alla sommità, spesso poco più d'otto linee del piè Liprando; e quest'asse minimo va dal Pube al Sacro: vale a dire siccome l'*Utero* è schiacciato al davanti e addietro, così à minor estensione per quel verso, che da' lati.

LXXIX. L'abbiam diviso in *fondo*, in *corpo*, e in *collo*. Il *fondo* è circoscritto da una linea immaginaria, che fingiamo passare per l'emersione delle *Trombe* del *FALLOPPIA* da' lati superiori del Viscero. Di là

e il dito esploratore negli altri, bastano per farci conoscere tali difformità, e guidarci a valutarne le conseguenze, sicchè possano prender a tempo quelle precauzioni, e metter in uso que' mezzi, che da tali circostanze verranno indicati, e dalla *Esplorazione* suggeriti.

comincia il *corpo*, che scende diminuendo d'ampiezza fino al sito, che dà attacco all'estremità superiore della Vagina. Da quel sito intino all'orlo dell'*orificio*, o sia *muso di tinca* palpabile nella Vagina stessa per via del dito esploratore, il restante dell'*Utero* *

* Quando l'Anatomico spacca la Matrice dal fondo al collo fra le *Trombe Falloppiane*, mentre che ne manifesta la cavità ristretta, e assai profonda verso i lati, ne palesa altresì la spugnosità delle pareti, spesse ordinariamente un quarto d'oncia; e fa conoscere, che la tessitura n'è molto più densa al collo, che altrove. Che se il taglio passa verticalmente per i lati, il che ne separa la metà anteriore dall'opposta, meglio si discerne la figura quasi triangolare della cavità, capace del nocciuolo d'un'amandoria colla punta in giù, leggermente concava alla sommità, con due piccioli forellini, o semicanali a' lati, per mezzo de' quali detta cavità comunica con le *Trombe*. Per mezzo di quest'ultima divisione si scuoprano nel pariete sì anteriore, che nell'opposto interno del collo, uno, o più tronchi vascolari a traverso dell'*Epitelio*, che stendesi a tappezzar tutto il *Cavo uterino*; e questi appariscono a guisa d'alberi assai eleganti, fra i rami de' quali risaltano varie glandulette, delle quali geme all'uopo il muco opportuno per dar a queste sostanze la dovuta mollezza, e lubricità.

Quell'*Epitelio* lanuginoso, che addittammo, è continuazione di quello della Vagina ripiegatosi sul collo dell'*Utero*, e su i margini dell'*orificio*, che n'è diretto in traverso: nè si distacca mai dalla superficie interiore dell'*Utero* stesso, come a torto s'immaginarono alcuni, e prima, e da poi che furono istrutti dall'*HUNTER*, che dopo il *Parto* se ne stacca una membrana detta per tal motivo *Decidua*, quasi che si dicesse *Caduca*. La *Decidua* è stata accennata e descritta dal *BERTRANDI* or sono trent'anni nel suo Trattato d'*Obstetricia*, sotto il nome di *fioccoso-filamentosa*; è una conseguenza della *Concezione*, e non à che fare colla *Matrice*, salvo nella *Gravidanza*: in fatti si separa facilmente, e s'evacua, mentre che l'*Epitelio* continua ad esistere, nè potrebbe separarsi dal pariete interno dell'*Utero* senza grave alterazion dell'intima sostanza di questo.

Tra

37

dicesi *Collo*, e n' è la sola parte non coperta del Peritonèo, bensì dall' integumento interiore della Vagina e dall' Epitèlio lanuginoso della medesima, nella quale si apre per via dell' *orificio* diretto in traverso, e formante due *Labbri* uno *anteriore* ed uno *posteriore* ordinariamente più breve, e men basso nella *Gravida*, massimamente vicina al *Parto*, il che è al contrario nelle *Virgini*.

La Cavità del Collo dell' Utero.

LXXX. Non è da confondersi la Cavità triangolare dell' *Utero* con quel *seno*, che presenta il *collo* verticalmente spaccato: questo scolpito più al basso, e lungo circa mezz' oncia, strangolato in alto, e ristretto in basso à quasi la figura d' un dattero. E' tappezzato della stessa membrana lanuginosa, che tappezza l' *Utero*, e vi si osservano certe rughe verticali, oltre a parecchie trasversali meno apparenti, che dipendono dall' esserne ristretto per via di certe fibre sommatamente estensibili l' *orificio*, e tutto il *pariete*, com' è la bocca d' un sacco da lavoro.

Tra i morbidissimi fiocchetti di lanugine, che si elevano sulla faccia dell' Epitèlio corrispondente alla cavità dell' *Utero*, si aprono innumerabili pori, e alcune comunicanti colle cavernose, tortuose sinuosità della spugnosa sostanza del medesimo; alcune di queste sul fin della *Gravidanza*, ed eziandio dopo il *Parto*, sono ancora per qualche ora capaci della punta del dito mignolo. Ivi s' aprono pure i condotti escretorii d' alcuni follicoli glandulosi destinati a separar quel moccio, di cui la cavità della *Matrice* è quasi sempre spalmata. Ivi pure metton capo le picciole estremità de' vasi inalanti, ed esalanti, de' quali il giudeo nell' Economia animale, e in quella de' vegetabili, è importantissimo, giacchè non avvi nè superficie, nè cavità, dove copiosissimi non s' incontrino.

LXXXI. Nelle Vèrgini in istato naturàle, e nelle di fresco incinte, quest' orificio è veramente chiuso: soltanto dilàtasi qualche poco nel corso de' mèstrui, e nelle ore che sièguono immediatamente questa peridica evacuazione. Quindi è, che molte Fèmmine, e specialmente le già ben adulte, che mai non ebbero prole, concepiscono più agevolmente in questa circostanza.

Quattro Caratteri del Collo, e della Bocca dell' Utero, da' quali si rilèva se la Donna sia Gravida, o nò.

LXXXII. Affinchè nell' *Esplorazione* riesca più facile il conòscere dal *Muso di tinca*, cioè dall' *Orificio* stesso dell' *Utero*, se la Fèmmine sia *Gravida* o nò, fa d' uopo riflèttere, che 1. quest' orificio inclina, come s' è già detto, verso l' osso Sacro, e nelle Zittelle, nello stato naturàle, il labbro posteriore non lascia d' essere alquanto più esteso in basso, nelle Fèmmine di bella statùra e proporzione immergendosi quasi un pòlice nella Vagina: 2. il diametro del *Collo* traversale supera il pòlice in lunghezza, mentre che l' altro dal Pube al Sacro appena arriva a mezz' oncia: 3. per trovar e debitamente esaminare l' *Orificio dell' Utero* conviène spingere il Dito esploratòre in alto assai verso l' osso Sacro.

4. La *Gravidanza* anche sul principio fa chiùdere più strettamente l' *Orificio dell' Utero*, lo fa elevàre molto maggiormente indietro, e ne rende duri, e resistenti i *Labbri* crespi, e quasi ritratti indentro e in sù.

Effetti del Parto relativi a' caratteri suddetti.

LXXXIII. Il *Parto* ordinariamente àltera in guisa così fatta i caratteri accennati, che dopo diverse *Gravidanze* non se ne può quasi più far caso,

perchè in alcune Donne l' *Utero* non si può più rialzare come dovrebbe, ed occupa col suo *Collo* più voluminoso il fondo del *Carino*, il *Muso di Tinca* rimansi grosso, ritondato; e l' *Orificio* resta dilatato con i margini disuguali per li solchi, e le prominenze, che vi si sentono col dito: e que' solchi riescono tanto più larghi, e profondi quanto più *laboriosi*, e numerosi furono i *Parti* precedenti, e più violenti stracchiature, più profonde lacerazioni il *margine dell' orificio* dovette soffrire assottigliandosi, e dilatandosi per dar esito a' Bambini, e fors' anco agl' *Instrumenti*, e alle mani dell' *Ostetricante* *.

Vasi, e Nervi dell' *Utero*, e della *Vagina*.

LXXXIV. Nella sostanza della *Matrice* del pari, che in quella della *Vagina* si diramano vasi sanguigni arteriosi, e venosi, ** vasi Linfatici, e Nervi in quantità grande.

* Dee osservarsi però, che gli *Anatomici* in alcune *Zitelle Vergini*, fornite d' Imene, trovan tuttavia rugoso, ora disuguale, or aperto l' *Orificio dell' Utero*, fors' anche più di quel che talvolta s' incontri in Donne Madri già di parecchi figli, acciocchè gli *Ostetricanti* non prevenuti di questo, fondati su tali argomenti soltanto, non ardiscono pronunciar, che la *Zitella* fu *Gravida*, e à già partorito, senza prima assicurarsi dell' assoluta non equivoca concorrenza d' altri indizi tratti dalla rugosità, dalla grande flacidezza della pelle del *Ventre*, non proceduta da superata idropisia ascite, o cistita, nè da dissipate enormi ostruzioni; dal volume, e dal calore de' *Capezzoli*, delle *Areole*, e del corpo stesso delle *Mammelle* ec. ec. Quando si tratta della riputazione, della libertà, e fors' anche della vita d' una *Femmina*, faremo noi abbastanza temerari, e crudeli per fidarci ad un indizio fallace ed equivoco, e dirigerlo contro di essa?

** Le *Arterie* che si distribuiscono per la *Matrice*

LXXXV. L' *Utero* mantenuto in mezzo al fondo dell' *Abdòmine* anche per via d'alcune produzioni,

vengono dalle *Spermatiche*, e dalle *Ipogàstriche*, e portandosi su i lati della medesima penetrano nella sostanza ripiegandosi all' indietro, in mille guise, prendendo mille direzioni diverse, intrecciandosi, e congiungendosi insieme, i quali congiungimenti bocca a bocca de' vasi, diconsi *anastomosi*. Da tali *anastomosi* ed intrecci risultano innumerabili spaziolini vuoti, cavernosi, da' quali traggono origine le vene compagne delle *Artèrie* mentovate, moltissimi rami delle quali mettono foca in un genere particolar di ricettacoli sanguigni, dal sito in cui si trovano detti *Seni Uterini*, ove il sangue deposto dalle *artèrie* assorbesi per mezzo delle vene, che lo riconducono al torrente della circolazione, salvo quello, che di mese in mese va colando dalle pareti interne della *Viscera*, che descriviamo, periodicamente. Simile evacuazione o spurgo salutare, nel bel Sesso dura dal quattordicesimo anno circa fino al quarantesimo ottavo; circostanza, che dall' *Ostetricante* nell' atto dell' *Esplorazione* non dee obbliarsi.

La distribuzione accennata de' *Vasi Uterini* siccome guida il Fisidlogo a capir molti fendimenti riguardanti le Femmine e sane, e ammalate, e incinte, e puèrperè; così non debb' esser ignorata dagli *Ostetricanti* ove vogliano appagar e la propria immaginazione, e la curiosità delle Persone di buon senso, dalle quali sovente sono ininterrogati: ma quel che più importa, ove occorra loro di por qualche riparo, ovvero di secondare, anzi talvolta di promuovere gli effetti sensibili, che ne derivano, a tenor delle urgenze.

Inoltre sògliono i *Seni Uterini* essere assai più ampli a' lati della *Matrice*; sicchè non dobbiamo porre in non cale simile circostanza nel caso in cui debbasi intraprendere l' *Operazion Cesare*.

Abbondantissimi *Vasi Linfatici* à la *Matrice*, e negli ultimi mesi della *Gravidanza* rendono molto più apparenti per l' aumento considerabile, che ne proviene del

allungamenti, doppiature del Peritonèò, che dall' uso, e dalla figura loro àn nome di *Ligamenti*, e l' epiteto di larghi, e di rotondi; dal sito diconsi anteriori, laterali, e posteriori.

Ligamenti Larghi .

LXXXVI. Per farci un' idèa chiara de' *Ligamenti larghi dell' Utero* è da supporre, com' è infatti, che il Peritonèò cuoprendo il fondo, e il corpo del medesimo si raddoppi in traverso, e così divide orizzontalmente e lassamente la cavità del Catino nella Sezione inferiore. L' inferior lāmīna di tal raddoppiamento, dopo d' aver lasciato spazio sufficiente alla *Matrice*, che n' è stretto avvolta *, s' incolla contro

calibro loro; all'ora riesce molto facile distinguere le due classi fissate dal CRUIKSHANK, una delle quali accompagna i vasi ipogastrici, e l' altra gli spermatici.

Gioverà pure all' *Ostetricante* esser avvisato che questo Viscero è doviziosamente fornito di Nervi procedenti da' Plessi Renali, e dagli Ipogastrici, a' quali si uniscono diramazioni de' Simpatici Maggiori, e Mezzani, e de' Sacri, perchè il sapere com' essi scambievolmente comunicano insieme, e s' intracciano, e il non ignorare il commercio estesissimo, che ànno con que' di tutte le altre parti principali del corpo, rende agevole l' appagare coloro, che con ragione si maravigliano che tutta la Macchina abbia relazione coll' *Utero*; che il rùvido contatto della superfscie interiore di questo nelle operazioni dell' *Ostetricia* svegli sensazioni moleste, anche stravaganti in parti assai rimòte; e che i sintòmi prodotti dalle malattie, che l' interessano, àbbiano così grandi varietà.

* Nè vi crediate, che l' uso unico de' *Ligamenti larghi* sia di tener fisso l' *Utero*: persuadetevi anzi, che il Peritonèò nel Catino si ripiegato, e crespo, e tale per servir di vāldo integumento uniforme, ed esatto a quel viscero nel tempo della *Gravidanza*; In fatti nel non mese que' *Ligamenti* più non si veggono, perchè

la superiore per via di robusta cellulosa, e insieme riunite formano quelle due larghe falde state da alcuno paragonate alle ale de' Pipistrelli, spesse ed alquanto elevate in due parti a cadaun lato. Delle citate elevazioni trasversali bislunghe, l'una contiene la *Ovaja*, e l'altra sostiene la *Tromba del FALLOPPIA* da cadaun lato.

Quattro Ligamenti Rotondi Principali.

LXXXVII. I *Rotondi* principali sono quattro allungamenti della stessa membrana, che discendono dalle parti laterali superiori dell' Utero due al davanti, e due addietro, che si rendono più manifesti alquanto più basso dell' inserzione delle *Trombe* in esso. Gli anteriori piegansi verso del Pube, per venir ad uscire dagli Anelli de' Muscoli obliqui esterni dell' Addomine, e discender alle anguinaje, nella pinguedinosa tela delle quali finiscono vicino alle grandi Labbra della

sonosi *espansi*, spiegati, ed impiegati a cuoprirlo a misura, ch' esso venne sviluppandosi, e che acquistò sempre maggior volume. Inoltre i Vasi tanto sanguigni quanto linfatici, de' quali fecimo poco fa menzione, erano maravigliosamente ripiegati, aggomitolati, flessuosi, serpentinati fra le descritte lamine o piegature de' *Ligamenti Larghi* prima della *Gravidanza*: inoltrandosi questa si svolgono, e i *Ligamenti* stessi concedono a contenergli, a dirigerli verso l' *Utero* contro cui gli tengono sempre più esattamente applicati, e a difenderli dal soverchio dilatarsi, e dal rompersi. Sgravata del Fero la Donna se non ispurgasi bene, se il Peritoneo debitamente non torna a raccogliersi, a spremere colla propria elasticità l' umor soverchio diffidente i vasi suddetti, se l'umor latticinoso, se il siero se ne scarica nel tessuto cellulare, queste deposizioni riescono pericolose talvolta, e per lo più ostinate, e ribelli. Quindi si comprende la molteplicità degli usi, e l'importanza de' *Ligamenti larghi della Matrice*.

Vulva. Ivi si dividono come zampe d'oca, portandovi que' vasellini, e que' nervetti, che tràggono da' Plessi Renali, e da' vasi spermatici, i quali uella *Gravidanza* empiendosi talora strabocchevolmente di sangue, gonfiano, aumentano con incòmodo il volume de' cordoni stessi, gli rendono rossi come se fossero carnosi, e tormentano le povere Donne sì nello stato predetto come in altre indisposizioni della *Matrice*, o delle *Ovaja*.

LXXXVIII. I *Ligamenti rotondi posteriori* visibili quando l' Utero si trae con forza verso il Pube, o verso un de' fianchi, sembrano nascere più basso degli opposti, e molto più vicini l' un dell' altro: infatti congiunti per mezzo del Peritonèo formano tra la Matrice, e l' Intestino retto un Arco, le corna di cui vanno a piantarsi ne' Ligamenti, che uniscono il Sacro a gl' Ilii. S' attribuiscono alle stracchiature, agli stendimenti loro le doglie, che fannosi sentire al Sacro, e a quelle Sinfisi, nelle ultime settimane della *Gravidanza*, e in alcune procidenze dell' Utero.

Due Ligamenti larghi anteriori inferiori.

LXXXIX. Due altri *Ligamenti larghi anteriori inferiori* si veggono tral corpo dell' Utero, e la Vescica urinaria, quando sollevà questa sul Pube sollevasi altresì, e traesi l' Utero stesso all' indietro. Sono tutti della medesima struttura, e servono alle stesse cose, che i laterali.

Le Trombe Falloppiane.

XC. Le *Trombe Falloppiane* sono due condotti lunghi un' oncia e mezza, tortuosi, e come divisi per traverso in tanti piccioli gozzi da alcune strozzature ove più, ove meno apparenti, e profonde. Nascono da' lati del fondo dell' Utero, del quale sembrano

vere produzioni, o appendici, e sono angustissime al nascer loro, di modo che il canale, che formano, in quel sito, ammette appena uno stil sottilissimo. A misura, che s' allungano, ingrossano, e il calibro se ne allarga; sebbene al luogo delle strozzature torni a restringersi, massime dov' è alla metà del corso delle *Trombe* la principale. Dilatasene tosto nuovamente il voto, e dopo uno spazio notabile soffron novella strozzatura, quasi come quella delle maniche della camicia a' carpi; e dall' orlo di questa, o sia dal margine del foro angusto, che lascia, pende una larga frangia, o manichetto crespo, frastagliato al suo lembo libero, elegantissimo, il quale con molte linguette, che sembrano al colore, e all' azione loro, carnose, può fluttuar, ed agitarsi liberamente nella cavità del Catino sopra la *Ovaja*. Questa loro tortuosità, il canale che rinchiudono, e quell' imbuto, o manichetto, che pur or additammo à fatto meritare il nome di *Trombe* a questi due leggiadri condotti, e *FALLOPPIA* sommo Anatomico Modonese, che fu il primo a darne la più esatta notizia, à la gloria di vedervi annesso dalla riconoscenza de' Posteriori anche il proprio cognome. *

XCI. Il *Manichetto*, *Frangia*, o *corpo fimbriato* delle *Trombe*, detto pure *Imbuto* da alcuni, e da' Franzesi il *Padiglione*, è con alcune sue linguette, o

* La struttura delle *Trombe*, serbata la proporzione della spessezza de' parieti, è a un di presso simile a quella dell' Utero. Sotto la tunica derivante dal Peritoneo si scuoprano fibre simili alle carnose, che sieguono varie direzioni, e che sono capaci di contrazione, e d' allungamento, sostenute da un robusto sottile tessuto cavernoso, fregiato di vasi, e di nervi in tutta la sua estensione; e questo interiormente è tappezzato da un allungamento del Peritoneo ripiegatosi nel concavo del manichetto, e scorrente per lo canal delle *Trombe*, attenuandosi sempre più, fin verso la cavità stessa dell' Utero.

frastagliature, aderente all'*Ovaja*, di modo che ne' movimenti interpi, compagni della *Fecondazione*, commossa questa, distratte le *Linguette*, si eccita l'irritabilità del restante della *Frangia*, la quale forse coll'altre *Linguette* fa come le dita delle mani, abbracciando l'*Ovaja* medesima, e v'applica l'*Orificio* della *Tromba* in guisa, che questa trasmette sull'*Ovaja* ciò, che deriva dal *Maschio*, s'è veramente indispensabile, che niente ne arrivi fin là; ovvero può riceverne quello, che la *Femmina* credesi dover somministrare perchè la *Fecondazione* sia compita, e il bisognevole ne sia trasmesso nell'*Utero*. *

XCII. Le *Ovaja* sono que' corpi biancastri, in grossezza, ed in figura simili ad una fava mediore, appiattita al davanti, e addietro, quasi tagliente al margine, con cui sta immersa nella sostanza de' *Ligamenti larghi*; sono collocata a' fianchi dell'*Utero* in distanza di circa un' oncia dal medesimo, sostenute dal lembo superior posteriore de' *Ligamenti larghi*, e più strettamente colligate coll'*Utero* per mezzo d'una specie di cordone appartenente a' suddetti, affisso alla *Matrice* dietro alla inserzione delle *Trombe* in essa.

* Comunque ciò sia, a tenor almeno della struttura e delle relazioni, che passano vicendevoli tra le *Trombe* coll'*Utero*, e con le *Ovaja*, non sembra dubbio, che la funzion loro consista nell'abbrancar queste, e riceverne ciò, che le *Ovaja* vi trasmettono spingerlo, per lo vermicolare movimento, di cui supponiamo dotate le *Trombe* stesse, verso la cavità dell'*Utero*: e siccome alcuni *Fisiologi* pretendono, che nell'atto della *Concezione* si staccasse uno, o più *Uvicini* dell'*Ovaja*, il quale spinto nella *Tromba* quindi venisse guidato nell'*Utero*; così alle *Trombe* è stato pur dato il nome Latino *Ovidutti*, cioè *condotti dell'Uovo*. In conferma poi dell'opinione, che tal uso abbiano le *Trombe* si portano gli esempi delle *Gravidanze*, ch'ebbero principio, sede, e termine ordinariamente funesto nelle *Trombe*.

Gli Antichi le consideravano come corpi glandulari, e molti le dissero *Testicoli Femminili*, atti a filtrare un liquor prolifico simile al Maschile. Varii Moderni osservandovi costantemente un numero di vescichette piene di liquor albuminoso, simile al bianco d'uovo, le supposero riserbatoj delle uova. *

* Non ci maraviglieremo adunque se, a norma dell'idea diversa, che gli uomini si fabbricarono per riguardo delle *Ovdia*, diverse opinioni regnarono intorno al Mistero della *Generazione*. Perciocchè se alcuni giudicarono dipender essa dalla mescolanza delle due semenze mascolina, e femminile, altri dalla fecondazione dell'uovo preesistente nella *Ovdia* femminile per via d'un vapore esalante dallo *Sperma* del Maschio, detto *Aura femminile*, ovvero per lo contatto dello *Sperma* lanciato dal Maschio nell'Utero, trasportato dalle Trombe sulle *Ovdia*, non debbo lasciarvi ignorare, che la scoperta degli *Animalletti*, o *Anguillette* spermatiche messa in gran luce dall' HARTSOEKERO, accolta con entusiasmo da un partito rispettabilissimo, negata da' Naturalisti, da Fisiologi d'altissima fama essi pure, à daro luogo a nuovi sistemi, per cui altri alla Donna merito alcun non lasciava nell'opera importantissima della Propagazione della Specie Umana, eccetto quello d'apprestare nella Matrice il recipiente della nostra macchina già preparata, benchè picciolissima, intanto che faceva somministrare dal Maschio gli ammirabil *Vermi*.

„ Nati a formar l'Angèlica Farfalla.

Fuvvi altresì chi, ammettendo il *Verme*, nell'*Uovo Femminile* pretese trovarsi il primo a lui necessario nutrimento; sicchè portandosi all'*Ovdia* per la via della Tromba, e del cavo *corpo Luteo*, e penetrato nell'uovo, co' movimenti, e coll'ingrossamento suo, fradicasse l'istesso suo ricetracolo: il quale trasmesso nell'Utero, ivi il *Verme* ricevesse poi quello sviluppo secondario, che si compisce nel *Parto*, intanto che le fimbrie del guscio membranoso squarciato riduceansi a radici per la *Placenta*.

Argomenti anienì, curidì, specidì, i quali però non servono per l'*Ostetricante* salvo a manifestar la cultura, che egli à procurato di dare al proprio spirito nella ricerca

di

XCIII. Le *Ovaja* sono tanto necessarie per la propagazione degli Uomini, de' Quadrupedi, degli Uccelli ec., che basta privarne la Femmina per condannarla a perpetua sterilità.

La Esplorazione, ed il Metodo di farla.

XCIV. La *Esplorazione* si fa dall' *Ostetricante* colla punta delle dita indice, o mezzano insinuata nella Vagina come per ispiare ciò, che in fondo a questa s'incontra.

XCV. Per conoscere le diverse apparenze, colle quali il collo, e l'orificio dell' Utero ci si presentano ne' diversi tempi della *verginità*, della *gravidanza*, e

di quanto concerne la sua professione, anche per avventura meno direttamente, come a' Naturalisti non servono, che a metter in esercizio le belle facoltà intellettuali onde sono dotati. Noi perciò prescindendone, daremo un rapido sguardo alla diversa qualità, e all'origine de' Vasi, che irrigan le parti ultimamente descritte, agl' involucri delle *Ovdia*, e all' uso loro tanto diretto, quanto relativo.

Queste, le Trombe, e i Ligamenti dell' Utero sono irrigati da' vasi propriamente detti *spermatici*, che sono Arterie, e Vene, derivanti dall' Aorta e dall' Emulgente, o Renale le prime, scaricantisi le ultime quà nella Gran Vena Cava ascendente, là nella Vena Renale. Tutti questi vasi fan nelle Femmine riguardo alle *Ovdia* e alle altre parti vicine, come negli Uomini relativamente a' Testicoli, cioè a forza di suddivisìoni, d'intrecci, d'anastomosi costituiscono due lunghe, ed ampie reti piramidali vascolari, che per qualche rassomiglianza loro co' pampini delle viti allorchè sono insieme avviticchiati, intrecciati, confusi, ebber nome *Corpi Pampiniformi*. Cinque o sei rami de' corpi suddetti vengono a cadauna *Ovdia*, il rimanente per la faccia posteriore del Peritonèo flessuoso si spande ne' Ligamenti, nelle Trombe, e specialmente nella faccia posteriore e quindi per tutta la sostanza dell' Utero. Non mancano
le

del *puerperio*, non abbiain quasi altra guida men fallace del tatto, che dee supplire alla vista, quasi sempre inutile per lo naturale, o affettaro pudore delle Femmine, che si debbono esaminare, tanto per dissipar i dubbi, quanto perchè la sicurezza dell'attuale stato loro ne interessa la sanità, le sostanze, l'onore, e fors' anco la vita di diversi individui.

Avvedutezza e Probità necessarie all' Esploratore specialmente in otto circostanze.

XCVI. Convienè pertanto adattarsi con prudenza nell' *Esplorazione* 1. alla figlia, che ne ignora le conseguenze, perchè realmente non è colpevole; 2. alla

le *Ovdia* di Vasi linfatici, che ne percórrono visibilmente la superficie, che suol esser pallida, e fregiata di qualche punterello acqueo, detto *Idatide*.

Termineremo il discorso nostro sopra questi organi ricordando l'irritabilità, e la sensibilità loro dipendente da' Nervi, che anno comuni coll' Utero; la grande loro estensibilità manifestatasi nelle Ostruzioni, nelle Idropisie, nelle *Gravidanze* in essi osservate.

Ciò dimostra, che il tessuto loro intimo, tutto che in parte vasculare, è però celluloso, e spugnoso; che il Peritonèo di cui sono vestite le *Ovdia* è liscio, e teso nelle Giovinette, e nelle Vispe fino all' età di quarant' anni circa; ma diventa grinzuto, e crespo nelle Vecchie. Questa lamina del Peritonèo inoltre mentre dura la *Fecundità*, è quà e là sollevata da elevazioncelle tondeggianti come grani di miglio, diáfane, le quali nell' appassimento universale svanendo, e lasciando anzi altrettante fossette di color più fosco, ed essendosiene per avventura nel cadavere di qualche Donna osservato un numero proporzionato a quello de' figlii avuti, questa osservazione diede motivo di considerarle come altrettante cicatrici lasciatevi dalle *Ova*, che o usciron intiere dalle *Ovdia* rompendo la lamina del Peritonèo nell' atto del Concepimento, o si votarono nella Tromba per la semplice rottura, che in que' momenti ne accadde.

sventurata, che per sua colpa ne teme, o che per colpa altrui à perduta la verginità; 3. all' inferma, che abbisogna di medicamenti gagliardi; 4. alla vedova perseguitata, o presa in diffidenza; 5. alla colpevole condannata a morte, che per prolungar i suoi giorni si dichiara gràvida; 6. alla accusata d' infanticidio, 7. o d' aborto volontario, 8. o d' ascondimento della prole, e simili.

Come si perfezìoni l'Esploratore.

XCVII. Ma più che altra cosa conviène, che l'*Ostetricante* contragga a forza d'esercizio, e di seria attenzione, quando le occasioni son poco frequenti, un àbito alla *Esplorazione* per farla poi con frutto; massime trattandosi di scuoprir se *vergine* ancor sia una Fèmmina, o già *sforata*, e s'altra sia veramente *incinta* ne' primi mesi, a tenor del sospetto, che sen' à. E' pure indispensabile di conoscer bene lo stato naturale delle parti da esplorarsi, se vogliamo da' segni, dagl' indicii negativi, soli capaci di guidarci alla cognizione de' positivi, esser posti nella circostanza di rettamente giudicarne.

XCVIII. A tal fine dee l'*Ostetricante* cominciare ad esplorare lo stato delle parti genitalli sopra diversi cadàveri d' età differente, e di corporatura: successivamente, colla maggior onestà, e decenza possibile, abbraccerà l' occasione d' esaminar Fèmmine *non incinte*, collocandole senza affettazione in situazioni diverse per adempiere all' obbligo, che gli corre, e intanto abilitarsi a conoscer, e giudicare del natural volume, peso, e mobilità della Matrice; qual sia l'ampiezza, e la profondità, quale l'ordinaria rugosità della Vagina; quale la durezza, la lubricità delle labbra della Vulva, e delle Ninfe; quale la figura, la direzione, la situazione del collo, e dell' orificio dell' Utero.

XCIX. Alla mancanza di occasioni abbastanza frequenti per ottenere l'intento, dee l'*Ostetricante* industriarsi di supplirvi coll' assidua lettura de' trattati all' arte sua relativi, e col farsene spiegar da' Cerusici, e da' Medici capaci, quegli Articoli, che meno capisce, onde ricavarne quel profitto, che dallo sviluppo teòrico di tali materie à ragion di sperare.

Tre attenzioni che rendono utile l' Esplorazione.

C. Affinchè riesca utile la *Esplorazione* fa d' uopo, che l'*Ostetricante*: 1. netti, o si valga della circostanza, in cui la Donna à le grosse intestina, e la vescica sgombre d' escrementi, e d' urina: 2. la collochi nella situazione, in cui i Muscoli dell' addomine sono rilassati: 3. Ne faccia cangiar la situazione qualor occorra d' assicurarsi sempre meglio dello stato de' visceri, ch' egli esamina, e di rimuovergli ostacoli, che mediante le precedenti situazioni non si sono potuti evitare. Così ora gioverà, che la Donna si corichi sul dorso colle spalle alquanto elevate, le coscie piegate, le ginocchia alte e alquanto scostate: ora stia in piedi appoggiata con i reni alla sponda del letto, e col ventre incarcato: ora appoggiando i gomiti sul letto co' reni incurvati: ora finalmente si metta in ginocchioni, e stia appoggiata, col capo chino sugli avambracci; ora si trovi ritta su' piedi in faccia all' *Esploratore*, ec. ec.

Metodo di Esplorare.

CI. L'*Ostetricante* colle ugne delle dita esploratrici nè lunghe, nè troppo recentemente recise, nè diffornate da angoli, ò da squame, intrise in burro, òlio, o manteca dolce, e molle, sì per non offendere le parti delicate, in cui anno da insinuarsi, come per non contrarre erpeti, ed altri incomodi per contagio quando si tratta di Donne da partito,

le insinua a poco a poco, in esso l'indice, o il medio, e l'indice uniti nella Vulva, portando quel della destra in modo, che coll' uña sia rivolto verso il labbro sinistro, e facendolo scorrere tra le Ninfie, verso il Perineo, o facendolo scorrere fra le natiche dall' Ano per lo Perineo nella fossa navicolare e su per la Vagina. Colà penetrato si dee volger la palma della mano in su, o in avanti; e intanto, che si piegano le altre dita, si fa strisciare l' esploratore tanto in alto quanto è possibile, senza urtare violentemente colla punta nel collo dell' Utero, che chiude in alto la Vagina, e senza contondere colle altre dita le labbra della Vulva, nè graffiare. Se poi dovesse valersi della man sinistra, l' unghia del dito esploratore dovrebbe corrispondere al labbro destro della Vulva; e in questo caso l' Ostetricante dee trovarsi o alla destra della Donna, quando essa è supina nel letto, o immediatamente davanti alla medesima; il che non favorisce tanto il concorso della mano destra sul ventre come lo starvi al fianco.

CII. Che se o per asma, o per idropisia, o per altro motivo, l' *Esplorazione* dovesse farsi trovandosi la Donna in piedi, l' *Ostetricante* dovrebbe mettersi comodamente a sedere assai basso; e se vuol servirsi della mano destra; faccia accostar la Donna di modo che abbia il fianco destro in faccia a lui, e la gamba del medesimo lato fra le sue, gli volga poi il fianco sinistro un' pò obbliquamente, se l' *Ostetricante* vuol esplorare colla man sinistra. E questo basti intorno al metodo di *Esplorare*.

Fecondità, e Sterilità in generale.

CIII. Intendasi per *Gravidanza*, la presenza d'un corpo prodotto per la *Fecondazione*, e cresciuto nell' Utero, o nelle dipendenze interne di questo; oppure nel *Ventre della Femmina*. Dalla presenza di tal corpo procede l' accrescimento graduato, successivo di

volùme del Ventre medèsimo; donde altresì derivano cangiamenti sensibili nelle *Parti esteridri della Genèrazione*, dove la *Fecondazione* à avuto luogo.

La Fècondità, e la Fecondazione.

CIV. Dicesi *Fècondità* la buona disposi^zione, di cui gode la *Fèmmina*, ad aver *Prole*, a concepire, a generare; altre volte per *Fecondità* s' intende l'atto stesso per cui la *Donna* o altra *Fèmmina* concepisce; anzi talvolta eziandio la molta *Pròle*; e s' applica ad amendue i Sessi allorchè gl' Individui sono di buon temperamento, ed attualmente atti, o già stati capaci di generare, e d' aver Figlii.

CV. La *Fècondazione* è quella special azione, cui mediante la sostanza *Fecondatrice* d' amendue i Sessi ricève quelle modificazioni, che sono indispensabili perchè ne risulti un corpo capace di vita, d' accrescimento, e della facoltà di perpetuare la propria specie.

CVI. Non ci arresteremo nella ricerca delle proprietà, che debbono avere le sostanze fecondatrici, e le fecondabili; nè pronuncieremo, che sia il *Maschio*, o la *Fèmmina*, che somministri nel còito l'una piuttosto che l'altra di queste sostanze; diremo soltanto, che l'atto del *Fècondamento* appellasi anche *Genèrazione*; e che l'opposto della *Fècondità* è la *Sterilità*, vizio dal quale possono esser attaccati amendue i Sessi. E per restringer il nostro ragionamento a ciò che riguarda la *Fèmmina*, siccome diciamo *fèconda* quella, che è capace di concepire, e divenir *Madre*, così *stérile* nominiamo quella, in cui mancano affatto queste facoltà o per la viziosa struttura, o per l'alterata natura delle parti a tal funzione destinate, e degli umori in tutta la massa del corpo, o nelle parti suddette circolanti,

*Se si diano indizii, che assolutamente Feconda,
sia una Donna.*

CVII. E' egli possibile dimostrare, che una Donna sarà assolutamente *fecunda* per mezzo del più attento esame di tutto ciò, che à relazione più immediata coll'attitudine ad esserlo? No certamente: e non si può da verun prudente *Ostetricante* pronunciar *assolutamente sterile*, avuta la medesima scrupolosissima attenzione, nissuna Femmina: perciocchè i vizii di struttura delle parti esterne, la mancanza d'alcune, i tumori, i frèni, le cicatrici, le callosità, che ne angustiano la Vagina, o vi reudon impossibile l'introduzione dell'*organo Maschile*; anzi la quasi totale *imperforazione* per l'ampiezza della Imene, sono incertissimi argomenti di *sterilità*, del pari che alcune apparenti malattie dell'Utero, delle Trombe, delle Ovaja; la situazione non naturale del Muso di Tinca; la mancanza, il disordinato, l'eccessivo profluvio de' mèstrui; il fluore bianco; la magrezza estrema, l'obesità; l'avversione al còito, e simili; potendo tutti, o gran parte di questi creduti impedimenti, esser rimossi talvolta dalla Natura sola, sovente col mezzo de' Medicamenti, da alcune infermirà, e non di rado altresì dalla mano del Cerusico.

Della Sterilità nelle Donne.

CVIII. Uniche reali, apparenti cagioni di *sterilità* nelle Donne per ogni altro risguardo sane, souo l'otturazione totale della Vulva, o della Vagina, o della Matrice: le altre sono recundite incognite all'occhio, e alle dita dell'*Ostetricante*, e del Cerusico, o impenetrabili a' lumi della ragione, perciò nascoste agli Assistenti, che vedono, e sentono con grave rammarico le inquietudini, e le querele delle Donne, le quali

piene d'ardente brama d'aver prole, e colle disposizioni le più favorèvoli in apparenza, pure non ne possono ottenere. Che in certi casi poi la *sterilità* da esse dipenda, o dal Consorte, non è sempre lecito decidere. Varii Maschi stati considerati un tempo come *impotenti* con una Donna, in un altro n'ebbero replicata prole; o almeno ne ebbero da altra Femmina. Lo stesso accadde di varie Donne collocate da varii anni nella classe delle *stérili*.

Di tre specie di Sterilità nella Donna.

CIX. Premesse queste nozioni generali dopo, che avrèmo detto la *sterilità* essere di tre specie, *Absoluta* qualora dipende da vizii incurabili delle Parti della Generazione; *Relativa* allorchè trae origine da mala organizzazione naturale, o accidentale, capace d'essere corretta col mezzo dell'Arte; *Possibile* sempre che preesistendo certe malattie nelle Femmine, la *sterilità* ebbe luogo tante volte, che molti giudicarono tali malattie costanti cagioni della medesima; indicherèmo, che

Sterilità Assoluta.

CX. Gli *Ostetricanti* della *Absoluta* non possono dar giudizio fuorchè in tre circostanze:

Nella mancanza totale dell'Utero,
Nella estrema picciolezza, e
Nella estrema durezza del medesimo.

Sterilità Relativa.

CXI. Troviamo indizi della *Sterilità Relativa* in quattro casi:

Nell'Imperforazion già detta della Vulva,
della Vagina, o dell'Utero;
Nelle tortuosità, obblighità, strettezze gravissime delle medesime parti:

Nell' eccessiva dilatazione , e debolezza d' esse , sicchè o sieno costantemente procidenti , o incapaci di contener la sostanza fecondata senza il soccorso dell' Arte ;

Nè tumori , e altri vizii delle Trombe , e delle Ovaja , sensibili , e palpabili anche a traverso degl' integumenti dell' Abdòmine .

Sterilità Possibile .

CXII. Conosciamo finalmente la *sterilità possibile* per via d' otto segni principali , che sono : 1. L' irregolarità de' Mèstrui ; 2. la obliquità ; 3. la Esulcerazion della Matrice ; 4. la grave Disposizione infiammatoria della medesima , indicate dalle dòglie essenziali , e dello spurgo costante , o periodico , o irregolare dall' Orifflcio della stessa di matèrie purulente ; 5. la soverchia dilatazion di tale Orifflcio ; 6. il rilassamento , e la fiacchezza della Vagina ; in settimo luogo l'evacuazione abbondante d' umori gialli , mocciosi , acètrimi per la Vulva ; 8. finalmente i sensibili effetti della Rachicace .

Vantaggi che si traggono dall' esame delle circostanze esposte .

CXIII. A tutte le circostanze accennate fa d'uopo , che l' *Ostetricante* sappia dar il peso convenevole , e ciò del pari affin di non condannare ad un perpétuo celibato la Zitella , che mediante la cura opportuna , e fors' anche per via della sola Còpula , rendersi potrebbe vantaggiosa colla sua pròle alla società ; che affrue di non esporre a patimenti orribili , a disgusti penosi , a probabilità di morte , quella infelice , che non accoppiandosi in matrimonio avrebbe passata vita più tranquilla , e più lunga . Le stesse circostanze ben conosciute , e valutate talvolta procureranno , che non

si sciòlgano ingiustamente i sacri vincoli conjugali , con grave danno delle parti in procinto di separarsi ; come altre volte promuoverebbero tale scioglimento quando mancassero i requisiti necessari , e quando non potrebbero i Consorti convivere insieme senza scandalo , e senza colpa .

Il Concepimento .

CXIV. Infra la multiplicità de' segni indicanti il *Concepimento*, ossia compiuta la *Fecondazione*, molti sono equivoci, e gran parte degli altri, presi da se soli, non può dar lumi bastevoli a fissarne la certezza. Quell' effetto però, che due o tre non producono, lo possono produrre otto o dieci, purchè l' *Ostetricante* prudente, ed istrutto sappia farne la debita combinazione. Ne diremo qualche cosa perchè ne' casi ambigui, ed in ispecie trattandosi di somministrare vigorosi medicamenti, d' aprire le vene de' piedi, o di richiamare il corso de' mestrui sospeso, o di pronunciar sulle istanze del Fisco, la *Levatrice*, e l' *Ostetricante* diano saggio della perizia loro, e il Medico non esponga il Feto innocente al rischio di perdersi immaturo. Se non à preceduto la còpula del Maschio colla Femmina, o la introduzione della sostanza fecondatrice mascolina nelle parti Genitali femminili, e se l' uovo, e l' altra non erano atti alla *Generazione*, esèmpio non si dà nella spècie umana di fattasi fecondazione, checchè siasi pubblicato da Scrittòri d' osservazioni troppo creduli, come furono *AMATO* Portoghese, il *SALMUZIO*, ed altri anche moderni, stati a giusto titolo derisi da' Filòsofi meno corrivi.

Indizii Fisiologico-Patòlogici del Concepimento .

CXV. Posta la còpula già sin da *IPPOCRATE* si notò, che la maggior parte delle Femmine fecondate pròvano immediatamente una spècie d'estasi, di

rapimento momentaneo, per alcune piacevole, e voluttuoso, per altre accompagnato da orripilazione, da leggier brivido, da sensazione dolorosetta all' ipogastro, e all' umbilico. Rapita in quella còpula straordinariamente la Donna per lo soave spàsimo, per lo uon solito convellimento, se ne renderebbero asciutte in amendue i Sessi le parti genituali, perchè il Mâschio è lanciato con forza, e la Fèmmina assorbito con avidità: ciò non ostante questa, tosto dopo, à sentito un' insolita languidezza, una certa stanchezza delle membra inusitata, che la fece dare in qualche scossa di tremore, di frémuto; e à provato un certo movimento con tumidezza passaggèra dall' uno all' altro lato della regione dell' Utero, al che succedette una colichetta alla regione umbilicale. Tutti gli accennati fenomeni rapidissimamente succedonsi in minor tempo d' un minuto: e frattanto a certe Donne scrosciano i denti, ad altre si offusca per qualch' istante la vista, si fissa immobile la pupilla; palpitano le palpebre, e i lati del collo assai più distintamente, e per più lungo tempo, che nelle altre còpule.

CXVI. Tocca pertanto all' *Ostetricante* d' interrogare su tutte queste diverse possibili sensazioni la Donna, che si sospetta aver concepito, e per non offendere la verecòndia di certune saprà farlo in termini decenti, e modesti. Rifletterà, che alcune molto sensitive, sane, e regolate nelle funzioni del corpo loro, avendo già figliato altre volte, distinguono perfettamente il momento in cui concepiscono, e le più voluttuose meglio dell'altre per lo subitaneo caugiamiento, ch' in se risentono: altre poi fredde, flemmatiche, solite ad aver gonfie per abbondante pituita le parti esterne genituali; quelle che patiscono fluor bianco, e le insensibili a' piaceri del matrimonio, difficilmente s' accorgono della fecondità della còpula; anzi molte fiâte, neppur dopo le prime suppressioni de' mèstrui, san persuadersi dello stato, in cui si trovano. Le Donne

pubbliche, se crediamo ad *IPPOCRATE*, quando un figliato alcune volte, s' accorgono della còpula, che le à rese incinte.

CXVII. Annunciasi poi meglio il concepimento, anche ne' primi giorni, per certi molesti sintomi, quali sono tension di ventre, su cui la Donna non può soffrir alcun peso, e se ne lagna con ansietà, con trasporto, e tristezza; è tormentata da nausea insolita, cui succede per lo più al mattino molesta cardialgia, e vomito secco, o almenò sputacchiamento. Le si altera l'appetito, diventa malinconica, pensierosa, iracunda, sonnolenta, pigra e debile: si sottrae alle carezze del Marito, e le premure del medesimo la infastidiscono. A' gli occhi languidi, azzurrògnoli al bianco, torbidi alla pupilla; livide, molli le palpebre; il contorno della inferiore inzuppato di Linfa ora rossigna, ora piombina, or gialla. Non può star a lungo in una stessa positura, e tanto meno in giuocchio, che le vien nausea, e copiosa saliva alla bocca. Or à troppo sciolta la vescica, ed il ventre; or à difficoltà d'orinare, e stitichezza. Finalmente ad alcune nascono pustule, panni, lentigini sulla faccia, massimamente alle tempie, e alla fronte: ad altre spariscono improvvisamente quelle, che vi si osservavano, e che avean resistito a tutti i cosmetici. Nè dobbiam ignorare essersi notato in alcune un cangiamento nel diametro del collo appena operatasi in esse la *fecondazione*, di modo che quel nastro, quella collana, che oggi era ampia, e libera intorno al collo d'una Sposa, domàni essa la prova più stretta del bisognevole, e se ne lagna.

Indizi confermantì il Concepimento.

CXVIII. Essendo Disquisizioni Fisiologiche piuttosto che disposizioni a ben dirigere le *Mammæ* nella cura delle *Gravide*, e nella preparazion delle medesime ad un *Parto* felice, tutte le osservazioni fattesi da' Maestri d'*Ostetricia* sopra i diversi cangiamenti, che

l'Utero gràvido soffre nella propria interiøre sostanza, non ne faremo quì lungo discorso; quantunque sia da lodarsi altamente la diligenza di quegli *Ostetricanti*, ch' esamineranno ogni cosa ne' Libri de' Moderni Anatomici, e degli Speculatori di così fatte arcane mutazioni, opportune a' Mèdici non meno, che a' Naturalisti.

Della Gravidanza.

CXIX. Passerèmo intanto ad esporre quanto nella *Gravidanza* notasi nella Fèmmina;

1. In quanto che ne riguarda la sanità, e quella del *Feto*.

2. Relativamente alle diverse posizioni, ed apparenze del collo dell' Utero nella Vagina, il che ne costituisce la Prima Classe, e la Seconda degli indizi.

Indizi della Prima Classe.

CXX. Dopo di quella Còpula, nella quale operossi la Fecondazione più non compàrvero i Mèstrui, tutto che la Donna abbia sofferto i sòliti incòmodi sintomi della pletòra, o ripienezza, quali sono dòglie al capo, vertigine, vampe, rossore, tumidezza alla faccia; cèrchio livido alle pàlpebre; riscaldamenti fugàci ad altre membra stanche, e peste; gonfiezza alle vene delle còscie, e talor anche delle mani. Convienè però avvertire se la suppressiòne de' Mèstrui non abbia luogo per altre cagioni ffsiche, o morali; e procurar di scuoprirle; nè fidarci d'assicurare la Donna aver concepito, ancorchè a questa suppressiòne s'aggiugnèssero alcuni altri di que' fendèmeni, che in parte già toccammo, potendo questi esser comuni a vòrte malattie, a vòrte circostanze; come non di rado, benchè la Donna sia incinta, stilla sangue dalla Vagina al tempo ordinàrio, massimamente quand'è pletòrica.

CXXI. Alla suppressiòne de' mèstrui succède la tumidezza delle Mammelle, che s'èmpiono, s'indurano, e dolorosette lussurèggiano per molte vene, che

nella tessitura loro esteriore si manifestano, divenendo varicose e ramose, cerulee: La Papilla inturgidisce, incomodamente prude, s' offusca nel coldre, che più fosco, ancora se n' estende oltre alla base, oltre al solito cèrchio dell' Areola, sulla quale s' elevano tubercoletti glandulosi; e premendo le Poppe, o le Papille, n' esce una sierosità latticinosa.

CXXII. A questi indicii aggiungiamo quelli, che il diligentissimo *IPPOCRATE* ci ha trasmessi: una Femmina gràvida (dic' egli) ha gli occhi men prominenti del consueto, meno aperti, men lucidi, meno bianchi; dorme meno profondamente; è commossa da ogni menomo rumore, ed è facile a inquietarsi. Il viso se ne cuopre di macchie. Abborrisce certi alimenti, ed ama cibi assurdi; mal digerisce, ed inclina al vomito.

Indizi della seconda Classe, tratti dalla Esplorazione stessa.

CXXIII. Intraprenderemo ora l' esposizione degli indizi dell' altra classe, che a ragione si consideran come meno equivoci perchè tratti dall' attento esame dello stato dell' Utero, e specialmente dall' orificio, da' labbri, dal collo, e dalle parti attigue al medesimo nella Vagina, per mezzo della *Esplorazione*; nella quale impiegando le cautele già sovra esposte, ed avendo le cognizioni, che abbiamo procurato di dar loro fin' ora, l'*Ostetricante* non può a meno di ricavarne all' occorrenza tutti que' lumi, de' quali ha d' uopo.

Come si riconosca che una Pulcella è tuttavia Vergine.

CXXIV. In fatti ove si trattasse d' assicurarsi della verginità d' una Zitella quando questa fosse sana, e robusta; quando non fosse stata di fresco, nè attualmente fosse mestruata, e veramente fosse vergine ancora, l'*Ostetricante* troverebbe drette le labbra della Vulva, e oltre alle Ninfe piccole, solide, bene avvicinate, di color incarnarello-pallido, incontrerebbe la Imene, alla quale non dee colla ruvidezza, nè colla forza recar oltraggio. Accorto, ed esperto

com' egli debb' essere, agevolmente distinguerà l'angustia dell'entràta della Vagìna da quella, che caricci irregolari, uso scaltro di rimèdi astringenti, e callosità, vi rècano; e alle strida, e a' contorcimenti dell' *Esploranda* non darà se non quella importanza, che dalle angustie naturali incontrate comprenderà meritare, e che dalla semplicità delle risposte, e dal contegno della Pulcella giudicherà maggiore. Unirà pertanto questa circostanza, o la difficoltà a penetrar col dito oltre alle caruncule mirtiformi, senza che siavi difetto di struttura, al liscio, e alla rotondità uguale, e molle del ventre; al liscio, e alla rotondità delle mammelle per lo più divergenti, colle areole, e le papille pallidette, e piccioline, simili alle fragole immatùre, all'acutezza, e al limpido della voce; e alla modesta verità delle risposte; unirà tutto, dicevamo, all'attuale stato della Zitella e dal canto de' parenti, e da quello delle amicizie, e delle inimicizie, ove il caso, o la sua prudenza lo illumini; e cautamente pronuncierà se possa dirsi *vergine*, o *sfiolata*.

Segni che la Pulcella è sfiolata.

CXXV. In quest' ultimo caso il disordine delle labbra della Vulva; le fessure, o scorticamenti; l'infiammazione delle medesime Labbra, e delle Ninfe; il risentimento doloroso, di cui si lagna, o dà indizio, all' arrivo del dito esploratore a un sito determinato, immutabile per qualunque altra direzione, piegatura, o movimento diasi al dito; il varco libero fino al collo dell' Utero; il liscio della Vagìna, l'arruffamento de' peli, o la totale mancanza de' medesimi per essere stati rasi, oltre alla mancanza de' segni addotti poco fa, possono guidarlo a sospettare, e determinarlo a pronunciare la Femmina più non esser *Vergine*, se oltre alla sicurezza della mancanza d'altre cagioni, specialmente morbuse, delle quali l'*Ostetricante* può altresì avvedersi, vi concorrono altri argomenti, e conghietture.

Indizi dell'Aborto procurato, o del Feto nascosto.

CXXVI. Dovendosi poi giudicare d'una Femmina accusata d'aver procurato l'*Aborto*, d'aver ucciso, o nascosto il *Feto*; ove la visita se ne faccia poco tempo dopo ch'ebbe l'udgo il misfatto, non è malagevole all'*Ostetricante* d'assicurarsene, poichè troverà le parti genitrali ancor inzuppate, contuse, umidissime; grosse, e mollissime le rughe della vagina, e questa colante umor simile a lavatura di carne; sopra tutto poi troverà pendulo, gonfio, molle il collo dell' Utero, flaccide le labbra dell' orificio, che sarà ancora ampiamente dilatato e pieno di moccio, forse ancora sanguinolento. Inoltre il pallor livido, o l' soverchio rossor della faccia; il cerchio livido, o giallo intorno agli occhi languidi; il collo più pastoso del consueto; il seno più rilevato; le poppe turgide, piene di latte, fregiate di vene livide; la flaccidità del ventre, la pelle del quale è pendula, piena di macchie strette e lunghe biancastre, e lucenti, appassita, tutta rughe romboidèe, o irregolari; quella delle coscie gonfia, e sparsa di vene apparenti, sono coindicanti di gravissimo peso.

CXXVII. Quando la visita si fa qualche tempo dopo, è più difficile il portar un giudizio più sicuro attesa la facilità, che anno le parti mentovate di riacquistar la forma, il volume, la consistenza loro a poco a poco, massimamente dopo un *Parto felice*, o un *Aborto* di tenero *Feto* in Donna sana per altro, e robusta, capace d'aver adoprato rimèdii astringenti, corroboranti.

CXXVIII. L'unico segno difficile a cancellarsi, anche dopo lungo intervallo di tempo, risiede nel collo, e nella bocca dell' Utero, perchè il primo si trova più abbassato, più largo, più breve, più spesso, e molle; l'altra più aperta sì, che il dito *Esploratore* vi penetra dentro senza molta difficoltà, e trovasi più mocciosa. Ma quest' argomento per la sua importanza merita

d'èssere trattato ad istruzione delle *Ostetrici* e de' *Raccoglitori* di Coutado alquanto più chiaramente, i delitti di *violamento*, d'*infanticidio*, di *sottiazion della prole* alla cognizione del Pubblico, essendo stati ognora così abbominuèvoli, e nefaudi, che la severità delle Leggi à sempre castigato con la morte le infelici, che per disgrazia loro vi sono cadute. La maggior parte delle volte però questi esecrabili misfatti mancano di testimoni; e i Giudici avanti di pronunciare la sentenza prescrivono che si esamini, si visiti tanto la Pulcella, che dicesi stata *violata*, quanto la Femmina accusata d'aver ucciso il frutto delle sue viscere, o d'averlo nascosto sia nel momento della nascita e premeditatamente, sia esponendolo crudelmente alle ingiurie del tempo, e degli accidenti, siane stato qual si voglia il motivo, o il pretesto. L'affare è delicatissimo, e il *Raccoglitore*, e la *Ostetrica* destinati ad esame così scabroso debbono farvi uso di quante cognizioni, di quanto discernimento, di quanta avvedutezza, e prudenza àno acquistato per mezzo dello studio, della pratica, e dell'uso delle cose, per non esser cagione, che la innocente perda la riputazione o la vita, e il colpevole venga assolto. Conseguentemente se l'incumbenza della quale veniamo in tali circostanze incaricati fa onore alla *Ostetrica*, al *Raccoglitore* savio, e prudente, elevandolo al grado quasi di Giudice, la medesima incumbenza ci può degradare allorchè vi ci portiamo male, manifestando al mondo la nostra ignoranza, e cuoprirci di vitupero, e di vergogna.

CXXIX. Abbiamo già accennato, che i segni negativi della *verginità* non sono sempre convincenti prove del *violamento* sofferto, 2. che le contusioni, le scorticature, le lacerazioni stesse d'alcune delle parti genituali esteriori possono procedere da molte altre cagioni, e non sono esclusivamente effetto di questo misfatto; 3. che non di rado la Imene è distrutta in persone intatte, che conservano illibata quella

prerogativa fisica e morale, che diciamo *verginità*, intanto che Donne svergognate ed impudiche, anzi Donne gràvide, in procinto di partorire, l'anno intiera; 4. che talvolta i disordini recenti osservati nelle parti genitrali sono il frutto delle malvagge intenzioni d'una Fèmmina o bramòsa di costringere colui, che viene accusato d'averla violata, a sposarla, o di vendicarsi d'un rifiuto, oppure d'allontanar da se un oggetto per cui non sente più inclinazione: e non è unico il caso di Fèmmine laceratesi, contusesi spontaneamente, che alzarono le grida ed accusarono d'essere state violentate, sforzate da chi non ne aveva colpa. Sembra quasi impossibile ch'un Uomo solo possa violare una Donna se non v'è sproporzione grandissima di forza, e d'età, se il Maschio non usa qualche artificio, come sarebbe di far prendere alla Fèmmina qualche narcotico porcente; e se la mano armata d'un amator impudico e furibondo non getta la disgraziata nel terrore, e nell'abbattimento.

CXXX. Per ciò, che spetta alla sottrazione del *Parto* alla cognizione altrui, di questa è ugualmente difficile di assicurarsene per aderire alle istanze del Fisco, se l'*Esploratore* non si sovviene, che lo sputgo provegnente dalla espulsione delle sostanze, le quali costituiscono le *False Gravidanze* come le *Mole*, e le *Idàtidi*, che si descriveranno a suo luogo, certi ammacchiamenti di sostanze gelatinose, muciose, sanguinolente, e simili, sòglion essere gli stessi che quelli, i quali sièguono il *Parto ordinario*; 2. che la gonfiezza delle mammelle, e la presenza del latte à luogo del pari nell'uno, che negli altri casi, anche molti giorni dopo tali espulsioni, o evacuazioni. Il che unito a quanto espòsimo ne' paràgrafi precedenti dee farci conoscere quale accortezza, e quale riserva debba precedere, ed accompagnare ogni nostro giudicio, ogni nostra deposizione in tali incontri per non esser colpevoli, ed ingiusti.

DELLA ESPLORAZIONE

FONDAMENTO DELL' ARTE OSTETRICA

PARTI SECONDA

Che s' agglia intorno a tutto quello , che la Esplorazione medesima è atta a manifestare nelle Gravidie , nelle Partorienti , e nelle Puèrpere , eseguita con le necessarie avvertenze .

BENE impresse nella memoria , e ben disposte nell' intelletto della Mamma , e dell' Ostetricante , le cose nella Parte precedente colla prefissaci brevità , e colla chiarezza , che ci fu possibile , esposte : persuasi e questo , e quella de' riguardi , della dilicatezza , e della probità , che un incarico tanto geloso richiede , in chi lo assume : informati de' mezzi indispensabili , che guidano a perfezionarvisi ; entreremo in materia , e percorreremo insieme con la dovuta diligenza , e posatezza il campo , che la nostra professione ci obbliga di esaminare secondo gli oggetti principali che debbono interessare l'Ostetricante , ed esporremo intorno a' medesimi tutto quello , che può servire d'istruzione , e d'appagamento .

Tre oggetti principali per cui si fa l'Esplorazione della Donna Gravida .

1. Siccome la Generazione è quell' operation generale , per mezzo di cui qualsivoglia individuo , collocato nelle circostanze convenevoli , produce enti simili a se ; e siccome la Concezione nella specie umana consiste nell' unione de' principii somministrati alla Generazione da individui dell' uno , e dell' altro

Sesso: così la *Gravidanza* * è quello stato, in cui trovavasi la *Femmina* che à concepito; stato che dura dall' istante medesimo, in cui à luogo la *Concezione*, fino al punto nel quale esce dell' Utero di tal *Femmina* il corpo, che vi s' era prodotto.

II. L' *Esplorazione* della *Donna* in questo stato si fa;

1. per assicurarci se veramente sieno tali;
2. a qual epoca della *gravidanza* si trovano;
3. per distinguere l' *Imminenza* del *Parto*. Oggetti di somma importanza, e perciò degni dell' attenzione più seria, e della più chiara, estesa, ed esatta esposizione, la quale dopo le notizie premesse nella prima parte riescirà molto più luminosa, ed istruttiva.

Che cosa l' Esplorazione ci insegna dal principio al terzo mese della Gravidanza.

III. Ella è osservazione costante, che quando l' Utero comincia a crescer di peso, come nel principio della *Gravidanza*, s' abbassa; e il collo suo, in cui non è ancor succeduta mutazione in quanto al volume o alla massa, spinto nella *Vagina*, è più facile ad esser incontrato dal dito dell' *Esploratore*. Abbassatosi l' Utero il ventre della *Donna* dall'

* (P.I. §. CIII.) Oltre a quanto ivi abbiamo detto già sapere, che la *Gravidanza* è *Naturale* allorchè l' Utero ben disposto, contiene in buona situazione un *Bambino* ben costruito; è *Non naturale* quando il *Feto* è *mostruoso* relativamente all' Utero dov' è contenuto: o l' Utero è mal costruito; o uno, o più *Feti*, vi sono mal situati. Dicesi *Strauterina* la *Gravidanza*, in cui il *Feto* è concepito, e cresciuto fuori della cavità dell' Utero. E' semplice quella *Gravidanza* in cui v' à un *Feto* solo nella *Matrice*: composta quella, in cui ve n' à due o più; complicata quella, in cui oltre ad un *Feto*, o più, con le *Secondine* contienfi nella *Matrice* qualche altra sostanza, come farebbe una *Mola*, o più, una *Idatide* o più.

ombilico in giù s'appiattisce a segno, ch'essa medesima se ne accorge, e in certi Paèsi alle Spose novelle, che innocentemente se ne lagnano, suole farsi il piacevole compimento, che „Ventre piatto qualche cosa nasconde“.

Moderazion necessaria tanto negli Ostetricanti, quanto nelle Mammàne.

Riflettendo su tale circostanza l'*Ostetricante* chiamato ad assicurarsi dello stato di quel ventre, dee protestare, che dalla sua visita poco o nissun frutto è per ricavarci, attesa la quasi insensibilità de' cangiamenti, che vi sono accaduti, e procurerà di differirla fino al termine almeno del terzo mese, per non arrischiare un giudizio insussistente e fallace.

Elezion del tempo, e del modo d'esplorare a tal epoca.

IV. Costretto però a visitarlo, sceglierà il mattino quando la Donna è digiuna, ed à evacuate le feci, e l'orine, stando supina in letto, co' fianchi bassi, col capo alto all'occipite e il mento inclinato sul petto, le coscie piegate, e le calcagna contro le natiche, affinchè le parèti dell'abdomine sien molli, e cedenti. Sarebbe inutile il cercar all'ipogastrio compresso colla palma della mano destra ivi applicata dall'*Ostetricante*, collocatosi alla destra sponda del letto, cercar, dissi, indizio di gravidanza nel volume accresciuto dell'Utero. Questo non è ancor tale, che lo costringa ad elevarsi oltre alla sinfise del Pube. Dee dunque egli, stando, come dissimo, accanto alla Donna contro la sponda destra del letto, portar la propria destra fra le coscie di quella, e colla punta del dito esploratore ben unto, scostare le labbra della Vùlva, strisciandolo d'alto in basso, e con destrezza insinuarlo nella Vagina, facendolo scorrere per la parète posteriore della stessa finchè

ne tocchi, o se ne accosti al fondo. Allora volti la mano in supinazione sì che la palma corrisponda al Pube, ed alzi la punta del dito in avanti, anche verso il Pube, e incontrerà senza dubbio il collo dell' Utero, d' intorno al quale può aggirarlo a suo piacimento, purché ciò sia con dolcezza per non irritare e senza graffiare: può altresì farlo scorrere in traverso per sentir l' orificio dell' Utero, e misurarne la maggior lunghezza trasversale, la larghezza, la profondità, e la spessezza de' margini: può premerlo de- stramente in alto a scosse, e sentendone la rapida discesa, e il peso non ordinario, meglio distinguerà il cangiamento di figura, e di volume che à sofferto.

V. Ma in tutte le Donne al principio della gravidanza l' Utero non è sempre lo stesso in sito, in volume, ed in figura: dunque potrà l' *Ostetricante* variar i modi dell' *Esplorazione*, mettendo alcune volte un cuscino sotto le Natiche, coricando la Donna sopra un fianco, facendola alzare, facendola inginocchiare, e talor anche in questa positura appoggiarsi sui gomiti. Sovente a dir vero stando la Donna in questa positura, o coricata sul fianco rannicchiata colie ginocchia piegate verso il petto, e il capo molto curvato in avanti, l' *Ostetricante* col portar la mano per di dietro, e spinger il dito in su, arriva molto più facilmente al collo dell' Utero, e con maggior decenza apparente meglio ne trae le notizie opportune.

Quattro indizii di Gravidanza meno equivoci.

VI. Oltre agli indizii di gravidanza incominciata, già esposti, que' che si giudican meno equivoci sono i quattro seguenti:

1. L'ammollimento del collo, e de' margini dell' Orificio dell' Utero, non solito nella semplice suppressione de' menses, nella quale circostanza queste parti conservano una consistenza, una fermezza congiunta con

calore analogo a quello delle parti agitate, quasi infiammate; ed al flusso di sangue, ond' esse gonfiarono segue una rigidità, uno spasmo, che riesce doloroso al contatto. Nella gravidanza all'opposto la stasi de' fluidi, e specialmente della Linfa offre al dito sugli orli dell' orificio della Matrice una umidità, una morbidezza spugnosa, un aumento di volume in largo, per distinguere il quale da' ristagni morbosi è sufficiente una qualche esperienza, ed esercizio nell' *Esplorazione*, e l' accortezza convenevole per conoscere dal color del viso, dalla qualità de' polsi, dall' abito del corpo, se la Donna goda per altro buona salute.

2. La discesa del collo stesso, e la differenza di peso già indicate, sensibili al dito.

3. Un certo muco sensibile nell' orificio della Matrice qualche giorno dopo il concepimento, la coppia del quale non s' accresce a proporzione, che l' Utero ingrossa.

4. Certe insolite dòglie a' reni unite ora a stitichezza, ora a diminuita evacuazion delle urine; ora ad improvviso momentaneo movimento di ventre, cui tien dietro il frequente pisciare con qualche difficoltà, accompagnati da dòglie, e stramenti alle anguinaje a' lati della vulva, da indolenzimento, e impègno alle mammelle, non esistendo nè calor, nè pletora, ed avendo preceduto i segni della fecondazione già stati spiegati.

Che cosa insegna dal terzo mese al quintol' Esplorazione.

VII. Perseverando tutti i segni precedenti, continuando la suppressione de' mèstrui, e non sopravvenendo malatria nè cronichismo, potremo sempre più fondatamente giudicar gràvida la Donna passato il terzo mese allorchè col dito nella Vagina, e colla palma dell' altra mano sulla regione ipogastrica sentiremo una boccetta renitente, circonscritta, che segue i forti movimenti d' inspirazione abbassandosi, e

d' espirazione sollevandosi alquanto , e che si fa sentire alternativamente ora sotto la palma suddetta , quando il dito esploratore la spinge rapidamente in su , ora sul dito stesso , quando la palma colla medesima rapidità la preme in basso .

VIII. Quanto più cresce l'Utero di peso , e di massa , tanto più ne' primi tempi della gravidanza spinge , come dissimo , al basso nella Vagina il suo collo , che non è tuttavia cangiato in quelle , che ancora non figliarono , e non vi hanno altro inzuppamento . Tràesi allora dietro la vescica , che gli è aderente per via de' ligamenti arcati anteriori , e non solo rende piatto l' ipogastro , ma approfonda , e fa nascondere l' umbilico per lo stirarsene l' Uraco , e le Artèrie Umbilicali otturate .

IX. Dopo il terzo mese la sola palma della destra mano applicata sull' ipogastro in guisa , che il mignolo sia parallelo a' corpi delle ossa del pube , e il pollice corrisponda all' umbilico , può sentir la globosità dell' Utero già alquanto prominente oltre allo stretto superiore del Catino , e facile ad essere spinto colla punta delle dita della stessa mano verso l' uno o l' altro Ilio . In questo tempo appariscono talvolta le emorroidi , altre volte dolgon nell' Ano essendo cièche interne : si elèvano varici per le gambe , e per le cosce ; gònfiano leggiermente i mallèoli , e i pièdi per la pression dell' Utero più pesante su i vasi iliaci . Che se tal pressione cade su i tronchi de' nervi , diventa stupida ora l' una , or l' altra gamba ; e si risvegliano spàsimi nojosissimi la notte .

Spiegazione d'alcuni de' sintomi della Gravidanza a tal época .

X. Coll' aumentarsi dell' Utero il corso de' vasi , e de' nervi di tutto l' abdòmine si scompone , qualche porzione del mesenterio è stiracchiata , distesa , perchè gli intestini sono costretti a prender sito ne' lati

del ventre, a risalir verso il petto, a premere il ventricolo contro il Diaframma, la cistifellea contro il Fegato. Quindi i dolori, gli ardori di stomaco, le nausea, i vomiti più frequenti, la stitichezza, e le difficoltà d'orinare, quando l'Utero ingrossato elevandosi oltre allo stretto superiore del Canale seco trae in alto colla Vagina il collo della Vescica, o col suo volume, e peso il comprime contro la Sinifse del Pube. Spinno il Diaframma nel Torace ne deriva la difficoltà di respiro, l'insolito affanno, l'anèlito al lungo camminare, al salire specialmente le scale. Cangiandosi finalmente l'asse vertical della macchina quando l'Utero s'accosta alla sua massima dilatazione, la Donna, che non vi è ancor avvezza, vacilla sulle gambe, e talvolta zoppica se le Sinfisi sacro-iliache, e quella del Pube sono rilassate a cagione del lungo, costante inzuppamento.

XI. Intanto ella sente, e distingue i movimenti del Feto, che ne' primi mesi tenero, e molle, immerso in molto licore, benchè già si movesse, la Madre non lo distinguerebbe, essendo facile, che nell'abdomine insorgano movimenti nelle intestina per le flatulenze, e per altre cagioni a Fisiologi non ignote. Cresciuto il corpo, fattosi più solido, più robusto, nuotando in quantità minore d'acqua, que' moti non solo riescono sensibili, agèvoli a distinguersi, che anzi talvolta divengono molesti alla Gràvida, e non di rado pericolosi.

*Utilità della Esplorazione dal quinto mese
al termine della Gravidanza*

XII. Ciò succede per lo più nel quarto mese inoltrato; e l'*Ostetricante* può accertarsi della gravidanza, messa tuttravia in dubbio, col mezzo dell' *Esplorazione*, usando maggior diligenza, e flemma, colla palma applicata sull' ipogastro alternando rapide pressioncelle, e

spinte, quelle colla palma in giù, queste col dito esploratore contro il collo dell' Utero in sù. Queste eccitando un contraccolpo fanno risalire, e ricader il Feto, e lo eccitano a muover distintamente le membra.

Alcune riflessioni sù i movimenti del Feto nell' Utero.

XIII. Fannosi più sensibili i moti spontanei del Feto a mano a mano, ch'egli ingagliardisce; ma sembra, che la vita esercitata, e dura delle Contadine, e delle Femmine delle classi inferiori, nelle quali pure i Feti si fanno robusti, o loro tolga la necessità di muoversi spontaneamente, giacchè tanto si muovono per lo moto comune di tutto il corpo delle Madri; o non lasci a queste il campo, o la riflessione per sentirgli così frequenti. Molte d'esse non gli sentono mai, e ciò non ostante la gravidanza loro procede prosperamente fino al parto. Le Femmine agiate, le Cittadine sedentarie, e morbide, s'inquietano per l'intermissione de' medesimi, intorno alla qual cosa, qualor non esistono indizii di malattia, o di sconcerto nell' Utero, è necessario di tranquillizzarle, avvertendole, ch'è quasi più secondo natura il non sentirne alcuno, giacchè il Feto si trova in sito da parti ugualmente prementi circondato: pressione, la quale bisogna pure, che diminuisca da qualche canto, se ànno da seguire, da rendersi sensibili que' movimenti.

XIV. Qualor peraltro già avèndone sentito alcuno non equivoco la Donna, si fossero sospesi que' movimenti avendo precèduto malattia, evacuazioni considerabili, o qualche altro sintomo, o accidente estrinseco, capace d'aver offeso, oppur oppresso il Feto, converrebbe, che l'Ostetricante non mancasse di quella diligenza, che fa d'uopo per assicurarsi della vita, o della morte dello stesso nell' Utero, mediante l'Esplorazione, e l'aggregato degl' indizii, che si esportano a suo tempo.

Quando sia più utile esplorar la Donna ritta in piedi.

XV. Detto quanto sembra sufficiente delle cognizioni, che può trarre l'*Ostetricante* da' movimenti spontanei del Feto; e ritenuto, che questi coll' *Esplorazione* si possono anche eccitare di modo, che più non rimanga dubbia l'esistenza del medesimo, per la forza d'inerzia, che rende facile a distinguere il ricader dell' Utero sulla punta del dito, dal quale si allontanò, dal ribaltarvi contro la superficie interna e del fondo, e del collo, il Feto, che n'era stato smosso dall' istantaneo rapid' urto; giova soggiungere, che in tal caso è meglio esplorar la gravida in piedi. Perciocchè stando essa coricata sul dorso, la situazione orizzontale, anzi inclinata dell' Utero ne allontanerebbe troppo il Feto dal collo; e quel Feto più pesante della massa d'acqua, che ne gravita sul collo, tenderà più presto a ricadervi quando sarà stato balzato in alto nella situazione diritta della Gravida.

XVI. V'è chi pretende potersi conoscere la gravanza dalla fluttuazione, dell' acque dell' Amnio *: però non conviene fidarsi al gorgoglio dell' addomine. Suole questo nascer per idropisia ascite, o procedere dalle intestina per flatulenze, o per alimenti liquidi in esse, o nel ventricolo contenuti. Nè più sicuro in-

* Le acque dell' Amnio se hanno da raccogliersi in questa membrana debbono farlo a poco a poco, distendendo, ed allargando insensibilmente le pareti spesse, e contrattili dell' Utero: e queste non cedono senza soffrir violenza, e senza premer le acque a segno di non lasciar luogo a gorgoglio, nè a ondeggiamento veruno fin tanto che, apertosi l'orificio, il voto della Vagina, in cui s'allunga l'Amnio, dà poi luogo alla fluttuazione, sensibile soltanto alla punta del dito esploratore, e non mai all' orecchio dell' Ostetricante. Le idropisie d'Utero, in tempo, che non v'è Amnio, anno elleno la fluttuazione per segno?

dicio può darne il tremolio, che accompagna più sovente la semipienezza della vescica urinaria, e le idropisie cistica, ad ascitica.

Serie più distinta de' segni della Gravidanza de' dotti dalla Esplorazione di mese in mese, dal quarto al Parto.

XVII. Recapitoliamo. Prima, che il Feto si muova nell' Utero la diagnosi d' una buona gravidanza non è fondata che sopra conghietture, la forza delle quali s' accresce in ragione del maggior numero possibile de' sintomi, degli indizii, che hanno fatto nascere tal dubbio. I segni deducibili dall' *Esplorazione* sono sempre relativi allo stato della Matrice, il corpo della quale ne' due primi mesi divien rotondo, e s' immerge un pò più nel picciolo Pelvi: sicchè il collo, e l' orificio si presentano nelle prime fecondazioni in avanti, e in basso; nelle seguenti in alto, e a tergo. Se l' ipogastro intumidisce ciò deesi soltanto a' meteorismi, e a qualche maggiore gonfiezza delle altre interiora piuttosto che a quella dell' Utero: e tali tumefazioni diminuiscono poi di modo, che si sono vedute gràvide nel quarto mese con addomine men turgido, che nella quarta settimana.

XVIII. Al quarto mese appunto il fondo della Matrice ordinariamente più voluminoso comincia a sollevar alquanto la region ipogastrica portandosi oltre al livello della sinfise del Pube, e si rende sensibile alla palma dell' *Esploratore* applicata su tal regione, e al dito spinto su per la Vagina. Il collo però e ancora immutato; e se incontrasi bernocoluto, irregolare, ciò dipende da impegno morboso.

XIX. Nel quinto il fondo dell' Utero supera già di varie dita il margine anteriore del Catino, cioè s' accosta alla regione umbilicale, e il collo con la sommità della Vagina trovasi elevato quasi a livello del

Pube . In questo tempo la Vagina è più angusta perchè stirata in alto ; e l'orificio dell' Uretra più nascosto dietro all' arco del Pube , più ristretto , cagiona talvolta difficoltà nell' urinare . L' Epigastro è più tumido , e reso ; i movimenti del *Feto* sono più frequenti e manifesti .

XIX. Al sesto la Matrice occupa col suo corpo la regione umbilicale , di cui l' anello si scosta maggiormente dal Pube , ed è come il centro anteriore d' una considerabile prominenza globosa . Il dito dell' *Esploratore* s' accorge che il collo nella Vagina s' accorcia , diventa spugnoso , s' invernica di muco , s' allarga alla base ; e che le labbra dell' Orificio s' allungano in traverso , si assottigliano , questo rimanendo volto in sù contro l' osso Sacro .

XXI. Tale accorciamento del collo dell' Utero si rende ancor più sensibile nel settimo mese , e il dito dell' *Ostetricante* stenta ad arrivarvi , perchè scostasi dalla Vulva a misura ch'ei si sviluppa , e che il corpo dell' Utero acquista maggior volume , e s' innalza ad occupare porzione dell' Epigastro .

Se il Feto faccia il Capitombolo nel settimo mese .

XXII. A quest' epoca il vulgo s'immagina , che il Feto faccia il *Capitombolo* , opinione appoggiata all' asserzione d' innumerabili *Ostetricanti* , e sostenuta dalle Tavole de' libri loro nelle quali il Feto de' mesi antecedenti è delineato come se fosse assiso sull' Orificio interno dell' Utero , le gambe incrociate , le coscie piegate , i gomiti appoggiati sulle coscie , e le manine impiegate a sostenere il capo , la faccia del quale è rivolta all' umbilico della Madre . Il *Capitombolo* si fa a misura , che la testa aumentandosi , e le acque dell' Amnio più non serbando la primiera proporzione col *Feto* , le permettono d' accostarsi maggiormente pel proprio peso alla parte più bassa dell'

Utero . Nè si può fissar il tempo di questa situazione , perchè le *Operazioni Cesàree* fatte su gràvide ora più ora meno avauzate non ànno somministrato cosa veruna costante a questo riguardo .

XXIII. Verso il fine dell'ottàvo mese la Matrice si avvicina sempre più al diaframma , ed occupa tutta la parte anteriore dell'abdomine gettandosi a' fianchi , e in sù , le intestina : il collo n' è intieramente annihilato , il labbro anteriore dell' Orifício divenuto larghissimo , e sottile , sostiene quasi da se solo tutto il peso dell' acque , e del *Feto* ; e il margine n' è tanto elevato , e portato indietro nelle *Primipare* , che per toccarlo , e distinguer l' Orifício dell' Utero , l' *Ostetricante* deo spinger il dito fino a livello delle Sinfisi sacro-iliache , ed esplorar la Donna in piedi appoggiata col dorso alla sponda del letto , perchè la situazione orizzontale d' essa riesce incòmoda , e per lo più inutile . Comincia l' Orifício ad aprirsi , ma rivolto affatto verso l' osso Sacro .

XXIV. Nel nono rendendosi sottilissimo , e pieghevole quel labbro , ed allargandosi l' Orifício , il *Parto* non è più gran fatto lontano . Tarda all' incontro ancora qualche settimana allor che se ne trovano duri , e spessi i margini , sia qual si voglia il diametro della apertura . Così talvolta nel settimo mese trovasi l' Orifício dell' Utero dilatato abbastanza per potervi insinuar il polpastrello del dito esploratore , e sentirvi le membrane , eppure il contorno sendone duro , e spesso , le gràvide non partoriscono prima del termine dovuto . Che se a tal epoca lo trovassimo molle , e sottile , dovremmo temer *Aborto* , o di *Parto settimestre* , come pronunciamo *imminente il Parto* se tale il sentiamo in fin del nono mese .

*Indizii dell' Imminenza del Parto
tratti dalla Esplorazione .*

XXV. Dell' *Imminenza del Parto* viene istrutto

l' Ostetricante con maggior sicurezza dallo stato in cui trova le membrane, che contengono le acque e il Feto nell' Utero, col dito: cioè quando queste si tendono, e s'ammolliscono alternativamente a misura, che la Gràvida si lagna di dòglie, e di prèmiti involontarii. Lo stesso pronòstico si trae pur anco dal sentir coll' altra mano posta di piatto sull' umbilico la Matrìce indurarsi nel momento istesso, che le membrane si rendono, e tosto dopo si rilassa contemporaneamente all' ammolirsi di quelle.

Fallàcia di tali indicii.

XXVI. Questi sintòmi, che annunziano l'*Imminenza del Parto*, non indicano però sempre positivamente il tèrmine del nono mese, dalle trentasei alle trentotto settimane; siccome v'anno *Parti settimanstri*, cioè Donne, la gravidanza delle quali si còmpie nel giro di sette mesi soli, e siccome dannosi *Aborti* o sia *espulsioni de' Feti non maturi dalla Matrìce* in tutti i tempi della gravidanza; così tali sintòmi possono comparire prima dell' època ordinària.

Quattro argomenti onde eludere la fallàcia suddetta, e quella di sei altri indicii più pròssimi del Parto.

XXVII. Per fissare questa è necessario riflettere;

1. al tempo dacchè furono suppressi i Mèstrui;
2. dacchè principiò a muoversi il Feto;
3. al volume della Matrìce indipendentemente da tutto quello, che può combinarvisi di morboso;
4. alla solidità del capo del Feto sensibile anche a traverso delle membrane, e delle acque. Tanto più che;
 1. le dòglie da' reni, da' lumbi all' osso Sacro, al Coccige, e nella stessa Matrìce,
 2. il peso incòmodo sull' Ano, e nella Vagìna, di cui taluna si lagna;

3. l'abbassamento di tutto il Ventre ;
4. gli stimoli frequenti d'urinàre ;
5. la stitichezza ;
6. lo scòlo d'umor tenàce, glutinòso, ora acquoso, ora sanguinolento, caratterizzano meno il tèrmine vero della gravidanza per la *maturità del Feto*, che non la caratterizzano i sintòmi poco prima esposti .

XXVIII. E' poi finalmente da avvertire , che le diverse elevazioni del fondo dell' Utero nel Catino osservate mediante l'*Esplorazione* , possono servire piu specificamente a far conòscere le varie epoche della gravidanza nelle incinte per le prime volte , non suolendo questo alzarsi tanto in quelle , che già figliàrono più volte . Lo stesso dicasi del collo , che sviluppandosi nella prima gravidanza mùtasi poco , mentre che se ne allarga la base , cioè quella parte immediatamente al di sopra della quale la Vagina colla sua sommità s'attacca attorno all' Utero .

XXIX. E' vero , che la bocca dell' Utero non si apre ordinariamente salvo quando ne è compito lo sviluppo , l'assottigliamento , l'annichilamento del collo ; ma si apre molto più presto nelle susseguenti , e il muso di tinca in quelle che ànno figliato molte volte rimane più grosso negli ùltimi mesi . Tanto è necessaria la pratica , la lunga sperienza , e l'attento esercizio , per non esser ingannato dalle apparenze , e da' segni equivoci , de' quali (appartenenti ad altro , che alla gravidanza) nelle incinte non occorre di favellare adesso , che , dato uno sguardo alla *Retroversione* , ed alla *Antiversione* dell' Utero solite a manifestarsi nel tempo della gravidanza , ci proponiamo di tener dietro al filo delle osservazioni , che concernono l'*Esplorazione* da farsi nell'*Imminenza del Parto* , e nelle circostanze , che accompagnano questa funzione rilevantissima .

79

*La Retroversione , e l' Antiversione dell' Utero .
in generale .*

XXIX. Succedono pur anco talvolta nel tempo della Gravidanza due cangiamenti nella direzione dell' Utero , che gli *Ostetricanti* uominano *Retroversione* l'uno , altro *Antiversione* . Col primo termine vogliono essi indicare il piegarsi dell' Utero in guisa col suo fondo addietro , e in giù nella escavazione , contro l' intestino retto , che il collo , e l' orificio della medesima viscera vengano a portarsi in alto , e al davanti contro al pariete posterior della vescica , e a premere questo sacco contro la faccia interna della sinfise del Pube , aggirandosi il corpo tutto dell' Utero sul suo asse trasversale .

XXXI. Col secondo termine , cioè *Antiversione* danno ad intendere il piegarsi del corpo della Matrice così fattamente innauzi , che in proporzione dello spazio concessogli dalle parti molli contenenti anteriori dell' Abdomine , e della estensibilità de' ligamenti , il fondo di quella ora inclina a premere la faccia posteriore della vescica , ora pende al davanti del Pube come in un sacco , intanto che il collo e l' orificio della Matrice stessa rivolti a tergo , ed in sù si appoggiano contro il margine posterior del catino , cioè contro il corpo dell' ultima vertebra , e contro la base dell' osso Sacro , o tratti col rimanente dell' Utero nel sacco anteriormente alla sinfise del Pube , o piegati sù questa , riguardano in dietro , e più o meno in alto . L' *Esplorazione* somministra troppi lumi intorno a queste due specie di slogamenti dell' Utero , perchè in un Trattatello , che la concerne , debbano esser neglette . Noi pertanto le descriveremo , e per maggior chiarezza le considereremo distintamente .

Della Retroversione in particolare .

XXXII. A misura , che l' Utero cresce di volume ,

perchè l'Uovo fecondato, cioè le *Secondine*, e il *Feto*, e la sua propria disposizione, lo fanno gonfiare, l'Utero che dee *retrovèrersi* sdrucchiola sempre più col suo fondo nella escavazione, e l'orificio, e il collo sempre più se ne innalzano, a segno, che il dito esploratore, (il ministero del quale in questo caso è necessarissimo tanto per riconoscere il grado, e la natura di questa malattia, quanto per apportarvi pronto ed efficace rimedio) non arriva a toccargli. *

* Ciò fu conosciuto, e indicato fino da IPPOCRATE, il quale nominò questa infermità *Peristērfoi*: anzi è da notarsi, ch' egli riconobbe le Femmine esservi soggette in ogni età, ed anche fudri della gravidanza, avendo osservato, che la Donna in tale circostanza non è convenientemente mestruada, nè facilmente concepisce; che soffre gravi doglie nella parte più bassa del ventre, e stiramenti molestissimi a' lumbi. Soggiunge poi altronde, „ In quelle Femmine, in cui la Matrice si abbassa „ tra gli Ischi, è necessario, che l'orificio di questa „ viscera si rivolga in sù, e salga in alto: allora il più „ basso del ventre duole; insorgono contrazioni alle „ gambe: dolgono le stesse articolazioni delle cosce colle „ anche vicino all' Ano, e acuto dolore si prova in „ tutte le parti inferiori del corpo nel deporre le fec- „ cie, le quali escono a forza di premiti, e a pallottole „ picciolissime: L'urina stessa non esce eccetto difficil- „ mente, con sibilo, e con pena. A tutto questo s'ag- „ giunge un defolante abbattimento di spirito. „

Alle osservazioni predette, che ci illuminano intorno alla importanza, e a' danni, che reca alle Femmine un tal accidente, FILUMENO, altro Medico antichissimo, aggiunse le seguenti, che non si debbono ignorare da verun *Ostetricante*. „ Se la Matrice (dic' egli) „ è tratta ugualmente da amendue i lati, essa non può „ a meno di rivolgersi, e di piegarsi nel mezzo; la qual „ cosa quando si fa all' indietro ne siegue, che amendue „ le gambe torpide rimangono, e stupide a segno, che „ non si possono più muovere senza difficoltà. Sovente „ il movimento se ne perde affatto, e le tormenta un „ atroce dolore. Si supprime l'evacuazione delle fec-

XXXIII. Nelle Fèmmine debili, cachètice, pròne all' idropisia , avvezze , ed abituare a trattener lungo tempo l' orina , state esposte a scosse violente , a storcimenti di corpo ; costrette a sollevare , a sostenere , a trasportar corpi voluminosi , e pesanti , a

„ cie , e l' inferma non può ricèver cristieri se non ap-
 „ poggjata sulle ginocchia , e pròna. Non si possono nep-
 „ pure evacuare le flatulenze , e le dòglie , che tuttdra
 „ sussistono , si esacerbano tutte le fiàte , che la Donna
 „ vuol federe . . . Supprimonsi talvolta per fin le orine .
 „ Siccome tràttasi d' una malattia , che quantunque
 accennata dagli Antichi Mèdici , che nominai , tuttavia
 fu ignorata universalmente fino alla metà del sècolo cor-
 rente ; e v' à buon nùmeto d' Ostetricanti , che la crè-
 dono una supposizione , una chimèra , così cesserà ogni
 dubbio intorno alla possibilità d' incontrarla appresso de'
 più increduli quando l' Ostetricante sappia addurne in
 prova l' autorità del Parigino Gregoire , di Waltero Wal-
 l' glèse , di Guglielmo Hunter , del Lyne , di Roberto
 Wallace Johnson , di Hooper , di Bird , di Carishore ,
 di Wilmer , tutti Inglesi ; degli Scozzèsi Evans , Swan ,
 e Purcell ; de' Tedeschi Willich , Waitz , Willich ,
 Van-Doeveren , Saxtorf , e Rogert ; e ne' trattati loro
 di Ostetricia sappia averne fatto menzione i chiarissimi
 Plenck , e Katzinberger , Smellie , Levret , e Blumen-
 thal ; de' quali assai più diffusamente ne scrissero i lo-
 dati Whetzer , Wall , servendosi il primo delle osser-
 vazioni di Klinkosh , e l' ultimo di quelle di Meckel , a'
 quali debbono aggiungerli i più recenti Baumgarten ,
 Cockell , Starke , Richter , e Federico Jahn , la disse-
 razione del quale uscita a Jena nel 1787 , si è sparza uti-
 lmente per queste nostre Provincie , e pel rimanente dell'
 Europa , dal Chiarissimo Sig. Consigliere Giampietro
 FRANK Regio Direttore , e Professor di Clinica in
 questa Università Pavese nel sesto volume del suo utilis-
 simo -- *Delectus Opusculorum Medicorum* , Ticini 1789. 8.
 intanto che Buudelòque , Chauppart , Desgranges , e Du-
 fausse la promulgàrono colle opere , e colle osser-
 vazioni loro in Francia , e il Nannòni ne fece brevissimo
 cenno alla sfuggita in Toscana .

correre in vettura per istrade sassose disuguali; nelle Femmine state colpite da violente passioni com'è il terrore, la paura; state costrette a vomitare, o a premere con violenza per iscaricare il ventre: in tali Femmine al terzo mese della gravidanza, ora più presto, ora più tardi, all'insorgere de' sintomi già di sopra nella lunga nota narrati, può l'*Ostetricante* sospettare aver luogo la *Retroversione dell' Utero*.

XXXIV. Questa può essere *perfetta*, o *completa*, *imperfetta* o *incompleta*, e può anch'essere *parziale*, e tutte tre le specie esser *lente*, o *subitaneamente* secondo le predisposizioni interne dell' *Abdòmine*, e l' *impressione* violenta, o *subitanea* del pari, che lenta, e continuata delle cagioni atte a produrle.

Retroversione perfetta.

XXXV. Nella prima specie il fondo dell' *Utero*, cioè quella porzion del medesimo, che trovasi al disopra della emersione delle *Trombe Falloppiane*, è disceso all' indietro, e in basso, contro la parte inferiore dell' *Intestino retto*, verso la punta dell' osso *Sacro*, in maniera, che il collo, e l' orificio, con la parte anteriore della *Vagina*, è passato ad occupar in alto il sito, che naturalmente deve esserlo dal corpo della vescica urinaria, contro, e sopra la sinfise del *Pube*, e la faccia posteriore n'è divenuta anteriore,

Retroversione imperfetta.

XXXVI. Nella seconda specie, che costituisce la *Retroversione imperfetta*, il fondo dell' *Utero* occupa la escavazione del carino, appoggiato contro l' *intestino retto*, e contro la concavità dell' osso *Sacro*: la faccia posteriore n'è divenuta inferiore; e il muso di rinca è contro l'arco del *Pube*, nel sito, che dovrebbe essere occupato dal collo della vescica urinaria.

Retroversione parziale.

XXXVII. La terza specie à luogo nelle Fèmine fiacche e déboli, nelle quali l' Utero dopo il parto si è mantenuto flácido, e molle a segno d' essersene piegato il corpo a tergo in quel gran voto, che naturalmente v' à tral mårigine posteriore de' Ligamenti larghi, e il Retto, e l' osso Sacro, in cui ondèggiano le intestina tenui, e alcune piegature del colon. L' orina lungo tempo ritenuta nel tempo del puerpèrio, certi movimenti repentini, e violenti, possono far piegare il corpo dell' Utero flácido in quel voto, intanto che il collo, e il muso di tinca, non ancor troppo diminuiti di volume, ritengono la situazione loro. In tale stato la Donna può concepire e rendersene manifesta al terzo mese la *retroversione parziale*, in cui la faccia posteriore dell' Utero è divenuta inferiore sì, ma soltanto dal collo in sù; essendosi questa incurvata a foggia d' arco, ed incavata, mentre che la faccia anteriore formando una convessità diventa superiore, e seguitando il fondo dell' Utero disceso nell' escavazione diventa per un certo tratto posteriore. Il collo però (lo ripeto) e l' orificio dell' Utero continuano a sentirsi nello stretto superiore, e assai più verso il pube; e quando si spinge il dito esploratore alla volta dell' osso Sacro, tanto per la vagina, quanto per l' intestino retto, si sente un ostacolo ad insinuarsi più oltre, fatto come da un globo ora più, ora men resistente, e fisso.

XXXVIII. Il diagnòstico della *Retroversion parziale* deducesi inoltre da quanto si è già rammentato poco fa relativo alle funzioni lese dell' Utero, della vescica urinaria, e delle intestina, massime del retto, e da quanto siamo per dire.

XXXIX. La *Retroversione* di rado si produce improvvisamente, e tutt' ad un tratto: di rado vi

sono esposte le obèse, cioè molto grasse, attaccando piuttosto le Donne magre, e alte di corporatura, ne' mesi indicati della gravidanza, piuttosto che in altri tempi, sebbene le vergini stesse, non chè le maritate, non inciare, e le puèrpere talvolta sienvi soggette.

Segni della Retroversione principiante.

XL. Da principio si confonde colla difficoltà d'orinare, e coll' infiammazione del collo della vescica, essendovi e ardor nell' evacuazione, e dolor al pube, e all' ipogàstrio superiore quando non si piscia, e peso nella vagina poco molesto sul principio; ma fassi di giorno in giorno sempre più grave, ed incòmodo a segno d' impedir quasi affatto lo sgravarsi della vescica e dell' intestino. Anche l' urina si scorge viziata, diventando spessa, torbida, simile a quella di cavallo, fetida acre; talvolta è rossigna, di color di fégato, e depone sostanze sanguinolente, fioccosse, ora come la pùrulenza, or come ciò, che contengono i tumòri cistici. Nasce stitichezza, e ciò che si evàcua per l' ano è a piccioli pezzi, simile allo sterco delle capre, o de' cani stitici.

Sintòmi della Retroversione confermata.

XLI. In progresso di tempo gl' incòmodi crèscono a segno, che le dòglie simulan quelle del parto, e fan temer imminente l' aborto, l' Utero allòra occupando affatto il vòro dell' escavazione, e non potendo mai estendersi per l' abdomine fino all' umbilico; che se in questa parte si fanno sentir le dòglie, ciò è piuttosto effetto di consenso, e forse di stiramento dell' Uraco, e delle artèrie umbilicali, che d' Utero in quel sito offeso.

Le angustie fra tanto si rendono sempre maggiori; e sommamente doloroso, se non intollerabile

rièsce alla misera incinta l'estrarne le urine col catetere, e l'imporvi clisteri di qualsivoglia natura; il che dà motivo ad enorme tension, e gonfiezza di ventre, che simula ora idropisia ascite, ora rimpanitide, ora gravidanza di sette mesi, e più. Ma siccome le malattie accennate non sono accompagnate da sensibilità dolorosa, e l'*Esploratore* ad ogni minimo palpamento eccita dolori atrocissimi, così l'*Esplorazione* medesima e per la Vulva, e sull'Abdomine, e per l'Ano, ce ne fa giudicar rettamente.

XLII. A questi segni s'aggiunge la somma prostrazion di forze, la debolezza estrema dell'Ammalata, che sovente soffre difficoltà di respiro, dolor di capo, tintinnir delle orecchie, ed altri sintomi nervosi, durezza, celerità, pienezza di polso, il quale al fine diventa e voto, e intermittente, e decisamente febbrile.

Effetti funesti della Retroversione.

LXIII. A tal epoca, se non è pronto il rimedio, non v'è più speranza per la vita dell'infelice, dovendosi temer che la pressione e fatta e sofferta dall'Utero non dia luogo alla cangrena annunziata da nausea, da sforzi vani di vomito, da singhiozzo. Fatta questa tutto si calma, l'inferma si crede guarita, o prossima alla guarigione, e se ne rallegra, ma l'*Esploratore* la fa prontamente munire de' Sacramenti perchè con ragione la crede moribonda.

XLIV. Alla calma lusinghiera, e fallace, di cui favelliamo, suole precedere un movimento interno, come se nella escavazione rotto veramente si fosse, e sbrigliato qualche cosa; e cresce la speranza loro, persuadendosi le inferme d'essere per abortire quanto prima, e di porre così fine a' tormenti, ed a' guai. Talvolta questa sensazione di sbrigliamento, o di rottura succede alla calma ingannatrice già spiegata; perciò priègano l'*Esploratore*, e il *Médico*, affinchè

non le inquietino più oltre, esse più non soffrendo incòmodo veruno: e intanto, che si promettono vicinissimo ristabilimento in salute, tranquille, e liete se ne muojono.

Notizie che ne dà l'Esplorazione.

XLV. Esser le sventurate a questo terribil termine ridotte ben conosce L'*Ostetricante* dalle seguenti mutazioni sensibili tanto nella Vagina, quanto ne' contorni della Matrice, e nell' Ano. Nella Vagina, ove non può con l'ordinaria facilità insinuare il dito esploratore, incontra, poco superiormente alle caruncule mirtiformi, un tumor duro, teso, proporzionato in volume all' epoca della gravidanza, globoso, e tale, che l' incauto *Esploratore* può di leggieri giudicare, che sia ora il capo stesso del Feto già disceso in fondo alla escavazione, ora la borsa delle Membrane distesa dall' acqua dell' Amnio. Il pariete posterior della Vagina è gonfio, rugosissimo, aggomitolato nella fossa naviculare, talvolta prominente alquanto fuori dell' estremità posteriore della Vulva, intanto che le parti anteriori di questa sono ritratte indentro, ed in alto, affatto nascosto l' orifscio esteriore dell' Uretra, e il pariete anterior della Vagina medesima teso, e liscio à dovuto cedere al rivolgimento del collo dell' Utero, che allorà occupa lo stretto superiore del Catino, diametralmente all' opposto della direzione, che dovrebbe avere.

XLVI. Infatti nella *Retroversione perfetta* è inutile che l'*Esploratore* cerchi di toccarlo, e distinguerlo: nella *imperfetta* lo dee cercare non più nella cavità, e verso la sommità dell' osso Sacro, ma contro la Sinifse del Pupe; e per ottenere d'averne cognizione sufficiente convien collocare la Fèmmia sulle ginocchia, e su i gomiti a farla appoggiare assai propria sulla sponda del letto, ed introdurre il dito esploratore rasente il pariete anterior della Vagina di modo,

che la palma della mano rivolta verso il Perineo, l'ugna del dito scorra contro il pariete anterior suddetto, e s'innoltri dietro alla Sinfise del Pube tanto in alto quanto e l'angustia natural delle parti, e la tumidezza morbosa delle medesime permette senza che se ne esacerbino oltre modo i dolori.

XLVII. Con tali cautele s'arriva pur talvolta a distinguer la situazione dell' orificio dell' Utero toccandone i margini: talvolta il solo labbro posteriore è lecito di toccarne, che allora si è reso o anteriore, o inferiore: non di rado nè l'uno nè l'altro se ue può toccare, perchè il fondo, e il corpo dell' Utero *retroverso* ottura intieramente il passo al dito esploratore colla sua mole, benchè questo siasi unto, e convenientemente ingrassate le parti, per le quali è da trascorrere.

Lo stesso Ano altresì è compresso, e l' Intestino retto in guisa tale ristretto, che ad onta delle medesime avvertenze il dito non può farvi dentro lunga strada, nè punto gioverebbe a tal fine di spingere il Coccige indietro, perchè il fondo dell' Utero immerso tra il pariete posterior della Vagina, e l'anteriore dell' Intestino suddetto, intanto che spinge in basso ed allunga, e rende convesso infuori il Perineo, si oppone all' inoltrarsi del dito esploratore su per lo tubo intestinale.

Prògnosi della Retroversione.

XLVIII. Dal complesso de' segni, e de' fenomeni riferiti l'*Ostetricante* può giunger, a pronunciare nò, ma bensì a conghietturare, qual sia per esser l'èsito di questo grave incòmodo: e siccome dal riconoscere, che la *retroversione* è imperfetta, e leggiere, e nata poco tempo dopo del concepimento, è facile a correggersi; dall' osservare, che le urine si evacuano senza difficoltà, e facilmente si richiàmano essendo già supresse; dall' averla riconosciuta fin dal suo principio;

dall' avervi rimediato opportunamente; dal veder imminente l'aborto prima che gravi sintomi insorri siano a minacciar la vita della Donna: siccome, dissi, da tutto questo egli conghietterà che nessun pericolo sia per risultarne; così sospetterà la cosa dover andar male ogni volta, che sarà egli chiamato a morbo già inoltrato; ed affollati i sintomi, de' quali favellammo, egli troverà l'Utero cacciato a guisa di conio nel fondo posteriore del Carino, ed ivi trattenuto o da morbose aderenze nel corso della malattia contratte, alcune delle quali non è possibile di sciogliere senza lacerazione neppur dopo la morte nel cadavero della Donna, o dallo stretto superiore del Carino troppo angusto; o finalmente dalla troppa vastità dello stretto medesimo, e della escavazione, per cui l'Utero ricomposto non cessa di ricadere, e a forza di ricadute, e d'ingrossare, non avrà più luogo novella ricomposizione.

XLIX. Giudicherà finalmente perduta ogni speranza per la sventurata incinta a misura che resiste più lungo tempo a' rimedii lo stato violento, quasi diremmo strangolatorio delle parti incuneate nella escavazione secondo, che dura già da parecchi giorni più veemente l'infiammazione, più gagliarda la febbre; a misura che la faccia si rende sempre più decisamente ippocratica; il polso s'indebolisce, e acquista maggior frequenza, e irregolarità; compariscono sudori freddi sparsi a gocciollette, e scosse di singhiozzo; a misura che le doglie tormentosissime, ond' erano afflitte le interiora del carino, le coscie, e le gambe, massimamente a' polpacci, si calmano improvvisamente, e invece si risvegliano tormini alla regione umbilicale, e colichette simili a quelle, che precedono, alcune volte con nausea, gli spurghi dell' alvo in certe passioni iliache. Allora o si evacuinò materie cadaveriche, o no, queste colichette accompagnate da lipotimie finiscono con un deliquio mortale.

Metodi più opportuni onde curare la Retroversione.

L. Ora, che si sono esposti tutti i fenomeni, che accompagnano i diversi periodi di questa malattia, e che l'*Ostetricante* è al caso di giudicar quale ne sia l'importanza, conviène istruirlo de' mezzi stati finora impiegati per liberarne le Donne; in queste circostanze l'*Esplorazione* potendo riescir utilissima, cangiandosi in mezzo opportunissimo per far la ricomposizione dell' Utero *retroverso*, oltre alle altre indicazioni per via della medesima rese manifeste e patenti, al *Medico* riserbate in quanto all' applicazion de' medicamenti indicati, e al tempo, e alla via per cui si debbono insinuare nel corpo dell' inferma; e al *Certifico* in quanto alle operazioni contemporanee indispensabili, quali sono e il cateterismo, e l'imposizion de' clisteri, e i salassi, o gli altri mezzi di cavar sangue, che si giudicheranno a proposito; e i bagni universali, o i semichippi, e le sciringazioni per la vulva, e le urine, e l'introduzion di qualche corpo, o strumento per l'Ano nel retto intestino.

Quattro cose, che comprendonsi nella Ricomposizione dell' Utero retroverso.

LI. Tutto è per giovare nelle diverse occorrenze, ma assolutamente necessaria è più che ogni altra cosa la *Ricomposizione* dell' Utero *retroverso*, la quale comprende.

1. Il rimuovere tutto quello, che può impedir tale operazione, o renderne inutili, o infruttuosi i tentativi.

2. Il rimetterlo nel pristino suo natural sito.

3. Adoprar i mezzi opportuni onde mantenerlo nel sito, in cui si è per via della *Ricomposizione* rimesso. Al che il *Medico* è dovere, che aggiunga il compimento della quarta indicazione consistente

4. Nel corrèggere mediante i rimèdii adattati quegli altri vizii, che dalla *Retroversione* della matrice troppo a lungo sofferta àno tratto origine.

Ostàcoli, che si oppòngono a tale Ricomposizione, e maniera d'ovviargli.

LII. Fra gli ostàcoli compresi nel primo articolo i più comuni sono la pienezza della vescica, e degli intestini crassi; e questi si rimuovono o col reprimere in alto, e in avanti il fondo dell' Utero situando la Femmina in guisa, che stando prona abbia le natiche molto più alte del torace o delle spalle; cioè distesa per terra una coperta a più doppi, l'inferma si abbasserà col petto fino ad appoggiarvisi anche colle mani, stando in piedi, il che ne allontanerà le viscere dell' addomine dal catino, e diminuirà la pressione sofferta fin all'òra dall' utero, contro il fondo del quale portandosi dall' *Ostetricante* l'indice, e il medio della mano ben unti d'olio, di burro, di sego, o di manteca, in guisa, che l'ugna corrisponda all'osso Sacro, e il polpastrello sdruccioli contro il parete anteriore dell' intestino retto, possasi con questo premere il fondo dell' utero, e farlo rialzare verso il centro dello stretto superiore del Catino. Ciò ottenutosi la vescica meno stiracchiata, e l'uretra meno allungata, e ristretta, riacquisteranno la facoltà l'una di contrarsi, e spinger fuori l'urina, l'altra di ceder all'onda di questo liquido escrementizio, e di trasportarlo per l'apertura della vulva fuori del corpo.

LIII. Giòva talvolta, collocata in tal guisa la Donna, introdurre le dita per la vulva nella vagina in senso contrario all' accennato, e premere il parete posteriore della vagina, sul quale s'appoggia il fondo *retroverso* dell' utero, infino a tanto che abbia ripigliato il suo sito naturale: altre volte poi si rivolgono i polpastrelli delle dita cacciate sù per la vagina

contro il pariete anterior di questa per trarre con la dovuta delicatezza l'ùtrea unitamente alla porzion della vagina, che n' è traforata, affin di renderne almeno visibile l'orificio, e al caso d'ammettere il catetere flessibile, il quale vi si dee poi tener dentro, anche senza stilo, finchè non è cessato il pericolo della recidiva. In tal maniera si rimuove uua delle cagioni della *Retroversione*, come si esclude assolutamente uno de' gravi ostàcoli al *Ricomponimento dell' Utero retroverso*.

LIV. Supposto però, che non sia riescito di smuover il corpo dell' ùtero, e l'urina non si evàcui ad onta de' mezzi suggeriti, incalzando le molestie dipendenti dalla gonfiezza enorme della sovèrchio piena vescica, l'*Ostetricante* dee proporre, o se è *Ceruisico*, eseguir senza ritardo la paracentesi a norma de' lumi, e della perizia, ch' egli à, e proporla, o eseguir all' ipogastro. Votata la vescica, e con i purganti soavi, o co' clisteri votate le intesina, l'ùtero da se stesso ricomponsi, quando la *retroversion* non è *parziale*, nè molto antica, nè in tempo di gravidanza inoltrata verso la metà; e allor conviene ovviare alle ricadute.

LV. Che se il fondo dell' Utero resistesse ancora, farebbe d' uopo, che alla Donna appoggiata per maggior comodità su i gomiti, e i cubiti, si sostenesse da un assistente assiso a lei davanti, colle ginocchia coperte di morbido guanciaie, il capo, intanto che con ambe le mani sotto le di lei ascelle accrescerebbe l'appoggio; e due altri assistenti ne sostenessero uno per fianco le anche, applicando le mani loro contro la sommità delle di lei coscie, e la vicina anguinaja. L'*Ostetricante* assiso basso colle sue gambe fra quelle dell' inferma, dovrebbe insinuar le dita indice, e mezzano della sua mano destra, per l' ano, fino alla maggior convessità fatta dal fondo dell' Utero contro il pariete anteriore del retto, e premere

con delicata forza , a riprèse , ora la parte più elevata , ora i lati del globo , procurando così di renderlo vacillante . Il che ottenuto potrebbe introdurre cautamente le dita corrispondenti dell' altra mano per la vagina , e co' polpastrelli rivolti alla sinfise del pube strisciare dall' alto al basso con qualche forza per ajutare in tal foggia la discesa del collo dell' utero , o almeno rimuovere gli ostàcoli , che le rugosità della vagina , e il volume delle altre parti vi potrebbero opporre . S' aumentano le pressioni colle dita nell' ano dal di dietro in avanti , e verso il centro dell' addomine finchè la globosità à superato il promontorio fatto dal corpo dell' osso Sacro , e dall' ultima vertebra lumbare ; nè si cessa ancorchè per li ripetuti tentativi , e le lunghe pressioni s' intorpidissero le dita , perchè alle volte un momento d' ulterior pressione dà felice compimento all' operazione , la quale non riescirà più quando ad altr' ora si trasporti , ed estratte le dita si dia luogo , e campo all' utero di ricader verso lo stretto inferiore , dal quale ne' primi tentativi èrasi già notabilmente allontanato .

LVI. Avendo l' Operatore bisogno di riposo , e non potendo continuar a premere , terra tuttavia le dita alla medèsim' altezza , alla quale sono state spinte , e gli assistenti faranno agitar il corpo dell' inferma in varia direzione affinchè tutto nell' addomine ondeggiando , e muovendosi , godano altresì del moto comune le parti contenute nel catino , e i movimenti de' muscoli , che cuòprono interiormente quel voto , minorando alternativamente le pressioni , e le resistenze , rendano sempre più facile il ricomponimento , di cui si tratta .

Come si mantenga l' Utero nella situazion sua naturale.

LVII. Rimanci or da accennare ciò , che conviensi al terzo scopo prefissoci nella cura della *Retroversione* , vale a dire a mantener l' Utero nel sito

suo naturale ; oggetto importantissimo dell' *Arte Ostetricia* , posto che tende direttamente a prevenir gli *Aborti* , e a conservar la vita dell' incinta .

Premesso l' inculcar alla Donna di seriamente fuggire quanto può dar novello motivo al male , a cui fu soggetta , e per sua sventura inclina ; premesso l' avviso di ricorrere a *Médico* capace di prescrivere que' medicamenti e per la bocca , e per l' ano , che verranno indicati , e di non istancarsi di ricorrere al cateterismo frequentemente , ogni volta che non si voglia tener il catetere flessibile nella vescica ; si dèe far costruire un pessario comodo , e robusto , ed applicatolo come una piscide intorno al collo dell' Utero trattenervelo col mezzo dell' opportuna fasciatura fin che l' Utero non abbia acquistato quel volume , che gli renda impossibile il girar sul proprio asse , e tornare col suo fondo ad occupar l' escavazione .

Se la Sinfiseotomia al Pube , e la Paracentesi dell' Utero non converrebbero nella Retroversione insuperabile .

LVIII. Il detto fin quì suppone , che il *Ricomponimento* siasi ottenuto coll' opera sola delle mani dell' *Ostetricante* . Che se l' inconiamento fosse tale , che resistesse a qualunque degli sforzi suggeriti , converebb' egli abbandonar alla forza del morbo l' aggravantesi la sventurata ? Non potrebbe l' *Ostetricante* o proporre , o eseguir egli stesso la *Sinfiseotomia* per ottenere e da' lati , e anche nel mezzo del catino , spazio sufficiente alla ricomposizion dell' utero retroverso ?

LIX. E se quest' ultima operazion riescisse inutile ancor essa , non avremmo ancor qualche speranza nella *Paracentesi dell' Utero* , e delle *Secondine* fatta per la via della vagina , e in quel sito , che fosse più opportuno per l' evacuazione delle acque dell' Amnio , non esclusa nemmeno la via dell' intestino retto ? Con quest' ultima operazione si procchura assolutamente

l'Aborto, e la morte del Feto! Sì, ma non morrà egli unitamente alla madre persistendo la *Retroversione*?

Battesimo del Feto nell' Utero Retroverso.

LX. Facendo la *Paracentesi*, diminuito il volume dell' Utero per lo scola dell' acque, questo si ricompone più agevolmente; l'*Aborto* succede come all'ordinario, e forse qualche giorno dopo, e senza maggior rischio della Madre; ma probabilissimamente colla salute procacciata all' Anima del Feto; sul quale si possono, e si debbono spingere le acque rigeneratrici del *Santo Battesimo* col mezzo d' uno schizzatòjo adattato alla cannella del trequarri, o dello strumento suggerito dal BELL per le altre paracentesi, che, al finir d' evacuarsi le acque dell' Amnio, non si estrarrà dall' Utero prima d' aver battezzato (sotto le usate condizioni) il Feto.

Della Antiversione della Matrice.

LXI. Se la *Retroversione*, della quale si è detto quanto basta per ammaestramento delle *Mammæ*, e degli *Ostetricanti* di Contàdo non meno, che per quanto concerne la *Esplorazione*, à luogo principalmente ne' primi mesi della *Gravidanza*, mentre che la Matrice è ancora nella *Escavazione*, e non può durare inolto al di là del sesto mese, se pure può arrivar a quel termine; L' *Antiversione totale*, o *perfetta*, cioè il rivolgersi della Matrice col suo fondo al davanti della *sinifse del pube*, a segno, che pendendo questa sulla faccia anterior della sommità delle coscie e della *Vulva*, perchè gl' *integumenti comuni*, e propri dell' *abdòmine* rilassati; e penduli a guisa di sacco, si allungano abbastanza per ammetterla, resta col suo collo, e coll' *orifcio* rivolto in sù, e la faccia anterior della viscera stessa diventa posteriore, come

questa resta rivolta all' innanzi: l'Antiversione, dissi, quando suppongasi *totale*, o *perfetta* qual è quella di cui qui favelliamo, non può darsi se non dopo del terzo mese della gravidanza, dopo che la matrice fattasi più voluminosa, nè potendo più esser contenuta nello stretto elittico, si elèva nella sezione scema, e spinta da vârie forze, che la premono di dietro innanzi, non contrabilanciâte da' muscoli dell' abdòmine rilassâti, si rovescia colla vescica urinària nel sacco suddetto.

Quali Donne vi sieno soggette.

LXII. Le Donne grasse, panciute, molto larghe di fianchi, picciole di statura, non curanti delle conseguenze de' parti, voraci, stitiche, salaci a segno di non frapporre, un tempo discreto fral parto, e la còpula, e sòlite a ingravidar con facilità, sono le più soggette a tale *Antiversione*, perchè non accordano alla Matrice, nè alla vescica, nè a' muscoli del basso ventre, nè alle altre parti contenenti comuni e proprie, l'agio di ripigliare il natural sito, nè di riacquistare il natural volume, e l'opportuna robustezza loro, e la elasticità.

Indizi dell' Antiversione esteriòri.

LXIII. L' *Esploratore*, che sospetta un simile disordine dal volume, dalla procidenza in avanti del pariete anterior inferiore molle dell' abdòmine, e dagli altri indicii di gravidanza, col dito nella vagina tenta invano d' arrivar al collo dell' ùtero, perchè trova quel canale più allungato, più ristretto men rugoso dell' ordinario; e giunto alla sommità dell' osso Sacro sente, che il proprio dito è tratto in avanti verso l'asse superior del catino dal pariete posterior della vagina, che là in alto fa come una specie di volta,

e si continua in avanti. Sente anche più sgombra la parte anterior del catino dietro alla sintise del Pube, perchè anche la vescica ripiegata pende coll' utero nel sacco, su cui però la mano sinistra dell' *Esplorazione* applicata di piatto, non arriva a distinguere ciò, che contiensi, per la spessezza degl' integumenti e de' muscoli, onde tutto è coperto.

*Indizi somministrati dalla Esplorazione
per la Vagina.*

LXIV. Ancorchè si tentasse di ricondurre l'Utero, e la Vescica nel Catino facendo collocare sul dorso la l'emmia, e premendo mollemente quel sacco, eziandio dopo l'uso ripetuto de' clisteri, e trattenendo ciò che si comprime in alto, non è sempre possibile d'arrivare colle dita esploratrici all' orificio dell' Utero, se, dopo usate le medesime diligenze, non si fa situar boccòne la Gràvida, appoggiata sulle ginocchia, e su i gomiti; e se l' *Esplorazione* non si fa dal di dietro, portando il polpastrello del dito contro la sintise del pube fin oltre alla medesima, e piegandolo alquanto, mentre che con una larga tovaglia un assistente solleva, e trae verso il petto (appoggiandola contro il sacco al pettignone) tutto ciò, che fuor dell' abdòmine sta pendente. Allora si sentono i labbri, gli orli dell' orificio rivolti in su, molto più pastosi di quello, che mai sògliano essere quando stanno pendenti nella vagina o verticalmente, o rivolti verso l'osso sacro; e ciò per una quantità di sierosità, che gli inzuppa, la quale esce poi dalla vagina in dose ora minor ora maggiore nel coricarsi la Donna su i fianchi stando essa in letto.

Sintomi dell' Antiversione.

LV. I sintomi dell' *Antiversione* dell' Utero sono

sempre più distinti quanto più s' inoltra la gravidanza, perchè verso il sesto, il settimo mese, oltre alle successive, talvolta abbondanti, evacuazioni d'acqua dalla vagina, fra le quali v'anno intervalli di qualche settimana; oltre a frequenti difficoltà d'urinare, seguire poi da incontinenza d'urina; oltre al volume sempre maggiore del ventre già dal pettegòne, solito a diminuir in proporzione dell'effusione delle acque; oltre al peso delle sostanze contenute nel sacco, e agli stramenzi dolorosi, che la Donna soffre a' lati del carino, massimamente alle sinfisi sacro iliache; oltre a tutto questo l'*Ostetricante*, l'*Esploratore* può assicurarsene esaminando il tumor esteriore, e sentendovi durezza, e disuguaglianze non solite a sentirsi ne' tumori sarcomatosi, allora i patimenti, a' quali va soggetta l'incinta, avendone diminuito alquanto la pinguèdine, l'obesità; e la vescica, compressa dalla maggior mole dell'utero più pesante, rendendo meno equivoca la cosa.

Altri indizi tratti dalla Esplorazione.

LXVI. Inoltre il dito dell'*Esploratore* trova sempre più angusto, e liscio il canal della vagina; più reso il pariete posteriore, che ne fa come la volta; più spugnoso e più macero l'orlo dell'orificio dell'Utero a livello del corpo del pube; superiormente al quale si eleva, e rëndesi più sensibile all'esplorazione quanto più s'accosta al settimo mese, nel quale per l'ordinario, dopo molti incomodi, e doglie equivoche, succede l'*Aborto*, e il Feto esce per lo più morto già da qualche tempo, e sparuto, con le carni, e la pelle appassita; o cou varie lividure intorno al corpo, come se avesse sofferto gravi, e replicare contusioni.

Tre consigli, che l'Ostetricante può dare nella Antiversione.

LXVII. I consigli, e gli ajuti, che può dar

l'Ostetricante, ove trattisi di questo vizio di situazione nell' utero, riguardano

O l' impedirlo, affinchè non abbia luogo;

O il correggerlo già contratto,

O il prevenirne, l'evitarne, o il minorarne i funesti effetti.

Come s' impedisca nelle Puèrpera.

LXVIII. Nel primo caso egli suggerisce alla *Puèrpera* lo star in letto il tempo necessario perchè l' utero sgravatosi d' ogni sovrèchia umidità ripigli nel carino la natural sua situazione, e i muscoli, e gl' integumenti dell' addomine, riacquistara la forza, l' elasticità, la contrattilità loro, possano mantenervelo. Anzi ove la *Puèrpera* avesse abortito per tal motivo, all' abbandonare il letto, in cui starà più lungo tempo, la indurrà a provvedersi di mutande, la cintura delle quali molto alta, e robusta, si possa stringere abbastanza, e sostener ai lati, e al davanti con nastri, o bottoni, che la uniscano al corsaletto. Il comodo, che ne trarrà, di leggièri determineralla a continuar a portare simili mutande fin che sia notabilmente inoltrata in novella gravidanza, e a non abbandonarle, anche in tale stato, contentandosi di rallentarne la cintura a seconda dell' aumentarsene il volume del ventre per non impedire il crescere del Feto.

Come si rimèdii all' Antiversione esistente.

LXIX. Nel secondo caso questo vizio già contratto, e la gravidanza già inoltratasi verso il sesto mese, richiède che l' incinta ben regolata nel virto si sottometta ad un clistere emolliente ogni dì, e a star in letto supina cogli ischi alquanto più elevati delle ultime vertebre de' lumbi; e porti le mutande

colla cintura a canipana, di modo che la parte più stretta di questa si affibbi sopra un de' fianchi vicino al gran trocantère, o alla sommità della còscia sopra un degl' ili, la più larga si adatti anteriormente al sacco, in cui è l' útero; in guisa però, che si possa strringere a piacimento, e venga sostenuta a' lati anteriori del ventre per mezzo di due fascie larghe tre dita, come da scapulàre munito di due fibbie per accorciarlo a misura, che l' útero va ripigliando nel centro del catino, e sù per l' addòmine, il natural suo sito.

LXX. L' *Esplorazione* per la vagina c' istruisce dell' epoca desiderata, sentendo il collo dell' Utero nell' ordinario sito, e scuoprèndone l' orificio più o men basso verso la sommità dell' osso Sacro. Allòra l' *Ostetricante* accorda all' incinta che abbandoni gradatamente, e per intervalli insensibilmente più lunghi il letto, e la situazion supina cogli Ischi depressi, e le còscie alquanto piegate, non esentàudola però dall' uso frequente de' clisteri, nè da quello delle mutande.

Danni che pòsson recare gli strumenti duri.

LXXI. Chi pretendesse di ridurre l' útero *antero*, e di mantenerlo in sito con istrumenti elàstici, e sodi, essendo incinta la Donna, e sapèndolo esso, o dubitandone, si renderebbe reo dell' aborto, che ne seguirebbe, almèno in faccia al mondo, che l' immatura uscita del Feto livido, o morto, attribuirebbe alla dura pressione fatta sul tenero corpicciuolo dal sòlido arnese, di cui si sarebbe servita per consiglio dell' *Ostetricante* la Donna.

Come si minòrino gli effetti dell' Antiversiòne.

LXXII. Il terzo ajuto, che consiste nel prevenire, nel minorarne, o nell' evitare i funesti effetti

dell' *Antiversiòne*, s' appoggia tutto sulle cautèle, e su gli avvisi dati finora, perciò, che riguarda l' *Esploratore*, e l' *Ostetricante*; il rimanente s' aspetta al *Médico*, il quale usando la debita attenzione intorno a' sintomi, che accompagnano questo vizio, sa dissipargli prescrivendo gli opportuni rimedii, e preservarne l' inferma con suggerimenti relativi a' bisogni, allo stato fisico, e alla condizion della medesima.

Degli otto Motivi, per cui si fa l'Esplorazione nel tempo del Parto.

LXXIII. I motivi principali per cui si fa nel tempo del *Parto* questa operazione, oltre agli accennati finora, sono gli otto seguenti:

1. Conoscer lo stato delle parti sì molli, che dure per le quali debbono discendere il *Feto*, e le *Secondine*.
2. Assicurarsi della buona, o cattiva situazione della *Matrice*, e della sua direzione.
3. Distinguere la qualità delle *Dòglie*, e dedurne la prontezza, o la lentezza del *Parto*.
4. Convincersi se questo sia *naturale*, o no.
5. Conoscere se il *Feto* nell' Utero sia *Unico*, o *Gemello*, o se maggior numero ve n' abbia.
6. Se è situato bene, o male; *naturale*, o *mostruoso*.
7. Rilevar se sia vivo o morto.
8. Finalmente discernere gli ostacoli, e i danni a' quali danno luogo le *Secondine*, e il *Tralcio umbilicale* prima del *Parto*, nel *Parto*, e dopo dell' uscita del *Feto*.

Denominazione delle specie diverse de' Parti.

LXXIV. Tratteremo separatamente di cadauno degli accennati motivi, che rendono l' *Esplorazione* indispensabile affinchè nulla s' ignori di ciò, ch' è relativo ad un oggetto, che sparge lume sì chiaro intorno alle circostanze del *Parto*, e a' partiti da prendersi

ne' casi intricati, e difficultosi. E' necessario però far precedere la notizia de' termini, de' quali ci serviremo per indicar le diverse specie di *Parti*, o sia delle *Espulsioni de' Feti delle Matrici umane*, dicendosi *Aborto l'espulsione del Feto da tal Matrice prima del settimo mese dal dì del concepimento*.

Parto immaturo, o *precòce*, quello, che avviene tral settimo mese, e l'ottavo e mezzo.

Parto maturo l'uscita del Feto alla luce sul fine del nono mese della gravidanza.

De' *Parti Naturali, Non-naturali, e laboriosi* equivalenti a que' che si fan naturalmente, a quelli, che esigono aiuto dall' *Arte colla sola mano*, e a quelli, che assolutamente esigono l'uso degli strumenti, parleremo a suo luogo, giacchè la *Esplorazione* riesce appunto più vantaggiosa in questi ultimi potendo contribuire a rendergli meno terribili, e meno difficultosi.

Moderazione indispensabile all' Esploratore nel Parto.

LXXV. Avvertasi però, che senza espressa necessità l' *Ostetricante* non dee stuzzicar le parti genitoli d'una Donna vicina al parto; ed assicuratosi, ch'essa è giunta a termine, dee introdurre rarissime fiato le dita allo svegliarsi delle vere *dòglie*; moderatissimamente, e con somma cautela quando incalzano; e poco, o nulla, essendo il capo fra le labbra della Vulva, quand' ogni cosa va bene, e la Partoriente è già madre d' altri figliuoli. Sia momentanea l' *Esplorazione* d'una Fèmmia gràvida sorpresa da perdita di sangue, o dal trabocco, che diciamo *emorragia*, non essendo ancor a termine, e non incalzando le *dòglie*, assicuratici, che l' orificio dell' Utero non è aperto; altrimenti collo stuzzicarlo imprudentemente si farà crescere l' emorragia, e si promuoverà l' *Aborto*, o il *Parto precòce*. Che se colla perdita insorgessero le *dòglie promoventi*, potrebbe esplorarsi a qualunque ora

la Donna . E se la gravezza di queste , o di quella , indicasse la necessità dello sgravarsi l' Utero , converrebbe disporvela .

MOTIVO I.

*Conoscere lo stato delle Parti Genitali ,
e delle Secondine .*

LXXVI. Ciò posto , allorchè l'*Ostetricante* brama d'istruirsi della conformazion delle parti genitali , per levare gli ostàcoli , che i difetti loro potrebbero opporre all'uscita del Feto , o pronosticar la *lentezza del parto* incorreggibile senza colpa sua , colloca l'incinta in quella delle *quattro situazioni* , ch'è più confacèvole al caso , e comincia dall'assicurarsi della morbidezza , e sufficiente dilatabilità della Vulva , e dell'apertura inferior della Vagina , la capacità della quale percorre tutta col dito , onde rimuover ogni sospetto , che da tumòri , da esostòsi , da pòlipi , da pròcidenze di vescica , o d'intestino retto , da sovrèchia urina , o da matèrie fecali quel canale trovisi ristretto . La Gràvida stessa , o il Marito ne avran prevenuto l'*Ostetricante* , il quale tuttavia ne dèe con attenzione riconoscer e il sito , e il volume , e la qualità per rimediatvi , o far che da perito Cerùsico , s'è possibile , vi si rimèdi .

LXXVII. Se il dito esploratòre incontra aderenze tra le parèti della Vagina , brìglie , frèni , restringimenti preternaturali , conseguenze di malattie sofferte , cicatrici di lacerazioni fattesi nel caso di *parto laborioso* già preceduto ; se vi trova specie di vòlvule membranose molto rilevate , capaci però di dar èsito a' mèstrui per qualche apertura loro , difformità , che non s'oppongono alla *Fecondazione* , ma possono invincibilmente opporsi al *Parto* ; non aspetta gli ultimi giorni della *Gravidanza* a servirsi de' mezzi , che

la Cirugia propòne per la cura indispensabile , talvolta assai lunga , di mali così fatti .

Quali rimèdii pòssano usarsi nelle angùstie morbòse delle Parti Genitáli dall' Esploratore .

LXXVIII. Bisogna distinguere ciò che pur ora additammo da' piccioli tumoretti , dalle rugosità della vagina un pò più elevàte del solito , da' leggièri strozzature , sensibili per la lunghezza del canale , di cui le parèti può qualunque *Ostetricante* ammollires , e render estensibili un mese , o sei settimane prima del termine , per mezzo d' iniezioni tiepide , di linimenti , e in ispecie con cilindri di tela morbida a foggia di pessari pieni d' erbe emollienti , imbevuti della decozion delle medesime , spalmati d' unguento d' altrèa , di popùlcon , o col mezzo d' una spugna morbida ridotta a foggia di pessario , munita di forte nastro perchè si possa estrarre a piacimento , imbevuta della decozion delle erbe , radici , e semi , o frutti della indicata qualità : questa gonfiando giòva di più .

Osservazioni intorno alle Procidenze .

LXXVIII. Le *Procidenze* della vagina , del collo , o di tutto l' Utero , e quelle dell' intestino retto o sono *compiute* , o *incompiute* , e o la *Gràvida* le soffre nell' atto dell' *Esplorazione* , o vi è soltanto soggetta ; finalmente se vi è soggetta convien sapere se quest' incòmodo la molesti nel tempo della *Gravidanza inoltrata* , e più ancora in quello del *Parto* . Perciocchè accade , che Donne soggette a *Procidenze* d' utero , o di vagina quando sono in libertà , divenendo *Gràvide* più nol sono , il volume acquistato dall' Utero vietandogli , che possa cadere nel fondo del caitino , e presentarsi colla Vagina fuor della Vulva , e formarvi un tumor più o meno voluminoso , ed

incarnato, qualche volta simile in figura ad un grosso pero, con un buco in basso, e sempre men rugoso alla superficie quanto più grosso.

Come si conoscano, e vi si rimedii.

LXXX. La discesa della Matrice in fondo al pelvi, però non ancor fino alle Ninfè, alla quale vanno soggette Femmine per altro ottimamente costrutte, si conosce agevolmente perchè il dito esploratore appena inoltratosi al di là di quelle, incontra il muso di rinca. Che se tal Donna si trovasse in procinto di partorire, incalzando le döglie, ed aumentandosi gli sforzi, il medesimo dito noterebbe, che il margine posteriore dell' orificio è più allungato in basso, che quel davanti: e per evitar in così critico frangente la procidenza consiglierebbe alla Partorientè d'astenersi a tutto potere da ogni sforzo, o premito, la collocherebbe orizzontalmente supina nel letto, sostenerrebbe i lati dell' orificio dell' utero ad ogni döglià coll' indice, e col mezzano introdotti, e tenuri costantemente scostati nella vagina, o almeno spignerebbe con forza in sù il labbro posteriore in fino a tanto che la testa del Feto si avesse fatto strada nella vagina, e potesse presentarsi senz'altro rischio alla Vulva.

LXXXI. Ma per esser giunto troppo tardi l'*Ostetricante*, per avversion della Donna all' *Esplorazione*, o per negligenza, può il collo della matrice riempito dal capo, o da altra parte del Feto, trovarsi già interamente fuor della Vulva. Il tatto c'istruisce subito di tale spiacevole accidente, cui si porta rimedio sostenendo le parti fuoruscite con morbidi pannolini, e occupandoci seria e frettolosamente nell'estrazione del Feto, che colla *Puerpera*, corrono grave pericolo per l'esitazione, l'incertezza, e il ritardo. Questo però non è il tempo d' esporre altri metodi, che quelli di *esplorare* per trarre quanto maggior vantaggio si può da così importante operazione, cui mediante ci

assicuriamo anche della buona o cattiva struttura del catino nelle sue pareti interiori, la pèssima consistendo nella insuperabile angustia delle due *Sezioni*, e degli *Stretti*.

Come l'Esplorazione indichi i vizii della Struttura del Catino.

LXXXII. I vizii dello stretto superiore si conoscono col dito inoltratosi fino al collo della matrice, perchè sente l'arco preternaturale, che il Sacro fa in avanti, o uno degli Ilii verso il lato opposto invece di presentar al tatto una concavità. Così sente, che il Pube è appiattito, o à la Siuffse prominente indentro. Vizio, che angustiano i diametri del Catino a segno di rendere difficile se non affatto impossibile l'ulterior discèsa della testa quando questa non è in disposizione di stringersi allungandosi abbastanza a tal fine, oppure la Partorientente non à forza bastevole a produr que' lenti, e talvolta inutili effetti.

LXXXIII. Per assicurarsi meglio della perversa struttura del Catino di cui l'*Esplorazione* col dito à mosso grave sospetto, per non dir che à dato positiva certezza, giova osservar tutt' attorno i fianchi, il ventre, il dorso della Gràvida, e notar se all' arco fatto dal Sacro in avanti corrisponda a tergo al di sopra delle natiche una concavità, e se troppo piatti in vece d'esser convessi alla Siuffse, o eziandio concavi, sono al davanti i Pubi. Le mani sole, quando per decenza non vòglionsi espor nude le parti accennate all'occhio, applicate col pretesto di cangiare, e migliorar la situazione della Donna, bastano a convincerci di tal verità, e indurci a prender le necessarie precauzioni a tempo, giacchè pur troppo occorrerebbe di proporre come unico scampo per lo Feto, se non ugualmente sicuro per la Madre, l'Operazion Cesàrea: del che però il *Pelvometro* nostro dà più sicura cognizione.

LXXXIV. Anche i difetti della sezione inferiøre si manifestano coll' *Esplorazione*, le dita accorgendosi della grossezza, della lunghezza, della curvatura delle tuberosit  degli Ischii, e della soverchia vicinanza delle braccia loro, tra le quali, e il Coccige, v'  esempio, che l'indice, e il mezzan dito dell' *Ostetricante* a malissimo scatto potessero penetrar colla punta in una Giovine ben fatta, i contorni de' fianchi e delle natiche della quale non avevano esteriormente indizio veruno di strasordinaria conformazione.

Coll' *Esplorazione* pure si conosce la troppa lunghezza della spina degli Ischii, se questa   troppo acuta, s'  troppo ricurva al di dentro; la soverchia lunghezza, e piegatura innanzi del Sacro, o del Coccige, e l'inflessibilit  di questo. E gli ost coli, che derivano da questi ultiuni vizii meno pericolosi di que' che dipendono dalla viziosa struttura dello stretto superiore, e della escavazione, ci lusinghiamo di superargli pi  agevolmente variando le situazioni della *Partoriente*, e talvolta respingendo il Coccige indietro, ma molto meglio coll' ammolir, e lubrificare assiduamente le pareti, tra le quali il capo del *Feto* dee farsi strada, e coll' esercizio della flemma, e della pazienza.

MOTIVO II.

Assicurarci della buona, o rea direzione della Matrice.

LXXXV. L'assicurarci della buona, o cattiva situazione, e direzione della Matrice nell' *Imminenza del Parto*,   il secondo de' motivi, che rendono indispensabile l'*Esplorazione*; perch  se l'obliquit  di questa viscera rende inutile la maggior parte degli sforzi della Madre, e delle ripetute contrazioni dell' Utero, eziandio che il *Feto* siavi ottimamente collocato, qual serie d'inconvenienti gravissimi non ne seguir  quando la cattiva situazione di questo sar  complicata con

l' obbliquità di quello? L' *Esplorazione* in caso tale regolerà la nostra condotta, e ci determinerà a dar la situazione più opportuna alla Madre affinchè ripiglii l'Utero, o acquisti la direzione verso la Vagina, che meno si scosta dalla naturale.

Osservazioni intorno alle varie situazioni, e direzioni della Matrice nella Imminenza del Parto.

LXXXVI. Siccome l'oggetto che ora esaminiamo è di sommo rilievo, così per meglio capire quanto siamo per dirne giova applicar tutta la nostra attenzione a questi brevi riflessi. Nella Donna in procinto di partorire la Matrice ben situata occupa il mezzo del ventre col fondo alquanto rivolto al davanti, e l'orificio verso il corpo della terza vertebra dell'osso sacro: sicchè una linea tratta dal fondo della Matrice passerebbe per l'orlo anteriore dell'orificio di questa per lo terzo posteriore dell'asse minore della sezione mezzana del Catino, se avesse da terminar al sito indicato della concavità dell'osso Sacro della Madre. Di là si riflette questa linea obliquamente in avanti per terminare alla forchetta, o alla commissura posterior delle labbra della Vulva. Nel corso naturale del Parto la testa del Feto percorre la linea obliqua superiore al principio; e questo poi è prossimo al compimento a proporzione, che la testa s'inoltra all'innanzi a seconda della linea inferiore. Direzioni corrispondenti alla natural inclinazione del voto del Catino, onde agèvolan mirabilmente l'uscita del Feto non arrestato nel suo tragitto fuorchè dalle naturali inevitabili resistenze delle parèri destinate ad impedirne l'immatùra, e la precipitosa caduta, attorniate da parti sottili, e molli, atte a preservarle dalla rùvida collisione, dalle conusioni, che nascerèbbero dal soffergamento dal capo del Feto contro le medesime qualora fosser applicate sulle nude ossa.

LXXXVII. All' incontro la Matrice invèce d'occupar il mezzo dell' abdòmine può *Antivèrersi*, cioè cader e pèndere all' innanzi come in un sacco fatto da' troppo déboli integumenti comùnì e proprii di questa cavità, allungàtisi anteriormente al pube; può esser inchinata a destra, o a sinistra; e allora ben si capisce, che la linea supposta poc' auzi non serba più la direziòne del centro della cavità del Carino, e che le contraziòni dell' ùtero débbono spinger la testa del Feto nel primo caso contro il màrgine posterior superiòre dello stretto superiòre, e là trovarvi resistenza insuperàbile, eguale a quella, che nel secondo troverà contro i lateràli.

Esplorisi la Donna, e troverassi il collo dell' Utero alla parte opposta a quella ov' è il fondo, se pur essendo quello molto elevato allo svegliarsi delle dòglie, il dito esploratòre non incontra difficoltà ad arrivarvi. Vi arriverà dipoi ma distinguerà soltanto una parte dell' orlo, l' altra, spinta al di sopra del màrgine della seziòn inferiòre, sottraèndosi tuttavia alle ricerche dell' *Ostetricante*. Data la situazion dovuta alla Partoriente ci riuscirà di strisciar il dito sul contorno dell' orificio, e di sentirlo inegualmente dilatato con un labbro storto, e probabilmente attenuato da quel canto, che fu maggiormente compresso contro il catino dalla testa del Feto.

MOTIVO III.

Distinguer la qualità delle Dòglie, e dedurne la prontezza, o la lentezza del Parto.

LXXXVIII. Per intender ciò che costituisce il terzo motivo dell' *Esplorazione* che consiste nel distinguere la qualità delle Dòglie, e dedurne la *prontezza*, o la *lentezza del Parto*, conviene aver presente alla memoria, che la cavità dell' Utero al fin della gravidanza

si aumenta per così dire alle spese di quella, e della sostanza del collo. In fatti si appiattisce, e si assottiglia a segno, che verso il nono mese, e talor anche al principio dell'ottavo, l'orificio n'è così aperto, le parèri sì tenui, sì molli, ed arrendevoli, che può insinuàrvisi la punta del dito, e a traverso delle membrane sentire i movimenti del *Feto*. Tal osservazione dèe indurre l'*Ostetricante* ad avvertir la *Gràvida* che s'astenga da ogni fatica, dalla vettura, dal còito, e che non s'allontani dalla propria casa, perchè potrebbe partorir prima del termine ordinario, e improvvisamente. Dunque il *Parto* suol esser *imminente* ogni volta, che al dito esploratore il collo dell'Utero si presenta allargato, assottigliato, coll'orificio dilatato, e a questi si uniscono gli altri segni manifesti all'occhio, e quelli che si traggono dalla bocca stessa della Donna già diffusamente da noi annoverati.

Effetti delle Dòglie Vere.

LXXXIX. All'insorgere delle *vere Dòglie* sul principio del *Parto* sembra, che i parieti del collo si facciano più spessi, più solidi, e l'orificio elevandosi alquanto se ne stringa, inentre che si porta più indietro: ma questi fenomeni durano pochissimo; e allo svegliarsi della quarta o quinta dòglia vera tutto si cangia, il muso di tinca sfigurasi affatto formando un cerchio più o meno spesso, con cui abbraccia il segmento di sfera fatto dalle membrane spintevi dentro dalle acque dell'Amnio, o dal capo, o da altra parte del *Feto*. Allora l'orificio dell'Utero abbandona la parte posteriore del carino: contro la qual èrasi elevato per ritornare nel sito primiero sempre più dilatandosi, e dando luogo a maggior copia d'acque che sotto cadavina contrazion della matrice spingon più abbasso a fuggia di *Borsa* le membrane. Il dito misura i

varii gradi di queste mutazioni insinuato, e strisciato colle debite cautele ne' soli casi di necessità, trattandosi d'assicurarsene per promuover il meglio del *Parto*, ed evitarne o correggerne il peggio.

Parto Naturale Felice.

XC. Ingrossando la *Borsa* per le acque ond'è turgida, giunto al sommo dell'attenuamento il collo dell'Utero, e ampiamente allargatosi l'orificio, una *Dòglia* violenta squarcia la *Borsa* e l'acqua sgorga con impero dalla vulva. Intanto nuove *Dòglie* con prèmiti sempre più gravi, e frequenti si risvegliano, perchè il capo del Feto s'inoltra per la vagina e cagiona alla Partoriente sentimenti come dello squarciarsi le interiora, ed ancorchè l'*Ostetricante* non ne tocchi la Vulva, si lagna strillando del mal, che crede gli si cagioni dalle dita; le quali se s'introducono nella vagina indurrano subito la sfera talvolta ovale, ed allungata, che è il capo, e ne sentono i capegli, o ne distinguono le altre parti, se non è nella situazione ordinaria, e naturale il Bambino, che finalmente scosta le labbra della vulva, distende, ed allunga il perineo, ed esce alla luce.

Altre osservazioni sulle Dòglie vere.

XCI. Finora esaminammo il corso ordinario de' fenomeni, che precèdono ed accompagnano il *Parto*, ammettendo come *vere*, e *buone*, tutte le *Dòglie* che lo precedèrro, giudicandole promosse dall'azione simultanea dell'Utero, de' muscoli del basso ventre, e degli Espiratorii, massime del Diaframma; giacchè dobbiamo sapere quanto efficacemente contribuiscano mediante la contrazion loro a spinger fuori del seno della Madre il Bambino, allargandone forzatamente, e dolorosamente le pareti del collo, e gli orli

dell'orificio. Partono queste Dòglie da' fianchi, da' lati del fondo della matrice con una forza, che ne fa giuocare tutto il contenuto contro l'orificio medesimo, costretto di cedere agli urti ripetuti, e alla forza del còno fatto dalle membrane spinte giù dall'acqua dell'Amnio, che tende ad aprirlo, e a dilatarne i màrgini, del che il dito esploratòre dopo cadauna Dòglia con piacer si assicura.

Dòglie vaghe, e false.

XCII. Si frammischiano talvolta altre *Dòglie vaghe* dipendenti dalle stirature de' ligamenti del carino, dalle pressioni irregolari, che ne soffrono le parti contenute, da' flati ora scorrenti, ora inceppati nelle circonvoluzioni delle budella, dalla quantità, o qualità degli escrementi, e da varie altre cagioni. A queste l'*Ostetricante* sa porger rimedio, e non si lascia sorprendere col giudicarle *Dòglie di Parto*.

XCIII. Avvene però d'un'altra specie, *False Dòglie* ancor esse, che si rassomigliano alle vere per lo corso loro, e assalgono le povere gravide varii giorni consecutivi, e talor anche varie settimane prima del *Parto*. L'*Ostetricante* ne calcola il poco durar di cadauna, e specialmente il restringersi sotto ognuna d'esse l'orificio dell'Utero contro del quale à portato con destrezza, mollemente, il polpastrello del dito esploratòre, quasi che i màrgini appressandosi sempre più vògliano opporsi all'uscita del Feto.

Dòglie che debbonsi calmare coll'Arte
nel fin della Gravidanza.

XCIV. Avvi altresì qualche *Dòglia* veramente Uterina, che assale all'improvviso verso il fin della *Gravidanza*, senza che l'*Incinta* v'abbia dato motivo.

I rivolgimenti spontanei del Feto le cagionano, e in simili circostanze i forti dolori a' lumbi, il peso molestissimo sull' ano, i polsi pieni, ed elevati, il color animato del viso, tutto potrebbe concorrer ad ingannare e la *Gravida*, e la *Levatrice* chiamata ad assisterla, se questa negligerà d' insinuar il dito fino all' orifscio dell' Utero per osservare se sia semiaperto senza punto contrarsi, nè strigner il dito ad ogni doglia; se conservi tuttavia teso il contorno, solido, e prolungato in basso; e se le membrane che in fondo a quell' orifscio si posson toccare, sieno tuttavia flacide, e in esse eccitar si possa una leggier fluttuazione.

XCV. Notando essa quanto espòsimo, e sentendo caldo assai il collo, e il contorno dell' orifscio dell' Utero, non solo non neglige queste *Doglie*, sicchè se continuassero di leggieri si cangierèbbero in *Promoventi* il *Parto* forse *Precòce*, crescendo d' intensità, e di durata, fa chiamar o il *Médico*, o l' *Ostetricante*, affinchè prescrivano ciò che fa all' uopo, in caso di necessità suggerendo essa stessa il salasso alla mano, o al braccio, quando la ridondanza del sangue fosse manifesta, e il caso premuroso, ed urgente.

Doglie, che nel Parto stesso debbonsi calmare.

XCVI. Finalmente anche nel tempo del *Parto* per lo spàsimo, e il giuòco de' nervi soverchio agitati, fra le vere *Doglie* insorgonne altre, che abbisognano d' altri calmanti, d' iniezioni acquose, mucilagginose, di clisteri oliosi tiepidetti, amollitivi, se vogliamo dissiparle; e il dito esploratore da' segni già esposti n' è il miglior giudice, posto che c' istruisce de' progressi, che fa, o non fa sotto le doglie la borsa delle acque, e dell' inoltrarsi, o uò, verso la vagina il capo del Feto: notizie dalle quali, come abbiamo ripetuto altre volte, deducesi se il Bambino

sia per uscir presto, o tardi, da quell' ergastolo, affin di saperci regolare a norma del bisogno, e di tranquillizzar la timida, ed inesperta Partoriente, che c' importuna colle continue domande se partorirà felicemente, e se sarà ben presto liberata da tante pene. A tali interrogazioni mal si può rispondere quando non si sa in che stato sono le parti interessate; nè di questo si à certezza eccetto mediante l' *Esplorazione* intrapresa in diverse epoche fralle prime *Dòglie* e il *Parto*.

Otto notizie relevantissime, che si ricavano per mezzo dell' Esplorazione in tempo del Parto.

XCVII. Per nostra istruzione adunque del pari che per appagar la comparibile curiosità della *Partoriente*, e tranquillizzarla, potremo *esplorare*

1. Per sapere la vera situazione del collo della matrice:

2. Per sentire se questo corrisponda direttamente all' asse della vagina, o pieghi troppo addietro, all' innanzi, o ad un de' lati.

3. Per riconoscere lo stato de' margini dell' orificio dell' Utero, vale a dire se sièno molli, sottili, arrendevoli.

4. Per assicurarci de' differenti gradi della dilatazione del suddetto orificio, e specialmente se questa, lenta da principio, si ottenga rapidamente qualche tempo dopo

5. Per giudicar dello stato della Borsa fatta dalle membrane per lo peso, e la spinta dell' acqua dell' Amnio; cioè se sia piatta e larga, o allungata ed angusta, occupata dall' acque sole; e se s' aumenti a proporzion delle dòglie, e dell' incalzar de' premiti.

6. Passata qualche dòglia s' esplora altresì per discernere a traverso delle membrane qual sia la parte, che il Feto presenta all' orificio, e se questa sia sferica,

liscia, uguale e resistente, per essere convinti ch' è il capo.

7. Squarciàtesi le menibrane, e sgorgata l' acqua ond' era rigonfia la Borsa, si esplora per meglio distinguere qual regione del capo il Feto presenta: se questa è guernita di capegli; se vi sente la fontanella posteriore, e il corso della divisione naturale degli ossi parietali dal pube della Partoriente al sacro, o fors' anco dalla cavità cotiloidèa d' un lato alla sintife sacroiliaca dell' altro.

8. Incalzano le doglie e conviene assicurarsi se la testa è discesa a dovere nel fondo del catino, il che si annunzia dalla difficoltà, che il dito esploratore incontra ad insinuarsi verso la sommità della vagina, perchè la testa del Feto è ugualmente compressa; o ancora dallo stretto ellittico delle ossa del catino, o dal dilatatissimo contorno dell' orificio dell' Utero, sicchè non può inoltrarsi nemmeno su per i lari della testa; e sentendo la fontanella anteriore discendere giù per la faccia concava dell' osso sacro, sarà convinto, che il viso del Feto è da quel canto, cioè quale debb' essere affinchè sia *naturale*, e riesca *Felice il Parto*.

Prògnosi del Parto Felice e Pronto.

XCVIII. Avendo successivamente col mezzo dell' *Esplorazione* notizia di disposizioni così favorevoli al *Parto* per la testa, può l' *Ostetricante* tranquillizar la Donna, e farle sperar pronto lo sgravio, supposto che il catino sia ben costruito, laudèvoli le contrazioni uterine, succedentisi a tempo; che il Bambino sia vivo, e che la *Partoriente* gioisca d'una sanità a propósito per reggere agli sforzi, a' quali la impegnano, la stimolan le doglie.

Prògnosi del Parto lungo, e laborioso.

XCIX. *Lungo, e laborioso* al contrario è per

riescire quel *Parto*, che sarà preceduto, e accompagnato da segni opposti a quelli, de' quali si è trattato finora: e *laborioso*, e per isventura *fatàle* altresì è per farsi, per alcuni motivi, che dipendono dal Feto stesso, dalle *Secondine*, e dall' *Utero*, del che l'*Esplorazione* può a tempo darci utile avviso.

MOTIVO IV.

Convincerci se il Parto sia Naturale, o no.

C. Per *Parto non-naturale*, o *contro natura* vogliamo intendere quello, in cui *preséntasi dal Feto all' Orificio dell' Utero qualunque altra parte eccetto il vertice*, o *sia la sommità della testa*, oppure *si presenta il Cordone umbilicale*, o *la Placenta medesima*, giacchè in tali circostanze ordinariamente è necessario l'ajuto dell' arte acciocchè si compisca: Non neghiamo però, che quello, in cui si presentano i piedi, le ginocchia, le natiche siasi qualche volta compiuto per le sole forze della Natura; e crediamo a tutti già noto per quanto espòsimo avanti, che moltissime volte il *Parto* impossibile a compiersi per la testa felicemente si compie col *Rivolgimento del Feto*, estraendolo per li piedi: ma la mano dell' Artèfice in questi ultimi casi vi à sempre la parte principale; e negli altri contandosi appena quattro per cento *Feti* sani, e *matrni*, presentanti i piedi, ed usciti senza il soccorso dell' *Ostetricante*, ci persuadiamo di non errare se nella classe de' *Non-naturali* gli collochiamo: tanto più poscia que' che presentano le ginocchia, o le natiche, i quali ultimi si dicono dal vulgo *Doppi* a cagion della doppiatura del corpicciuolo, che si estràe in tal situazione dall' *Utero materno*.

Prògnosi tratta dalla Borsa delle Acque.

CI. Prevediamo col mezzo dell' *Esplorazione*, che il *Parto* non sarà *naturale*, allorchè la *Borsa delle*

acque si forma disugualmente ; e invèce di riescir tonda , emisfèrica , si allunga a foggia di budello , o di pèro ; e l' aumento della medesima non corrisponde alla forza delle dòglie divenute più frequenti , e più lunghe . Nè distruggono la verità di queste osservazioni que' pochi casi a noi medèsimi offèrtisi , di *Borsa* emisfèrica , e tesa , e sempre più turgida incalzando le dòglie , la quale precedette le nàriche del feto ; nè que' pochissimi incontràti pure da noi , dove la *Borsa* lunga a segno d' arrivar fra le labbra della vulva , piriforme , e flacidissima , precedeva la testa benissimo situata , uscita dopo la rottura di quella felicemente . Queste varietà , che fanno rare eccezioni alla regola , dipèndono ora dallo stato del collo della matrice , ora (e più spesso) dall' arrendevolezza delle membràne .

*Prògnosi tratta dalle diverse parti del Feto ,
che l' Esploratòre distingue .*

CII. Lo prevediamo altresì quando nell' intervallo delle contrazioni uterine il dito *esploratòre* sente a traverso delle membràne , e fors' anche del labbro anterior dell' orificio , qualche membro del Feto , la forma del quale è confusa , difficile a determinare ; perciocchè può allora dubitarsi , che quello non sia il capo , o che questo non sia nella situazione , o secondo la direzione ordinaria .

Giòva però sospèndere il nostro giudizio , e ripètere l' *Esplorazione* eziandio con due diti , se un solo non basta ad illuminarci intorno alla figura , ed alla qualità del membro più pròssimo al muso di tinca ; e tali esplorazioni farle negl' intervalli fra le dòglie , affinchè l' acqua , onde s' inturgidisce la *Borsa* , o si preme il labbro anteriore , non accresca la confusione , e maggiormente non asconda la figura , la solidità , e l' estension della parte , che si presenta . Così ci riesce di distinguer le nàriche men dure , più piate

del capo; la faccia tutta picciole disuguaglianze; il ventre molle, e molto esteso, ordinariamente accompagnato dal funicolo ombelicale, simile ad un mediocre budello, e pulsante, le ginocchia, e i gomiti molto men voluminosi, e sferici, della parte capelluta della testa; il petto, il fianco, una spalla, il dorso, le anche, le mani, i piedi, la struttura delle quali membra è nota ad ognuno.

CIII. Prima che sia squarciata la Borsa dell'acqua dunque non è sempre possibile decidere schietto qual parte presentasi dal Feto; salvo che nella Borsa già fosse caduta una mano, i piedi, o il tralcio ombelicale. E bensì facile giudicar, che esso è mal situato.

In tale incertezza sentendosi col dito l'apertura dell' Utero sufficiente, giova tosto squarciar le membrane colla punta dello stesso dito allor ch' una forte doglia le fa inturgidire, e le tende; e intanto che ci assicuriam qual sia il membro, che stentammo a conoscere, toccandolo a nudo, conoscendo esser necessario, indispensabile il rivolgimento del Feto, si passa colla mano tant' oltre, che basti per trarne i piedi nella vagina, senza permetter, che la parte mal rivolta contro l'orificio dell' Utero, vi s' impegni soverchio, e l' Utero stesso vdrisi di tutta l' acqua, e si modelli, si stringa, fortemente contraendosi, sul Feto, onde la mano dell'*Ostetricante* sia poscia impedita ne' movimenti opportuni. Che se il membro impegnato nell' orificio, o fuoruscito colle membrane, fosse un piede, allora converrebbe portar la mano in traccia dell' altro per compiere senza ulterior dilazione il Parto.

M O T I V O V.

Ricavarne se il Feto sia Unico, Gemello, o Multiplice.

CIV. Il quinto motivo d'esplorare si è la molteplicità possibile de' Feti nell' Utero stesso in una sola

Gravidanza, che allora dicesi *Composta*. Due Feti diconsi *Gemelli*, *Trigemelli* se ve n'è tre, *Quadrigemelli* se quattro, e *Quinquegemelli* se cinque contemporaneamente ne portava nell' Utero la Donna, come quella fecondissima di Saluzzo sgravatascene felicemente nel termine di poche ore l'anno 1785, di modo che tutti cinque ebbero le acque rigeneratrici del S. Battesimo, e due sopravvissero qualche giorno.

Quattro maniere di presentarsi i Feti multipli al dito dell' Esploratore.

CV. Siccome la Natura scherza nel numero, così scherza talvolta per fini a noi tuttravia nascosti nella disposizione delle *Secondine*, e nella situazione de' Feti relativa tra di essi, o tra questi, e la Madre; circostanze che presentano fenomeni particolari all' *Esploratore*, come prescrivono indicazioni diverse in riguardo al Parto. Si danno pertanto Feti

1. Racchiusi in una medesima vescica comune.
2. In Amnio diverse, ma quelle Amnio racchiuse in una sola Corio, e questa fornita d'una sola Placenta.
3. Involti cadauno nelle proprie Amnii, e Corii distinte, provveduti di Placente pure distinte, in guisa però, che le Corii addossate anno contratta aderenza tale da non potersi senza violenza, e lacerazione disgiungere. Lo stesso è delle Placente, sebbene tra i margini delle medesime, che si combaciano, l'unione siane assai meno stretta, che quelle delle Corio.
4. Finalmente contenuti, come que' della citata Saluzzese, in Secondine affatto distinte, e separate a segno, che all'uscir d'ogni Feto tenne dietro intiera, e proporzionata la sua Secondina.

Indizi della multiplicità de' Feti.

CVI. De' quattro casi riferiti il terzo è il più

frequente, ed è per avventura il solo, che lasci talvolta segni esteriori capaci di dar sospetto di due Feti nell' Utero; perciocchè mentre l' Utero è chiuso sono equivoci tutti gl' indizii de' *Gemelli*, quantunque diventino più sensibili verso il termine della *Gravidanza*. Lo straordinario volume del ventre a qualunque epoca di questa; la specie di linea verticale, che sembra distinguer in due parti laterali l'addomine, più apparente negli ultimi mesi; l'edema del collo de' piedi, anzi di tutte le estremità inferiori fin dal terzo, o dal quarto mese; i movimenti in siti diversi dell' addomine, che la gravida lagnasi di sentire nello stesso tempo, accompagnano anche le *Gravidanze semplici*. Però incontrando molti de' segni descritti ad un tratto confessar dobbiamo, che ciò costituisce talvolta forti presunzioni sull' esistenza de' *Gemelli*, sebbene alla sola *Esplorazione* sia riserbato il dritto di dissipar ogni dubbio sopra un oggetto così importante, quando si eseguisce negli ultimi mesi.

CVII. Allorchè il ventre è abbastanza voluminoso da far giudicare *Gemello* il prodotto della *Fecondazione*, se non ne contiene più d'uno, e se altro vizio organico non avvi nell' addomine, quel Feto è sempre mobilissimo, perche nuota in larga copia d'acqua; ed insinuandosi il dito fino al collo dell' Utero se con questo si urta istantaneamente, il Feto sale rapido a battere contro il fondo, e tosto dopo ricade a percuoter in modo sensibile l' Utero sul collo, il che dal dito esploratore si distingue. In vece che difficilmente si accorge del moto accennato quando sonvi due Feti, comprimendosi nelle membrane loro scambievolmente, ed essendo poche le acque onde sono avvolti. Si applichi poi una mano di piatto sul ventre in que' momenti, in cui la matrice è rilassata, e forse vi si potranno distinguer i Feti con evidenza eguale a quella, con cui vi si distingue in pari circostanze ora il piede, ora il ginocchio, ora le natiche, ora il capo di quel solo, ch' essa contiene.

CVIII. Non mèrità gran biasimo l'*Ostetricante*, che prima del *Parto* non osa assicurarlo *Gemello*; ma in gravissimo incorrerebbe se dopo l'uscita d' un Feto non si accorgesse, che àvvene ancor un altro, dal rimanere tuttavia molto tùmido, e resistente l' Utero; da' movimenti, che la *Puérpera* asserisce di sentirvi; dalla difficoltà d'evacuàrseue le *Secondine*; alla quale volendo esso rimediàr cautamente, ed introducendo la man nell' Utero affin di conoscer la natura dell' ostàcolo, che vi si oppòne, sarà egli davvero inesperto, se non arriverà a sentir l'altra vescica occupata dall' altro Feto, e dalle altre acque, onde l'utero è ingombro; o dato che rotta già ne fosse la vescica, se non distinguerà il corpo, il capo, o gli articoli del Feto, che si presentano a poco a poco, o sònosi già presentati all' orificio del medesimo.

Dopo l' uscita d' un Feto, indizi positivi dell' esistenza d' un altro nella Matrice.

CIX. In difetto di quanto sinora s' accennò, del che sarebbe riprensibile l' *Ostetricante*, si risvegliano ad avvisarlo nuòve dòglie, l' intensità, la durata, e la frequenza delle quali non à più che fare con le promuoventi l' espulsion delle *secondine*. Ma tali dòglie alcune volte tardano parecchie ore a farsi sentire; anzi abbiàm osservazioni, che non insorsero eccetto dopo uuo, due giorni dall' uscita del primo Feto, ed anche più tardi. Allora l' impudente *Ostetricante* richiamato, e convinto della pròpria disattenzione, ed imperizia, renterà egli di cuoprirlo assicurando d' averlo conosciuto ma di non averne parlato per non inquietàre fuor di pròposito la *Puérpera*: e non averne procurato l' uscita perchè, conosciuto non ancor maturo il Feto, ogni ulterior operazione sarebbe stata inutile, se non pregiudiciàle? Vana scusa ed insulsa; l'*Ostetricante* dee far sapere,

che l'Utero contiene ancor altra prole; e se non àvvi emorragia, nè altro sintoma, può lasciar prendere qualche respiro alla Partoriente, se lungo, e laborioso fu il primo *Parto*, ma non abbandonarla se non à interamente vorato l'Utero.

CX. Altro indizio di *parto gemello* può trarsi dal sentir col dito, che l'orificio dell'Utero dilatasi più stentatamente di quello, che il peso delle parti nel medesimo contenute, e la vivacità degli sforzi, la violenza de' prèmiti della Donna, promettevano al principio del parto; e che la borsa dell'acque è meno sferica, men prominente del consueto. Inoltre i prèmiti sono interrotti da risentimenti dolorosi in parti diverse della matrice, il che fa sospettare, che non dipendano da una sola, unica, ordinaria cagione.

Feti Gemelli, che si presentano ad un tratto nell'Orificio dell'Utero.

CXI. Se poi àvvi circostanza, in cui l'*Esplorazione* riesca vantaggiosa per la Madre, e per li Feti; se ve n'è, in cui essa liberi da nojosi funesti imbroglia l'*Ostetricante*, questa è la contemporanea apertura d'amendue le vesciche indicate nel terzo caso, sia questa fatta dalla violenza degli sforzi, o dal dito dell'*Ostetricante*; e l'incontrarsi due Feti in una *secondina* sola, del che dièdimo un cenno nel primo; e la discesa delle gambe, o delle braccia d'amendue i Feti per l'orificio dell'Utero, ad un tratto.

CXII. Sono elleno le prime? Conviene osservare se i pollici si corrispondano, e se sieno i piedi uguali in volume, ed in lunghezza del pari, che in colore, non essendo per l'ordinario i Feti perfettamente simili. Nè ciò basta, perciocchè deesi portar le dita esploratrici fino alle parti genitrali di quel Feto, lungo

la parte interna della gamba del quale si è fatta mollemente strisciare in alto la mano. Giunte queste alla biforcazione del tronco, alle parti genituali del Feto, si accompagna la coscia, e la gamba vicina dello stesso Feto sino al piede, in maniera che sembra impossibile errare nell' estrazione, che tosto se ne intraprende. Che se, arrivando le dita alla biforcazione del tronco, si perdesse la traccia dell' articolo, cui si tenea dietro, ben si capisce, che il piè già disceso nella vagina sarebbe d' altro Feto, e che bisognerebbe andar in traccia del compagno, se non si vogliono sacrificar due Feti, e fors' anche la Madre, all' incuria propria.

MOTIVO VI.

Dedurne se il Feto sia bene, o mal situato.

CXIII. Per indicare poi l' utilità, che risulta dalla diligenza nell' *esplorare*, diciamo qualche cosa delle circostanze, che renderèbbero sempre più *lento*, *difficile*, *pericoloso*, e anche *fatàle* il *Parto*, se questa operazione non guidasse gli *Ostetricanti* a prevalersi piuttosto d' un mezzo determinato, che de' molti altri, i quali possono affollarsi loro alla mente come del pari efficaci, allor che si accorgono il *Feto* essere mal situato.

Ma prima fissiamo il valore di certi termini, de' quali si fa uso frequente appresso agli *Ostetricanti*, e che usare forse potremmo anche noi nel progresso del presente discorso volendo esprimere la situazione delle diverse parti del *Feto*, che si presentano all' orificio dell' Utero, relativamente alle diverse parti del Canale materno. Al vocabolo *Situazione* si suole in tal caso aggiungere a norma delle circostanze il termine *prima*, o *seconda*, o *terza*, *quarta*, *quinta*, o *sesta*, perchè si pretende, e con ragione, di specificare così con maggior brevità, e chiarezza la

parte del carino, a cui quella del *Feto*, che sta per uscirne, corrisponde.

CXIV. Ciò produce a mio credere un effetto più pronto quale si desidera nella immaginazione dell' *Esploratore*, dell' *Ostetricante*, allorchè all' espressione = *Prima situazione* = Si connette l' idea della migliore, cioè di quella, posta la quale il *Feto* è per uscire più presto, e più felicemente dall' Utero, oppur di quella in cui dovrebb' esser collocato affinchè questo desiderabil esito se ne ottenesse. Così la *seconda* dovrebb' essere quella, che in bontà succedesse alla *prima*, e via sempre men buone s'intendessero le altre, di modo che la peggior di tutte venisse ad essere la *sesta*.

Sei Situazioni, che nel Parto può prendere la testa, o qualsivoglia altra parte del Feto.

CXV. Stabilita una tal gradazione, ogni volta, che diremo, o leggeremo, che il *Feto* in quella tale occasione presentava o il viso, o altra parte del suo corpo all' orificio dell' Utero, nella Vagina, o alla Vulva nella *prima situazione*, vorremo indicare, o capiremo, che il viso ne corrispondeva, o era in faccia alla sinfise sacro-iliaca sinistra del carino della Parroriente, e coll' occipite era in faccia al fondo della cavità cotiloidèa del lato destro.

La 2. *situazione* indica che la parte riguarda la sinfise sacro-iliaca destra.

La 3. *situazione* ce la rappresenta contro il corpo dell' ilio sinistro.

La 4. contro quello dell' ilio destro.

La 5. contro la faccia interna dell' osso Sacro.

La 6. che è la peggior *Situazione* ci fa capire, che il viso del *Feto* era in faccia alla sinfise del Pube.

CXVI. Quello, che abbiamo supposto del viso

del Feto supponiamolo di qualsivoglia altra parte, o membro, purchè se ne risguardi sempre quel lato, che corrisponde alla faccia anteriore del di lui corpo, e la idea, che ci risveglierà tal espressione sarà sempre giusta, e luminosa. Per esempio de' piedi osservisi sempre la punta, o le dita; del tronco il petto o l'addomine; delle mani il pollice, o la palma; e non correremo più rischio di sbagliarla.

Precetti pratici, che in casi simili deducansi dalla Esplorazione ben eseguita.

CXVII. Ciò posto nell' *obbliquità della testa del Feto* non è egli il dito dell' *Esploratore* a cui dobbiamo la cognizione de' siti più sgombri? Per esso allora ch'è impossibile alla Natura sola di raddrizzarla, la mano dell' *Ostetricante* potrà più facilmente penetrare nell' *Utero* affia di rivolgere il *Feto*, o introdurvi sia la *Léva*, sia quella *branca del Forcipe*, colla quale si possa ottener, senza il *rivolgimento*, l'uscita del *Feto* medesimo.

Per la situazione della Fronte.

Non discerne egli, che la fronte appoggiando contro la linea aspra dell' *Ilio destro*, e il mento contro il sinistro, il ventre, il corpo tutto del *Feto* è nel lato manco dell' *Utero*, e i piedi probabilmente si troveranno a destra, e tanto in alto, e in avanti, che per giugnervi l' *Ostetricante* dovrà collocar la Donna sulle ginocchia, e sui gomiti, e penetrar nell' *Utero* facendo strisciar la sinistra rasente il parete anterior della Vagina?

Per la situazione del Mento.

CXVIII. Non conosce egli, che il mento appoggiato al *Pube*, e la *Fronte* al *Sacro*, denota il ventre

del Feto essere contro quello della Madre, e per arrivar a' piedi doversi collocar supina la Donna, che altrimenti non può sgravarsi, e fare strisciar la destra contro l'incavatura sacro ischiatica sinistra, e respinto a destra il capo del Feto, inoltrarla sul lato sinistro del medesimo, finchè arrivando all'Ilio del Feto senta se le coscie, e i piedi sièno piegati contro del ventre; oppure incurvati a seconda dell'arco naturale delle vertebre lumbàri, si trovino contro il pariete interno posteriore dell' Utero? siàsi qualsivoglia il sito, dove si troveranno in mezzo dell' Utero i piedi, a distinguergli tosto dalle mani, onde evitar di prender queste per quelli, serve la perizia nell'esplorare maravigliosamente.

Per la situazione delle Tempie.

CXIX. Nel presentarsi dal Feto la Tempia è l'*Esplorazione*, che ci fa distinguere la sutura sagittale inclinata verso l'uno, o l'altro lato del margine ellittico della sezione inferiore, e dintra la faccia essere rivolta in sù, in basso, o da un lato; quando però la Borsa dell'acque è già rotta; perchè a traverso di queste l'*Esplorazione* riesce facilmente equivoca. Evacuàtesi le acque, ed abbassatosi alquanto il capo, che non discende mai presto in tal frangente, il dito conosce, che è un parietale ciò, che tocca, dall'ampiezza, e dal liscio; non essendo quest'osso diviso per metà come il coronale, nè così disuguale, e prominente come l'occipitale. Se l'obliquità del capo non è grande il dito sente, che la sutura sagittale non divide ugualmente l'apertura dell' Utero, inclinando o a destra, o a sinistra quando il Feto à la faccia verso il Pubè, o verso il Sacro; oppure anteriormente, o posteriormente quando risguarda uno degl'Ili.

Per la situazione della Nuca .

CXX. Presèntasi egli colla nuca il Feto , o col giùgolo , ch' è la parte anteriore del collo ? L' *Esplorazione* comìncia a farne sospettare dalla lunghezza , dalla picciolezza della Borsa , che non è seguita da parte veruna sensibile , che s' impegni nell' orifìcio dell' Utero ; e questo si contràe debolmente sotto d'oglie rare , e leggière . Ce ne assicura poi evacuate le acque , sentendo l' eminenza fatta al giùgolo dalla laringe , dall' acutezza del mento , qualòra il dito vi può arrivare , se tràtasi di Feto , che presenta il davanti del collo . Vi discerne altresì la fossetta alla sommità dello sterno . Discerne poi la nuca dalla fossa dell' occipite , che tèrmina a un corpo duro e tondo , dalle ineguaglianze delle vèrtebre cervicàli , e dalle scàpule , che si sèntono sù i lati della sommità del dorso .

Per lo presentàrsene altre parti del Capo .

CXXI. La rotondità della fronte divisa in mezzo dalla continuazion della sagittale futura , le fosse degli occhi , l' elevazion graduata del naso , la profonda apertura della bocca , sono cose tanto sensibili , che rotte le membrane il dito esploraròre subito le distingue scorrendovi sopra con destrezza ; e dalla situazione loro si deduce qual sia la direzione del capo , e conseguentemente quale il sito dell' Utero , in cui è la maggior massa del corpo del Feto , e qual via debba percorrere la mano per arrivar a' piedi qualor indispensabile ne sia il rivolgimento .

Per lo presentàrsene le Mani .

CXXII. La picciolezza , e la division profonda delle dita ; la distanza , e la mobilità del pòlice ; la palma e il dorso della mano sottile , e senza eminenza , simile a quella , che presenta il piede al calcagno ,

fanno agevolmente distinguere qual sia quel de' due articoli, che s'affaccia all' orificio dell' Utero, prima che la Borsa sia rotta, quand' è già disceso nella Vagina. Dal dorso della mano del Feto rivolto alla sinistra della Madre l' *Ostetricante* conghiettrura il capo del Feto occupar il lato sinistro dell' Utero; e servendosi del braccio per guida, lo sterno, o le scapule, alle quali arriva il dito medesimo, indicano se il petto, o il dorso del Feto sia verso l'osso Sacro, perchè l' *Ostetricante* pènetri nell' Utero in cerca de' piedi, servendosi o della destra, o della sinistra; e se debba collocar boccòni la Partorienti, o supina.

CXXIII. Un altro indizio l' *Esplorazione* ci dà dell' esser destra, o sinistra la mano del Feto discesa nella Vagina, assicurandosi della direzione della mano stessa, che ordinariamente inclina verso il pariete destro della Vagina, ed à il pòllice verso il Pube, il mignolo verso il Sacro quando è la sinistra; è dimostra, che il Feto à il petto verso il ventre della Madre. Inclina pure a destra la mano, ma à il pòllice a tergo, e il mignolo anteriormente, quando è comparso colla destra nella Vagina il Feto, che allora sta col petto volto in faccia alle vertebre, e probabilmente à le coscie piegate sul suo ventre, e i piedi poco lontani verso l' Illo destro.

CXXIV. Possono presentarsi amendue le mani all' orificio dell' Utero, il che coll' *Esplorazione* agevolmente si conosce; e siccome in tal caso non occorre altro, se non andar in traccia de' piedi, così risparmia tutte le ulteriori ricerche, per inoltrarsi nell' Utero al fine indicato, servendosi de' mignoli del Feto per determinare d' inoltrarsi nell' Utero per quel verso, che loro corrisponde.

CXXV. Essendo collocato il Feto col capo a destra, gl' indizi, che l' *Esploratore* trae dalle mani discese nella Vagina, sono fondati sulle direzioni delle dita pòllice, e mignolo, opposte a quelle, che pur

ora dissimulo. Il dorso della mano destra è contro l'Ilio destro, e il pollice al davanti, e il Feto à la faccia, il petto, il ventre, rivolti al ventre della Madre. E' egli rivoltò col ventre alle vertebre materne? la mano sinistra, ch'è nella Vagina, à il mignolo in avanti, il dorso allo stess' Ilio destro, e il pollice, e ralvolta la palma, alquanto inclinata verso l'osso Sacro materno. A buon conto il mignolo delle mani guiderà sempre le dita esploratrici all' ascelle, e al petto del Feto, come il pollice de' piedi le guiderà sempre alla biforcazione inferiore del tronco, alle parti della generazione, e alla coscia del lato opposto, affinchè riconoscittane la situazione, possa impadronirsene, e rivolgere, o estrarre (se è già rivoltò) il Feto.

Per lo presentarsene il Gòmito, o il Ginòcchio.

CXXVI. Il dito esploratòre discerne il gòmito, e il ginòcchio, quando si presentano all'orificio dell' Utero, dalla picciola estensione del corpo rotondato, che vi sente, e dalle piegature, che strisciandovi attorno attorno distingue. Ma sulla convessità del ginòcchio, sempre più grosso del gòmito, e men disuguale, v' à la rotella, picciòl osso emisfèrico, e mòbile, la qual mobilità manca nell' olecràno al gòmito. Il ch'è sendo notò all' *Esploratòre* non gli permette alcuno sbaglio, e lo guida immediatamente alla ricerca de' piedi, se al ginòcchio, che si presenta non sarà tanto vicino l' altro, e tanto piccioli amendue, o tanto impegnati nell' orificio dell' Utero, che il miglior partito sia lasciar uscire, o estrarre per le ginòcchia medèsime il Feto.

Indizi della Cangrèna delle Membra, che il Feto presenta all' Orificio dell' Utero.

CXXVII. Dal pastoso, dal fètido, da' lembi di

ciricola, che se ne distaccano, può bensì l'*Esploratore* (l'occhio del quale non può arrivar fino a scorgerne il livido, il piombino) giudicare, che sia cangrenoso, o mortificato l'articolo, che esce dall'orificio; e questa cognizione gli fa prudentemente accelerar l'*Estrazione*, o il *Rivolgimento del Feto* colle debite cautele; ma non l'induce mai al barbaro partito d'estirpare, a forza di torcere, quelle membra, che possono appartenere ad un Feto ancora vivente. Egli è sicuro, che tal crudele carnificina non agèvola *Parto*; e se non si sente capace di condurlo felicemente a termine, invece d'accrescere gl'imbrogli, di moltiplicare gli scogli, d'avvicinar i pericoli coll'imprudente maneggio, non differisce più oltre il raccomandarsi al soccorso, e a' consigli de' Maestri dell'Arte, dando ascolto alle voci del proprio dovere, e provvedendo così alla propria riputazione, intanto, che provvede efficacemente alla vita della Madre, se non anche per buona sorte a quella del Feto.

CXXVIII. Alla vita spirituale di questo avrà pensato, e provveduto, appena accortosi del pericolo, somministrandogli colle debite condizioni l'Acqua salutare del *Battesimo*.

Feto Attraversato.

CXXIX. Dicesi *attraversato* dal vulgo, o *situato in traverso* il Feto, quando presenta all'orificio dell'Utero il dorso, o il petto, o il ventre, o i fianchi, o le anche; a riconoscer le quali parti se l'*Esplorator* non riesce, non essendo rotte ancora le membrane, egli ne sospetta però dalla lentezza nel dilatarsi dell'orificio dell'Utero, e dal prender questo una figura ovale. Il dito, che ne esamina i margini, gli sente fiacchi, non appoggiando essi contro veruna parte del Feto, che gli preme in giù.

La Borsa allungasi a foggia d'uovo, e non diminuisce di volume cessate le doglie, che sono languide, e rare, e lontane. La Partorienti si lagna di stramento doloroso a' fianchi, o di spinta all' umbilico, secondo che l' *attraversamento* del Feto è da un fialco all' altro, o dal pettignone alle vertebre.

Tralcio Umbilicale che precede il Feto.

CXXX. In alcuni casi d' *attraversamento* la Borsa è occupata dal tralcio umbilicale, del che egli s' accorge subito distinguendone la figura, anche a traverso delle membrane, simile a quella d'un budello, e la pulsazion vivace delle arterie pel medesimo cordone trascorrenti. Evacuatesi le acque il dito meglio si assicura di tal situazione toccando a nudo le parti, che s' appoggiano sull' orificio, o che ne son poco discoste.

Indizi delle varie parti del tronco che si presentano all' Orificio dell' Utero.

L' ineguaglianza del filo della schiena, o sia delle apofisi spinose delle vertebre, assicurano, che si presenta il dorso. Quella delle costole, e dello sterno, che è il petto; la profonda mollezza della pelle, e l' inserzion del tralcio, che è il ventre; la durezza arcata da un canto, e la profonda mollezza dell' altro, che è una delle anche ec. cc.

Qual Fianco presentisi dal Feto.

CXXXI. Conosce poi, che presentasi il fianco destro, o sinistro, e che la testa è a destra, o a sinistra, inoltrando il dito o al davanti, o verso il Sacro, e successivamente a destra, o a manca per sentir da qual parte sia il molle del ventre, e da quale

l'inflessibile delle ossa innominate, o l'elastico delle coste. Allòra stabilisce la direzion, che dee prendere con tutta la mano, e prefigge i movimenti indispensabili del Feto, che si accinge ad estrarre per li pièdi.

Qual Anca, e qual Natica.

CXXXII. Ravvisa la notabile diversità, che passa tra l'anca, la natica, o la spalla, quando una di queste si presentano all'orificio, osservando, che l'anca incontra maggior difficoltà ad imboccarlo, che à vicina la prominenzia del gran trocantère o la sommità dell'osso della coscia, e che non può esserne distante l'arco fatto dalla cresta dell'Ilio: insinuandosi poi maggiormente il dito per lo squarcio delle membrane s'arriva alla piegatura dell'inguine, al molle dell'addomine, alle parti esteriori genituali, o alle ineguaglianze della spina del dorso, o dell'osso Sacro.

CXXXIII. Prima dello scòlo dell'acque è difficile distinguere la natica, che si presenta, eccetto dalla lentezza della dilatazion dell'orificio, e dalla distanza, che dura lungo tempo, tra questo corpo molle alla superficie sì, ma resistente addentro, e i contorni dell'orificio. Dopo di tale scòlo o è una sola, o son tutte due le natiche in quelle angustie; e il dito *esploratore* strisciando oltre per quel verso, che gli oppone minor resistenza, ora penetra nella fessura naturale fra le natiche, e vi distingue l'ano; nè abbandonando questa fessura osserva s'ella è in traverso, o diretta dal Pube al Sacro, il che illumina circa la situazione del corpo, e specialmente de' pièdi, o della testa del Feto: e sentendo l'osso Sacro in una parte, e le parti genituali nella opposta, ne deduce dove sia il ventre, e dove il dorso del medesimo. Notizie importantissime per collocar opportunamente la Donna, e per fissar qual mano l'*Ostetricante* debba adoperare, e da qual parte nell'Utero più vantaggiosamente insinuarla.

CXXXIV. Arriva talvolta , che il Feto appoggiando le natiche all' orificio , sotto alle contrazioni dell' Utero evacua una matèria renace , fetente , fosca verdognola , che dicesi *Mecònio* : e questo serve pure ad indicar tale situazione . Però l'*Ostetricante* non dee prendere il torbido , il fetente di tali acque sporcate dal *Mecònio* come indizio di morte , o di purificazione del Feto .

Il presentarsi dal Feto una Spalla .

CXXXV. Se l'*Esploratore* incontra col dito una prominenza rotonda acuminata , da qualche lato della quale partano due striscie ossose ; se in poca distanza sentasi una pulsazione proveniente da un corpo cilindrico solidetto , che è il lato del collo .

Se più oltre riconosca un corpo solido piatto , che è la scapula ; e dal lato opposto una fessura profonda , che è l'ascella , decide , che il Feto presenta la spalla ; situazione svantaggiosissima per esso allorchè già da lungo tempo s'è rotta la borsa , perchè il collo stranamente incurvato non può non offènderne micidialmente la spinal midolla . Non perde tempo , e va subito in traccia de' piedi per non estrarre , dopo altri tentativi inutili , morto il Feto , o per non vederlo a trar gli ultimi aneliti appena trattine i primi , fralle mani stesse dell' *Ostetricante* .

M O T I V O V I I .

Rilevarne se il Feto sia vivo .

Dodici cagioni principali della morte del Feto nell' Utero .

CXXXVI. Ma indipendentemente dalle cattive situazioni accennate , il Feto può morire nel seno

della Madre tanto per malattie umorali sofferte dall' una , o dall' altro , quanto per colpi , cadute , spaventati sofferti da questa ; o per le convulsioni , l' emorragia , che accompagna la separazione della Placenta dalle pareti interne dell' Utero , o la rottura del tralcio umbilicale , o lo stramento di questo attortigliato dattorno al collo del Feto , che ne venga strozzato ; finalmente per esser da troppo tempo inchiodato nel collo dell' Utero , o maltrattato da mani inesperte , e crudeli , e per altre cagioni .

Dieci indizi più frequenti di tal morte .

CXXXVII. L' *Ostetricante* , che non ignora l' importanza della notizia di tal morte , e sa quanto malagevole sia l' assicurarsene prima della rottura dello membrane , raccoglie i segni esteriori , che sono

1. Le mammelle divenute flaccide ;
2. La depressione del ventre appassito , e pesante , contro la vagina stando in piedi la Donna , e coricandosi essa su' fianchi , cadente sull' uno o l' altro de' medesimi ,
3. L' inquietudine ;
4. La maninconia ;
5. Gli svenimenti ;
6. L' alito fetente della bocca senza manifeste cagioni ;
7. La cessazione totale de' movimenti del Feto ;
8. Lo scolo di materie fetenti dall' ano ,
9. di materie cadaveriche dalla Vagina ;
10. L' essere questa fredda , succida , e mocciosa .

E siccome sa , che tutti così fatti indizi non bastano per assicurar della morte del Feto , in tal incertezza è cauto nell' *Esplorazione* per non solleticar il collo dell' Utero , ed eccitar le doglie del parto , sapendo , che quantunque morto , il Feto ancor rinserrato nella Secondina non si corrompe tanto facilmente , nè mette sempre in gravissimo pericolo la Madre .

CXXXVIII. Trattandosi finalmente di decidere se il Feto più non viva, all' aprirsi della Borsa, l' *Esploratore* osserva le acque; e

1. Vedendole sporche di meconio e scorgendo questa materia ad uscire dalla Vagina, glutinosa, verde-fosca, e puzzolente, prima che membro del Feto s' impegni nel collo dell' Utero;

2. Toccando il talcio umbilicale ben vicino all' inserzion nel ventre, e non sentendovi più alcuna pulsazione, o battimento d' arteria; anzi

3. Trovandolo freddo, macero, fradicio:

4. Premendone il cranio e accorgendosi, che le suture rilassate, e come prive di sostegno, perinettano agli ossi d' accavallarsi l' uno sull' altro:

5. Sentendo a svanire, a diventar più molle la tumidezza degl' integumenti del capo, mentre alcuni minuti prima, persistendo forti, e frequenti le doglie, aveala trovata dura, renitente, e disposta ad aumentarsi, è moralmente sicuro della morte;

*Altri tre indizi ancor più prossimi
tratti dal Feto medesimo.*

CXXXIX. Sicurezza, che s' accresce aggiungendosi a' sintomi esposti finora;

1. Il separarsi della cuticola dalla parte capelluta ad ogui minimo palparla colle dita, senza che quella parte sia stata prima indiscretamente contusa:

2. Il sentir fredda, immobile la lingua, la bocca, in cui si è potuta insinuar la punta del dito *Esploratore*.

3. L' assoluta cessazione d' ogni battimento a' lati del collo, alle arterie temporali, alle fontanelle (sebbene il Feto, che non à respirato ancora, e che non respira, non abbia movimento ben distinto in queste parti, checchè siasi affermato dagli Scrittori d' Ostetricia, che ci hanno preceduto) e al petto medesimo, se tant' oltre si à potuto penetrar colla mano.

*Cautèle , e riguardi nell' applicazion degli Strumenti
anche posti tutti gl' indizi mentovati .*

CXL. Tutti gl' indizi surriferiti , e cento altri ancora , se cento altri se ne avessero , non autorizzeranno però mai l' *Ostetricante* a metter a brani il Feto , a squarciarne il ventre , a spaccarne il cranio per votar tali cavità , mentre può mèttere , o far metter in uso il *Forcipe* , o gli *Uncini ottusi* da cacciàr sotto le ascelle , e con essi agevolàr l' uscita del supposto cadavero ; perchè se Professòri diligentissimi , oculatissimi , la sbagliano , o aborriscono di pronunciar morta una creatura adulta , che pur ànno sotto l' occhio , e sotto le mani , ad onta di tutti i segni di morte meno equivoci ; e come oserà deciderne l' *Ostetricante* , che una picciola parte soltanto ne tocca , trattandosi d' autorizzar una carnificina , che può esser un vero omicidio ?

M O T I V O V I I I .

*Discèrnerc gli ostàcoli , o i danni , a' quali
dan luogo le Secondine .*

CXLI. La *Placenta* può rendere *Laborioso* il *Parto* per tre ragioni ,

La prima delle quali è perchè si sepàra troppo presto dall' Utero ;

La seconda perch' è attaccata all' orificio del medesimo , del che l' *Esploratore* à cognizione sentendovi un corpo disuguale , fungoso , non dotato di senso veruno , pronto a dar molto sangue ad ogni leggier toccamento ;

La terza perchè mette ostàcolo alla uscita del Feto . La stessa può anche dar luogo a funeste conseguenze , uscito questo , per sei cagioni

La prima costituita dalle troppo tenaci sue aderente ,
2. Per l' eccessiva debolezza d' alcune sue parti ;

3. Per li vizii del Tralcio Umbilicale ;
4. Per la sua adesione a una delle parti laterali dell' utero , e perch' ivi è fortemente abbarbicata ;
5. Per lo suo strano volume , e massa ;
6. Per lo suo aggomitolamento .

Delle quali cose tutte non avvi mezzo più sicuro d'essere convinto , che per via della *Esplorazione* .

CXLII. Questa sola ci assicura altresì , che alla *espulsione delle Secondine* talvolta si oppone il corpo stesso dell' Utero contrattovi violentemente tutt' attorno a qualsivoglia sua altezza ; come vi si oppone incarcerandone la porzion principale in qualche nicchia , o gozzo , che fa questo viscerò contraendosi irregolarmente qualche parte de' laterali parieti suoi .

*Come si conosca la sovrèchia robustezza
delle Membrane , e vi si rimedii .*

CXLIII. Abbiamo già indicato come il dito s'assicuri della troppa robustezza delle membrane palmando nel tempo delle doglie i margini dell' orificio dell' Utero , ed osservando che , non ostante la convenevole dilatazione di questo , la testa del Feto non s'abbassa , e cessati i dolori si può far vacillare dietro alla Borsa inflacchirsi , per tornare sotto una nuova doglia a gonfiare , e a rendersi violentemente , rimanendo dura , ed elastica quanto persèvera la doglia .

Giudicammo altresì essere permesso in tal caso di aprirla colla punta del dito , o coll' uña , mentre che trovasi nella maggior tensione , per non lasciar inutilmente soffrire la Donna più a lungo , e forse dannosamente illanguidirsi tanto essa quanto il Feto .

Indizi della Placenta sbarbicatasi troppo presto .

CXLIV. Essendosi la *Placenta* sbarbicata troppo presto , o spontaneamente , o per la crudele fretta della

Ostetrica *, oltre all' *emorragia* proporzionata alla molteplicità, al calibro de' vasi, e de' pori del tessuto cavernoso dell' Utero rimasti aperti, se le acque non ne sono ancora evacuate, se il Feto è ancora nell' Utero, la stessa *Placenta* può presentarsene la prima all' orificio; e il dito *esploratore* subito la distingue dalla sua mollezza, e spugnosità, e da' bitòrzoli separati per via di profonde strettissime fessure, de' quali è composta. Nè la confonde co' bitòrzoli, o colle fessure delle labbra dell' Utero, o della sommità della Vagina, capaci talvolta di dar anche sangue al ruvido contricamento delle dita, perchè à già percorso tutto il contorno di dett' orificio, che trovasi oltre a quella parte della Vagina, in cui possono incontrarsi que' vizii; e distingue i margini morbosi di questo

* Ben si capisce, che qui non si vuole autorizzar la pessima costumanza di quelle *Mammæ*, e di quegl' imprudenti *Raccoglitori*, che appena uscito il Feto, adoprano ogni arte per estrarre le *Secondine*, e pur troppo sovente rovinano per la fretta loro crudele, e degna di castigo, non chè di riprensione, l'opera già egregiamente incamminata della benèfica Natura. IDDIO guardi ogni *Puerpera* dalle mani di còldro, che hanno adottato un sistema così pernicioso! I *migliori Ostetricanti* ci assicurano, e la Pratica ce lo conferma tuttodì, che l'*Espulsion delle Secondine* è opera delle contrazioni dell' Utero, e che il tentar d'estrarle quando l'Utero non v' è preparato, e un promudvere *emorragie*, *rovesciamenti d'Utero*, e *procidenze*, *esulcerazioni* più o meno profonde in esso, ed ostinate *affezioni nervose* insuperabili, *consunzione*, e *morte prematura*. La *Mammàna* prudente pertanto non intraprenderà mai senza un' assoluta necessità una tal estrazione, giacchè l' Utero stesso nel *Parto naturale* coll' eccitar un tumore globoso all' ipogastro, che è accompagnato da *Dòglie* poco diverse da quelle, che promudvono l'*Espulsion del Feto* medesimo, dà avviso che è tempo di raccogliere le *Secondine* disposte ad uscire, e di agevolare con qualche discreto ajuto l'uscita, quando l'Utero da se solo promuoverti non la potesse.

sempre più duri, e cagioni di grave molestia, d'irritazione, e di spasmo universale alla Donna, dalla insensibilità, che caratterizza le disuguaglianze della *Placenta*, solita a gettar sangue molto più abbondante, e vivo, dopo una seria *Esplorazione*, senza cagionar dolore.

Indizi delle Secondine già discese nella Vagina, e nella escavazione del Catino.

CXLV. Può altresì la *Placenta* essere stata spinta nella Vagina, ed ivi arrestarsi o con qualche membro del Feto, o sola. La diminuzion sensibile del volume dell'addomine, i continui premiti accompagnati da doglie lunghe, ed inutili, e il peso di cui la Donna si lagna sull'ano, oltre all'*emorragia* incessante, ne danno sospetto; ma il dito dell'*Esploratore* ce ne convince appieno, incontrando (appena oltrepassate la caruncule mirtiformi) una matassa, un viluppo di membrane, e di carne disuguale, lubrico, sanguinolento, ed insensibile, che occupa tutto, e distende oltre modo quel canale.

CXLVI. C'istruisce altresì da' segni sovra esposti se null'altro ingombri la Vagina, e se ciò, che la occupa sia un articolo, o il capo del Feto, o una porzione considerabile del tralcio umbilicale. Quello però che più importa, sollecita l'apertura delle membrane al di là della *Placenta* propriamente detta, e se può le apre verso l'osso Sacro, nella cavità stessa dell'Utero, per accelerar l'uscita, o l'estrazione del Feto per li piedi colla mano, o col mezzo degli strumenti, se si hanno in pronto, perchè gravissimo pericolo sta nel ritardo.

Diagnosi, e cura dello Strangolamento delle accartocciate Secondine affacciate al collo dell'Utero contratto.

CXLVII. Anche nel parto naturalissimo, venuto

alla luce il Bambino, la *Placenta*, già sbarbicata, affacciatasi tutta in un viluppo all'Orifizio dell'Utero, è capace di cagionar disordini, e dar inquietudini gravi, e giuste.

CXLVIII. Supponiamo già la *Puerpera* in letto, perchè l'*Ostetricante* sentendo la resistenza, che si oppone allo sgravio totale delle *Secondine*, à preso il partito di dar recapito al Bambino, assicurato il tralcio alla coscia della Donna con molle allacciatura. Supponiamo, che questa torni à lagnarsi di doglie, di premiti, e provi molestissima agitazione; che le s'intumidisca di nuovo il ventre, massimamente all'Ipogastro, e che sia sorpresa nell'intervallo delle doglie da deliqui; il dito esploratore tenendo dietro al tralcio fino alla bocca dell'Utero la troverà serrata dintorno ad un viluppo di sostanza lubrica, fioccosa, sanguinolenta, accartocciata con varii strati di membrane, il tutto come un turacciolo metà fuori, e metà dentro dell'Utero rigonfio per lo sangue, l'uscita del quale dal turacciolo suddetto è assolutamente impedita.

CXLIX. Egli ben conoscendo, che questo è la *Secondina*, la ingrassa, ed ingrassa i margini dell'orifizio dell'Utero, che la strangolano: intanto recide il tralcio al di sopra della ligatura, ond'era assicurato alla coscia, affinchè se ne evacui tutto il sangue possibile; prende il viluppo tra le dita, e lo smuove a destra, a sinistra, ora verso il Pube, ora più verso il Sacro, traendo a se con moderazione; torna ad ungere i margini, e inoltra le dita fra i medesimi per abbrancar la *Secondina* più in alto, massime accorgendosi, che la porzion fuoruscita si assottiglia, e in qualche sito si lacerà. Così facendo a riprese, e abbrancandone anche coll'altra mano munita d'un pannolino asciutto il lembo, che si presenta alla Vulva, colle dovute cautele, mediante l'opportuna pazienza, si estrae tutta; avvertendo di non affrettar l'estrazione delle fimbrie annesse al corpo intero, nè

di questo dalla Vagina, affinchè il trabocco del sangue, che allora sgorgherebbe imperuoso dall' Utero, non lasci esanime in mortale deliquio la Puérpera.

Indizi dell' Attaccamento laterale della Placenta.

CL. La *Esplorazione* c' istruisce, anche avanti che la borsa delle acque siasi squarciata, la *Placenta* nell' Utero essere *attaccata lateralmente*; notizia importantissima posto che illumina la *Ostetrica* intorno al contegno da serbare nel tempo del *Parto*, e la dirige in maniera da evitar gli accidenti, che lo renderebbono difficile. Per tal mezzo adunque ci accorgiamo,

1. Che il ventre della *Partoriente*, qualunque siane il volume, non è appuntato, nè emisferico al davanti, ma visibilmente appiattito.

2. Altre volte sembra diviso in due porzioni, non già nel mezzo, nè dalla bocca dello stomaco, o fossatella del cuore, al pube in linea retta, come talvolta si scorge nelle *Gravidanze de' Gemelli*, ma obbliquamente, e più da un lato, che dall' altro.

3. In terzo luogo la *Partoriente* medesima confessa d' aver sentito fin da' primi mesi della *Gravidanza* in una, o in altra parte determinata del ventre un corpo voluminoso, e duro, che venne sempre crescendo senza mai non aver cangiato situazione.

4. Il luogo fisso dov' era tal corpo duro, era, ed è tuttavia la parte più indolenzita di quel ventre, e quella dove la *Gravida* non sentì mai così vivacemente, nè così sovente a muoversi il Feto.

5. Eppure quel luogo anche nella *Partoriente* è meno elevato che il corrispondente al lato opposto, e tale si mantenne sopra tutto dopo trascorsi i primi cinque mesi della *Gravidanza*.

6. In sesto luogo le torpidezze, i granti alle coscie, e alle gambe, le tumidezze a queste; e a' piedi, che sogliono molestare certe Iacinte verso gli ultimi

mesi della gravidanza, insorgono solo dal lato opposto a quello, a cui supponesi abbarbicata la *Placenta*, cioè da quel lato verso del quale il Feto si porta con maggiore facilità, e frequenza.

CLI. I segni positivi, e ragionevoli finora indicati non basteranno per verità sempre a determinare, nè a farci decidere se veramente la *Placenta* sia affissa ad un lato dell' Utero: ma siccome l' inefficacia delle doglie ne' progressi del travaglio della *Partoriente*, e gli altri segni, che si traggono dalla *Esplorazione* per la Vulva danno forza agli argomenti d' induzione addotti; così ne risulta quanto basta per isquarciar le membrane, e terminare il *Parto* coll' andar subito in traccia de' piedi del Feto, ed estrarlo, evitandosi con ciò tutti i rischi ne' quali incorrerebbero, altrimenti regolandosi la *Ostetrica*, la Madre, e la Prole, perchè il capo di questa s'impegnerebbe obliquamente nello stretto superiore.

Gozzi nella Matrice come si formino, e come se ne preservi dall' Incarceramento la *Placenta*.

CLII. Estratto felicemente secondo le regole *Ostetriche* il Feto, dee compirsi l'opera evitando che la *Placenta* non s'innicchi, non s'incastri in qualche gozzo della cavità della Matrice, che si produrrà nella successiva contrazione di questo viscero; perchè le pareti sempre più spesse nel sito dov' è abbarbicata la *Placenta* ne son meno capaci di contrarsi che tutti gli altri punti liberi di quest'organo, dopo del *Parto*. Quindi per l'ineguaglianza di tale contrazione, che da' lati è per l'ordinario meno vivace, producesi all' fine quel *nicchio*, quella *celletta*, quella *cistide*, quel gozzo in cui la *Placenta* verrà rinserrata da tutti i punti dell' utero, i quali, contraendosi, ripiegati se le saranno sopra.

CLIII. In tal caso di rado è possibile di liberar la *Puèrpera* dalle *Secondine* col solo tirare il *Cordone umbilicale*, che potrebbe schiantarsi: la *Ostetrica* conseguentemente determineràssi tosto a spinger la man nell' utero affin di ricondurre l' *aderenza della Placenta*, e cercare la bocca della *nicchia* tenendo colle dita dietro al *Cordone*. Pervenutavi procuri d' insinuarvi destramente le dita più lunghe, insieme congiunte a foggia di conio, e successivamente le scosti come farebbero le branche d' un *Dilatatore*, e le diriga in vario senso finchè le riesca d' introdurvi la mano, d' abbrancar la *Placenta*, e di sbarbicarla secondo il metodo ordinario. Eseguisca però questi movimenti con la delicatezza, e le cautèle, ch' esige organo tanto sensibile, dal qual è raro, che conseguentemente a così fatti *innicchiamenti*, e alle *operazioni* allora indispensabili, non gema per lo tratto di qualche giorno un po' d' icore fètido, che però non arreca altro danno.

CLIV. Se persistesse poi la contrazione spasmodica, l' *Ostetricante* in vece di sempre più tormentare con ulteriori tentativi, e con violente stirature forse infruttuosamente la *Puèrpera*, ne informa il Medico, o il Chirurgo i quali con opportuna dose d' Oppio, o di qualche preparazione analoga, mettendo in rilassamento le Uterine fibre, ne renderanno fra breve agèvolissima, e spontanea l' *espulsione*, che se si fosse voluta procacciare ad ogni modo, avrebbe cagionato seriòsi, pericolòsi accidenti.

CLV. Nel caso di forte aderenza della *Placenta* a qualsivoglia parte, la mano *Espiatorrice* penetrata nella Borsa a seconda del *Cordone*, ed abbrancate colle altre dita le radici arteriose, e venose, o attortigliato all' indice il *Cordon* medesimo, lo dimena a destra, a sinistra, in alto, in basso, verso il Pube,

verso il Sacro , tirando a se leggermente anche coll' altra mano , che fuor della Vulva tiene il cordone in una tension mediòcre . In tal guisa operando s' accorge del sito in cui è ancora troppo tenacemente abbarbicata la *Placenta* ; e se non gioverà tal mezzo , abbandonato il cordone , la stessa mano *esploratrice* s' insinua fra le membràne e l' utero con destrezza , e con le dita soavemente ne la scosta finchè le riesce di sbarbicàrnela affatto , e di condur le *Secondine* giù per la Vagina fuori del corpo .

Cura dell' Aderenza laterale della Placenta .

CLVI. L'adesion laterale della Placenta nell'Utero talvolta è non solo una delle cagioni del *Parto difficile* perchè si trae dietro l' *obblighità del Feto* , ma espone anche la Madre a gravi accidenti quando non s' impiega il metodo opportuno per estrarne la *Secondina* , che suol' esservi aderente in guisa , che il tralcio ne è piantato verso la parte più bassa di quel corpo . Il metodo suggerito da alcuni Maestri consiste nell' introdurre una mano bene ingrassata nell' Utero di maniera che il tralcio scorra fra l'indice , e il dito di mezzo tenuti alquanto scostati affinchè non lo comprimano . Elevando la mano oltre all' aderenza inferiore della *Placenta* si tira coll' altra mano il tralcio , che scorrendo fra la base delle due dita come in una carrucola , o girella , sbarbica a poco a poco le *Secondine* , delle quali distaccata la porzion principale , si abbrancano , si guidano destramente all' orificio , e di là nella Vagina , donde a poco a poco non riesce difficile estrarle fuori della Vulva .

Al volume eccessivo delle Secondine come si soccorra .

CLVII. Le stesse difficoltà si posson incontrare per esser le *Secondine* troppo voluminose , occupate da

idatidi o da vesciche piene d'acqua, o scirroze, o come già dissi *innichiate* in qualche gozzo della cavità, o in qualche *morbosa divisione* cagionata da spasmodica contrazion di parte del corpo dell' Utero. Il diro *esploratore* solo ce ne avvisa, o l'intera mano dell' *Ostetricante* insinuata nell' Utero, che si accorge d' un vizio, o dell' altro; e mentre che abbranca porzion della *Placenta* per trarla nella Vagina, procurando, che vi discenda il primo ciò che v' è di scirroso, se incontra *idatidi* grosse, e vi distingue la fluttuazion della linfa, e per la loro elasticità, ed il liscio le conosce, non ne differisce punto l'apertura, che egli fa colle ugne, evitando di offendere graffiando le pareti dell' Utero.

Come si conosce il Rovesciamento, e l' Inconciamento del Fondo dell' Utero.

CLVIII. Se poi persistono le aderenze, le resistenze, gli ostacoli, non s' impegna nè a stracchiar il Tralcio, nè a trarre a se le *Secondine* già in parte fuoruscite, ma in parte ancora *incarcerate*, o in parte tuttavia aderenti, perchè brama di evitar la *Procidenza* sciffosa, non meno che il funesto *Rovesciamento* del Fondo dell' Utero, tante volte cagionato dallo svelterne la *Placenta* senza le debite cautele; l' *Esploratore* lo conosce toccando immediatamente al di là dell' orificio dell' Utero un corpo convesso, polposo, uguale, facile a dar sangue per ogni minimo contatto. Anzi talvolta incontra più globosa tale convessità alla sommità della Vagina attornziata da' margini dell' orificio, che non hanno potuto restringersi perchè il fondo dell' Utero strascinato fin qui dalla *Placenta* ancora troppo aderente, vi si è inconiato come la testiera d' un cappello violentemente compressa dal pugno s' inconia oltre al margine inferior della cavità del medesimo. Tanto può cagionar la fretta inopportuna della *Ostetrica* ad estrarre le *Secondine*!

CLIX. Per evitar simile *inconciamento* l'*Ostetrica* o non estragga con violenza le *Secondine*, o estrattale inavverentemente, o costrettiavi da necessità assoluta, sentendo, che l'Orificio dell' Utero non si stringe, vi tenga qualche momento nella cavità la mano impugnata infinattantochè la senta stringersi dall' Utero, che si contràe, e tosto adàgio adàgio spiegando le dita per lasciare maggior luogo alla desiderata salutar contrazione, la tiri a se soavemente, e dallà Vulva la estragga.

CLX. Per corrèggere poi questo vizio già per mala sorte contratto dall' Utero disceso col suo fondo rovesciato fra i mǎrgini del orificio suo, fin nella Vagina, l'*Ostetricante* v'introduce bene ingrassate le dita d'una mano insieme unite, avendone le ugne cortissime, e colla sommità de' polpastrelli dolcemente respinge in sù verso l' abdòmine della *Puerpera* coricata supina, colle anche più alte del petto, il fondo dell' Utero, introducendovi tutta la mano finchè la compressione uguale, che l'Utero contraendosi vi fa tutt' attorno, non indica essere quella da estrarsi.

Ma non sono scopo di questo ragionamento le diverse *operazioni*, e i metodi relativi all' *Arte Ostetricia* in particolare, non essendoci noi prefisso altr' oggetto che ammaestrar le *Mammæ*, e gli *Ostetricanti di Villa* ad allontanar la dura necessità di ricorrere a *clássiche operazioni*, conoscendone, e rimuovendone le cagioni per mezzo della *Esplorazione*, piuttosto che ad *operare*, il che s'appartiene ad altre Persone, e ci riserbiamo d' esporre in altra opera. Persuasi adunque d' avere della *Esplorazione* dimostrato l'importanza ne' diversi casi, ne quali la giudicammo indispensabile, altro non ci resta fuorchè inculcarne con tutto l'impegno possibile l'attento esercizio, e la lettura delle opere, che più diffusamente ne tratteranno, giacche di tutta l'*Arte* è il principal fondamento, affinchè di chi la professa ridondi in gloria, ed in vantaggio del Bel Sesso.

D efinizione della <i>Còpula</i> . . .	Introd. Num.	III.
della <i>Esplorazione</i>		ivi IV.
del <i>Catino</i>		VIII.
Annotatione intorno a' diametri principali della		
Testa de' <i>Feti</i> , e della corrispondenza che deb-		
bono avere nel <i>Parto</i> con que' delle <i>Sezioni</i> ,		
e degli <i>Stretti</i> del <i>Catino</i> materno . . . pag.		21
Intorno al colòre, alle <i>Lacune</i> , alla struttura		
interna delle <i>Labbra della Vulva</i> , e a' cangia-		
menti a' quali per la frequente <i>Còpula</i> , e per		
li <i>Parti</i> vanno soggette		26
Intorno alla difformità possibile delle <i>Ninfe</i> , e		
agli usi loro		27. 28
Sulla struttura, e l' uso della <i>Vagina</i>		32
Intorno alle <i>Glàndule</i> della medesima		33
Sulle <i>mostruosità</i> , che vi si osservarono		34
Sulla struttura, e sulla <i>cavità dell' Utero</i> , sulle		
<i>Aperture</i> , sull' <i>Epitelio</i> , sulla <i>Membrana Fioc-</i>		
<i>cosa-Ligamentosa</i> stata descritta con tal nome		
dal BERTRANDI, e con quello di DECIDUA		
dall' HUNTER, osservabile negli <i>Uteri Gràvidi</i>		36
Sù i <i>Seni</i> , e le <i>Lacune</i> dell' <i>Utero</i>		37
Sulle varie apparenze dell' <i>orificio</i> dell' <i>Utero</i> an-		
che nelle <i>Vèrgini</i> inatte		39
Sui <i>Vasi Sanguigni</i> , i <i>Linfatici</i> , e i <i>Nervi Ute-</i>		
<i>rini</i>		40. 41
Sù gli usi de' diversi <i>Ligamenti</i> dell' <i>Utero</i>		41. 42
Sulla struttura delle <i>Trombe Falloppiane</i>		44
Sull' <i>Uso</i> delle medesime		45
Intorno a' vari <i>sistemi</i> relativi alla <i>Generazione</i>		46
Sù i vasi spermatici, e i <i>Corpi</i> loro <i>Pampinifor-</i>		
<i>mi</i> , <i>Vasi Linfatici</i> , e i <i>Nervi</i> delle <i>Ovaja</i> , e		
sulle <i>cicatrici</i> di queste		47. 48
Definizioni della <i>Gravidanza</i> Par. I. N. CIII., 2. I		
della <i>Fecundità</i>		CIV.

	147
della <i>Fecondazione</i>	CV.
della <i>Donna o Fecunda, o Sterile</i>	CVI.
della <i>Concezione</i>	I
della <i>Generazione</i>	I
Annotazioni sulle <i>Gravidanze Naturale, Non-Naturale, e Strantera</i> ; sulle <i>semplici, composte, e complicate</i>	66
Sulle <i>acque dell' Amnio</i>	73
Definizione del <i>Parto settimestre, e dell' Aborto</i>	XXVI.
della <i>Retroversione dell' Utero</i>	XXIX.
dell' <i>Antiversione</i> dell' medesimo	XXX., LXI.
Annot. sulle notizie lasciateci da IPPOCRATE della <i>Retroversione</i> detta da lui <i>Peristarfosi</i> , su quelle, che ce ne lasciò FILUMENO, e su i Moderni, che ne trattarono	80 ivi 81
Definizioni del <i>Parto</i>)	
dell' <i>Aborto</i>)	
del <i>Parto Immaturo, o Precòce</i>)	LXXIV.
del <i>Parto Maturo</i>)	
de' <i>Parti Naturali, Non-Naturali, e Laboriosi</i>)	
del <i>Parto Contro-natura</i>	C.
del <i>Parto Doppio</i>	C.
della <i>Gravidanza composta</i>	CIV.
del <i>Feto Attraversato</i>	CXXIX.
Annotazione intorno a' danni che reca la <i>troppo frettolosa Estrazione delle Secondine</i>	137

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, it is important to gather relevant information and data. This can be done through research, consultation with experts, or by analyzing existing data sets.


3. Once the information is gathered, the next step is to analyze it. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. After analysis, the next step is to develop a solution or plan. This involves identifying the most effective approach to solve the problem, taking into account the available resources and constraints.

5. Finally, the solution is implemented and the results are evaluated. This involves monitoring the progress of the solution and making adjustments as needed to ensure that the problem is solved effectively.

INDICE

DELLE DIMOSTRAZIONI, CHE FANSI
NELLA SCUOLA PRATICA DELL'ARTE
OSTETRICA, ERETTA NELLA R. I.
UNIVERSITA' DI PAVIA.



INTRODUZIONE.

1. **D**efinizione dell' Arte Ostetricia .
2. Nomi datisi in Italia a chi la esercita .
3. Ostacoli , che si opposero a' progressi di quest'Arte finchè non venne esercitata salvo dalle Femmine .
4. Convenienza , che le Femmine continuino ad esercitarne la parte meno complicata , e faticosa , a risparmio del pudore , e a vantaggio del Bel Sesso .
5. Necessità , che le Femmine vengano a spese del Pubblico instrutte , posto che alla porzione più bisognosa del Pubblico debbono gratuitamente porgere soccorso .
6. Importanza , che tale istruzione sia appoggiata a Dimostratori capaci di corrispondere alla fiducia, che il Pubblico à in essi .
7. Doveri del Dimostratore d'Ostetricia .
8. Utilità dell' Utero artificiale , e de' Fantocci per le Dimostrazioni quando mancano occasioni reali .
9. Opportunità d'informare anche le Ostetriche dell' uso degli strumenti che all' arte loro si appartengono , non già perchè se ne valgano esse , ma perchè conoscano il tempo , e l'occasione , in cui è da farsene uso ; anzi affinchè la prudenza , e la perizia loro escluda quanto più si potrà il bisogno di adoprarli .
10. Pazienza indispensabile a' Dimostratori nell' ammaestrare anche le idiote , le zoriche , e prive di genio e di gusto per lo studio .
11. Vantaggi , che si debbono sperare dall' ordine , e dal metodo , in questa sorte d'ammaestramenti .
12. Qualità fisiche , e morali , che debbono caratterizzare la Ostetrica .

D I M O S T R A Z I O N I .

- I. *Del Parto in generale considerato come oggetto primario dell'Arte Ostetricia, e della divisione de' Parti.*

S E Z I O N I .

1. Del Parto Naturale, e della suddivisione di questo
 2. In Facile, e Felice,
 3. In Laborioso o Difficile;
 4. In Pericoloso, e Micidiale.
 5. Del Parto Non-naturale, e della suddivisione sua
 6. In Mostruoso,
 7. In Impossibile senza i più seri ajuti dell'Arte.
- II. *Degli Organi Femminili, che servono al Parto in generale, e della divisione loro in Duri, e in Molli.*
1. Denominazione delle Parti Dure, che servono di sostegno agli Organi Genitali Femminili;
 2. Denominazione delle Parti Molli, che costituiscono gli organi stessi, e che servono a' medesimi in qualche guisa.
- III. *Del Pelvi, o Catino femminile in generale, e degli ossi, che lo formano in particolare.*
1. Degli ossi Innominati, oppure ossi delle Anche.
 2. Dell'osso Sacro.
 3. Degli ossi del Coccige.
 4. Delle due ultime Vertebre Lumbari.
 5. Della unione degli ossi del Pelvi.
 6. Della diversità di tale unione sendo la Donna prossima al Parto, o non incinta.
- IV. *Della conformazione interiore del Pelvi, e delle sue divisioni, e dimensioni di varie porzioni della sua cavità.*
1. Divisioni principali del Pelvi.
 2. Sezioni del Pelvi;
 3. Stretti del Pelvi;

DELLE DIMOSTRAZIONI. V

SEZIONI

4. Diametri ordinari delle Sezioni, e degli Stretti.
5. Pelvimetro doppio dell' Autore per assicurarsi delle varie estensioni loro.
6. Enumerazione delle sostanze, che tappezzano il Pelvi interiormente, e ne minorano i diametri,
- V. *Delle notizie pratiche deducibili dall' esatta cognizione, della struttura, e delle dimensioni del Pelvi, e delle Parti Genitali femminili, mediante l' Esplorazione.*
 1. Che cosa è l' Esplorazione.
 2. Come l' Esplorazione ci guida alla cognizione di tutto ciò, che s' appartiene allo stato naturale, o vizioso, sano, o morbooso delle Parti indicare.
 3. Lumi che sparge su diversi punti d' Ostetricia in generale, e in ispecie
 4. Sulla Verginità;
 5. Sulla Deflorazione,
 6. Sulla Gravidanza,
 7. Sul Parto,
 8. Sul Puerperio.
 9. Sulla Sterilità congenita, o accidentale.
- VI. *Della Matrice, o Utero, e delle sue dipendenze in generale.*
 1. Della Matrice non gravida.
 2. Della Matrice gravida.
 3. Delle obbliquità alle quali va soggetta.
 4. Indizi, che ne somministra la Esplorazione.
 5. Della Vagina e del suo orificio inferiore.
 6. Della Vulva, delle sue aggiacenze.
 7. Diversità, che l' Esplorazione vi scuopre nella Vergine, nella Maritata, nella Gravida, nella Puerpera, nella Sterile.
- VII. *Della Gravidanza, e delle sostanze, che la costituiscono, Vera, o Falsa in generale, oppure Strauterina.*
 1. Le Secondine;

VI

I N D I C E

SEZIONI

2. Le Acque dell' Amnio ;
 3. Il Tralcio , o sia Cordone umbilicale ;
 4. Il Feto ;
 5. Il Germe abortivo ;
 6. La Mola ;
 7. Le Idatidi .
- VIII. *Della Gravidanza vera , e degli accidenti , che la accompagnano in generale , e in particolare .*
1. Segni della Gravidanza .
 2. Accidenti ordinari innocenti , che la sogliono accompagnare nelle sue diverse epoche .
 3. Accidenti più serii , quali sono in ispecie
 4. La Retroversione dell' Utero .
 5. La Anteversione ;
 6. La Procidenza ;
 7. La Perdita , o sia flusso lento di sangue ;
 8. La Emorragia , o impetuoso trabocco del medesimo .
 9. Le Convulsioni ;
 10. L' Aborto , che può succedere in epoche differenti .
- IX. *Del Feto considerato nelle differenti epoche suddette .*
1. Del Capo del Feto relativamente al Parto .
 2. Del Torace ,
 3. Del Ventre del Feto ;
 4. Del Pelvi ,
 5. Delle Estremità del Feto considerate nel medesimo aspetto .
- X. *Delle utilità , che traggoni dalla Esplorazione tanto per distinguere le diverse regioni del Feto nell' Utero , quanto ne' frangenti indicati nella Dimostrazione ottava .*
1. Per conoscer la gravezza degli accidenti ;
 2. Per trarne , ed eseguirne le opportune indicazioni .
- XI. *Delle Doglie , o sforzi del Parto in generale .*
1. Doglie vere , frequenti , predisponenti , promuoventi .

DELLE DIMOSTRAZIONI. VII

SEZIONI

2. Doglie false , vaghe , rare , lente , inefficaci .
 3. Utilità dell' Esplorazione per distinguer le prime dalle ultime .
 4. Indicazioni , che dee trarne la Ostetrica .
- XII. *Del meccanismo del Parto Naturale , e del Non-Naturale .*
1. Come questo distinguasi dal Naturale per via della Esplorazione .
 2. Precauzioni , che l' Ostetrica dee usare ne' casi ambigui affinchè il Parto si compisca felicemente .
 3. Sobrietà nell' Esplorazione troppo necessaria trattandosi di Partorienti sensibilissime , delicate , intolleranti , per non accrescerne l'irritazione , l'impazienza , e lo spasimo .
- XIII. *Del Parto per la Testa considerato sotto i suoi diversi aspetti , allora ch' è per riescir facile , e naturale .*
1. Come la Ostetrica se ne assicuri per mezzo della Esplorazione .
 2. In quali situazioni possa , o debba collocare la Partorienta .
 3. Con quali precauzioni debba istruirsi de' progressi , che fa la testa del Feto in basso , e della dilatazione dell' Orificio dell' Utero , abbreviandosene il Collo .
 4. Comparsa , e ampliamento della Borsa fatta dalle Membrane , e dalle Acque dell' Amnio nella Vagina .
 5. Rottasi la Borsa , ed evacuatesi le prime Acque , quali attenzioni debba avere la Ostetrica ne' Parti Facilissimi .
 6. Quali ne' Tardi massimamente quando la Protuberanza Occipitale del Feto stenta a sdruciolare sotto l'Arco del Pube .
 7. Quali allorchè la sommità del Capo si è cacciata troppo profondamente nella Fossa Navicolare , e contro l' Intestino Retto , ed il Coccige .

SEZIONI

8. Uscito il Capo dalla Vùlva come se ne ajuti l'uscita delle Spalle del Feto.
9. Condotta della Ostettrice uscito tutto il Feto, allorchè il ventre della Partoriente si mantiene tumido, e risvegliansi, o continuano le doglie, e i premiti, servendosi dell' Esplorazione per conoscerne le cagioni, e recare alla Donna l'opportuno soccorso, massime se vi fosse altro Feto.
- XIV. *De' riguardi, che la Ostettrice dee avere per le Secondine, e per il Bambino uscito naturalmente per la Testa.*
 1. Della espulsione delle Secondine.
 2. Degli ajuti che alcune volte questa esige.
 3. Della ligatura, e della recisione del Tralcio umbilicale prima della uscita delle Secondine.
 4. Delle stesse operazioni uscite queste.
 5. Delle attenzioni, che il Bambino di fresco nato esige dalla Ostettrice, o da qualche assistente.
- XV. *De' soccorsi, che la Ostettrice dee porgere alla Puerpera quando le Secondine stentano ad uscire.*
 1. Della troppo tenace aderenza della Placenta al pariete interiore dell' Utero.
 2. Indizi di tale aderenza a' lati interiori dell' Utero.
 3. Dell' eccessiva grossezza delle Secondine dipendente dal sangue, dal pareuchima, da scirrosità, da idatidi.
 4. Perchè strangolata dall' Utero contrattosi irregolarmente, innichiate le Secondine entro a' gozzi prodotti da simili contrazioni parziali, esigono assai meno gli ajuti della Ostettrice, che le prescrizioni del Medico, e la pazienza in amendue.
 5. La mano della Ostettrice però in tutti e quattro i casi, ben condotta, può essere di grande utilità.
- XVI. *Del Parto Agrippino, ossia per li Piedi.*
 1. Paragone del Parto Agrippino col Parto Naturale per la Testa.

SEZIONI

2. Riguardi da aversi alle quattro situazioni, nelle quali il Feto, che presenta i piedi, si può trovare nell' Utero.
 3. Rottesi le Membrane nel Parto Agrippino se sia necessario d' ajutar il Feto ad uscire quanto più presto si può.
 4. Qual metodo terrà la Ostettrice in questo caso.
- XVII. *Del Parto Agrippino accompagnato colla cattiva situazione del Feto.*
1. Contegno della Ostettrice quando presentasi un solo piede.
 2. Quando i piedi anno le dita verso il Pube.
 3. Quando le dita sono rivolte da un lato.
 4. Quando il piede à una direzione molto obliqua.
- XVIII. *Del Parto Agrippino complicato con imbroglii dal canto del Tralcio umbilicale, o con qualche vizio nel Feto.*
1. Quando il Tralcio è impegnato intorno alle gambe,
 2. Fralle coscie;
 3. Intorno al corpo;
 4. Intorno alle ascelle, alle braccia, al collo.
 5. Quando il Feto è idropico ascitico.
 6. Quando rischia di lasciar il Capo nell' Utero.
- XIX. *Del Parto in cui presentansi altre parti inferiori del Feto.*
1. Parto per ambe le Ginocchia.
 2. Parto per un Ginocchio solo.
 3. Parto per le Natiche.
 4. Contegno della Ostettrice ne' Parti indicati.
- XX. *Degli accidenti, che interrompono il Parto, e possono renderlo difficile, o pericoloso tanto per lo Feto, quanto per la Madre.*
1. Emorragia.
 2. Sbarbicamento precoce della Placenta.
 3. Aderenza di questa all' Orificio interiore e al Collo dell' Utero.

SEZIONI

4. Rottura del Tralcio umbilicale .
 5. Convulsioni .
 6. Rottura dell' Utero .
- XXI. *Delle Operazioni , che tali accidenti esigono .*
1. Contegno della Ostetrica ne' primi cinque .
 2. Contegno dell' Ostetricante nel fare la Gastrotomia in conseguenza della Rottura dell' Utero gravido per estrarre il Feto passato nella capacità del ventre .
 3. In conseguenza della Gravidanza Strauterina dalla Ostetrica conosciuta per via della esplorazione .
- XXII. *D' altri accidenti , che possono rendere Laborioso , o Micidiale il Parto , e della cura loro .*
1. Indocilità , e smaniose agitazioni della Partoriente .
 2. Inabilità delle Primipare a secondare le Doglie vere .
 3. Imperizia , e temerità della Ostetrica .
 4. Atonia della Matrice .
 5. Troppa facilità nell' espulsione del Feto , e delle Secondine .
- XXIII. *Terza serie d' accidenti , che rendono Laborioso , o Micidiale il Parto anche Naturale .*
1. Discesa dell' Utero per la Vagina .
 2. Anteversione dell' Utero nel nono mese .
 3. Rovesciamento parziale dell' Utero nelle Puerpere .
 4. Rovesciamento dell' Utero totale in esse .
- XXIV. *Del Parto Difficile a cagion de' vizj delle Secondine .*
1. Secondine troppo resistenti , e dure .
 2. Troppo deboli , rottesi troppo presto .
 3. Precedenti il Feto nell' uscire dall' Utero .
- XXV. *Del Parto Difficile a cagione delle Acque dell' Amnio .*
1. Acque troppo abbondanti , che distendono , e infievoliscono le pareti della Matrice , e dell' Abdomine .

SEZIONI

2. Acque troppo scarse, onde non le distesero abbastanza per obbligarle a contraersi efficacemente sul Feto maturo.
3. Evacuatesi troppo presto, e tutte ad un tratto, sicchè l'Utero stringe soverchio il corpo del Feto, che rendesi perciò meno scorrevole.
4. Condotta della Ostettrice in tali circostanze.

XXVI. Regole generali per la Ostettrice ne' Parti Non-naturali.

1. Riguardo alle diverse cagioni di tali Parti.
2. Riguardo alla Borsa delle Acque.
3. Riguardo al Battesimo del Feto in pericolo.
4. Battesimo del Feto ancor avvolto nelle Secondine;
5. Già in parte scoperto, ma tuttavia nell' Utero;
6. In parte, o intieramente fuor della Vulva.
7. Battesimo d' un Aborto.
8. D' un Feto mostruoso.

XXVII. Del Voltamento artificiale del Feto nell' Utero.

1. Quali situazioni convenga dare alla Partorienti quando il Voltamento del Feto è indispensabile.
2. Circostanze determinanti a procrastinarlo.
3. Ad intraprenderlo immediatamente.
4. Precetti generali intorno a questa operazione.
5. Conseguenze funeste da temersene ove non si usino le più serie precauzioni.

XXVIII. Delle situazioni oblique della Testa del Feto nell' Utero.

1. Quando presenta la faccia all'Orificio dell' Utero al di sopra dello stretto superiore.
2. Nella escavazione.
3. Quando vi presenta un degli orecchi,
4. Il mento, o il giugolo.
5. Quando presenta la nuca, o le vertebre del collo in qualsivoglia delle quattro situazioni principali.
6. Contegno della Ostettrice ne' casi accennati.

XXIX. *Della discesa delle Braccia del Feto per l'Orificio dell' Utero in generale .*

SEZIONI

1. Discesa d' una Mano nella Vagina .
2. d' un Gomito ;
3. di tutto il Braccio sino alla Spalla .
4. d' amendue le Mani ;
5. d' una Mano, e de' Piedi .
6. Contegno della Ostettrice in tali circostanze .

XXX. *Della situazione trasversale del Feto in generale .*

1. Feto che presenta il Dorso all' Orificio dell' Utero .
2. il Ventre .
3. il Tralcio Umbilicale .
4. il Petto .
5. uno de' Fianchi .
6. una Spalla in qualsivoglia delle situazioni .
7. Precetti generali per lo compimento di tali Parti Non-naturali .

XXXI. *D' altri Parti, che esigono cautele ed operazioni .*

1. Per la molteplicità de' Feti nella stessa Gravidanza .
2. Per la somma debolezza del Feto .
3. Perchè il Feto è morto .
4. Perchè è mostruoso .
5. Cautele ed operazioni appartenenti alla Ostettrice .

XXXII. *Seconda serie de' Parti, che esigono cautele ed operazioni .*

1. Perchè le dimensioni del Carin Materno male corrispondono a quelle del Capo, del Corpo, e d' altre membra del Feto .
2. Necessità, ed utilità del Pelvimetro doppio .
3. Inchiodamento del Capo nello Stretto superiore .
4. Nella Escavazione .
5. Nello Stretto inferiore .

DELLE DIMOSTRAZIONI. XIII

SEZIONI

6. Inchiudamento delle Spalle avendo preceduto il Capo .
7. Avendo preceduto i Piedi .
8. Precetti Ostetricii ne' casi precedenti , che si possono ridurre a sette capi seguenti da discutersi;
9. Alla stretta regola del viito nel corso della Gravidanza ;
10. All' acceleramento del Parto anche immaturo ;
11. Al Voltamento del Feto , onde estrarlo per li Piedi ;
12. All'uso degli Uncini , e d' altri simili strumenti ;
13. Del Forcipe ;
14. Alla Sintiseotomia al Pube ;
15. Alla Isterotomia .

XXXIII. *Del Corpo , e del Capo rimasti nell' Utero per lo schiantamento del Collo .*

1. Estrazione del Corpo rimasto nell' Utero per essersene separato violentemente il Capo nel Parto difficile per la Testa .
2. Estrazione del Capo , separatocene il Corpo tratto per li Piedi .

XXXIV. *Degli Strumenti Ostetricii , de' quali può , e dee talvolta la Ostetrica far uso , con le cautele a tal uopo necessarie .*

1. I Lacci .
2. Gli Uncini ottusi ;
3. La Leva ;
4. Gli ossi di Balena ;
5. Le Reti con i Lacci scorsoj , e collé dette ossa ;
6. I Forcipi , ove in ispecie degli adattati alla estrazion delle Mole , e de' Viluppi delle Secondine , per uso della Ostetrica si tratta .
7. Le Sciringhe , o Schizzatoj .

XXXV. *Degli altri strumenti , de' quali la Ostetrica dee conoscer l' uso perchè possa e suggerirgli all' Ostetricante absente , e porgerglieli con ordine*

opportunamente nel tempo, che debbono adoprarsi.

SEZIONI

1. I Forcipi ;
2. Gli Uncini acuti ;
3. Gli Uncini inguainati ;
4. Le Forbici dello SMELLIE ;
5. I Tiratesti ;
6. I Perforatori del Cranio, e del Ventre .

XXXVI. *Delle Operazioni da farsi per lo smembramento del Feto morto nell' Utero, delle quali dee la Ostettrice essere informata affinchè assista la Partorienti con la carità, ed il coraggio convenevole .*

1. Allorchè il Feto è mostruoso, o mal costruito ;
2. Allorchè qualche vizio inseparabile negli organi materni rende l'uscita del corpo intiero del Feto impossibile, quando già fuori della Vulva n'è porzion tale, che impedisce ogni altra operazione .
3. Votamento del Cranio ;
4. Paracentesi del Torace, e del Basso Ventre ;
5. Amputazione di qualche membro .
6. Amputazione, o Apertura di qualche tumore .

XXXVII. *Delle Operazioni, che possono, e debbono talvolta eseguirsi, anche per consiglio della Ostettrice, sul corpo della Madre vivente, o tosto dopo spirata, per estrarne il Feto sia vivo, sia morto, dall' Utero .*

1. La Gastrotomia nelle Gravidanze Strauterine, e conseguentemente alla Rottura dell' Utero gravido .
2. La Isterotomia ne' Parti impossibili per le vie ordinarie naturali .
3. La Sinfiseotomia al Pube nelle piccole angustie, non però naturalmente superabili, de' diametri degli Stretti del Carino ; nell' inchiodamento del capo nello Stretto superiore, che non annera il Forcipe ; nella impossibilità d' estrarre il capo

SEZIONI

altrimenti del Feto già uscito per li piedi dall' Utero fino al collo ec. ec.

4. Riflessioni generali su i diversi casi, ne' quali possono utilmente preferirsi la Sintisceotomia, o la Isterotomia.

XXXVIII. *Della cura, che la Ostetrica dee avere della Puerpera dopo il Parto Naturale e Felice.*

1. Qual situazion dee darle tosto dopo l'uscita delle Secondine ;
2. Quali alimenti accordare ;
3. Quali rimedii preservativi, o calmanti adoprare contro le doglie, i tormini puerperali.
4. Vestimento, e copertura della Puerpera.
5. Vantaggi, e danni derivanti dal fasciarne il seno, e il ventre.
6. Lavande, e medicamenti da applicarsi alle parti genitali esteriori, ed interne.
7. Cautele nel mutarne le biancherie.

XXXIX. *Degli Accidenti, che sieguono i Parti Naturali, e del modo di evitaragli, e di correggergli.*

1. In riguardo a' Locchi ;
2. alla separazione del Latte ;
3. alla difettosa evacuazione del medesimo ;
4. In riguardo agli odori acuti, che offendono il sistema nervoso delle Puerpere ;
5. In riguardo alle Passioni dell' animo.

C O N C L U S I O N E

1. Si esortano le Ostetriche alla prudenza, alla pazienza, alla segretezza, alla docilità ;
2. a non fidarsi mai totalmente nelle cognizioni, e nella perizia loro, ancorchè acquistata per via di lunga pratica, e di felice esercizio.
3. S' invitano a procacciarsi ne' casi ambigui, e ne' difficultosi, il consiglio, e l'ajuto de' Medici, e

SEZIONI

- d'altre Levatrici amiche, e la direzione de' Cerusici Ostetricanti più accreditati, e felici.
4. Siccome le conseguenze de' Partì Laboriosi, e de' Non-naturali, sono sempre gravi, e rilevanti;
 5. Siccome il Puerperio ne suole per l'ordinario essere borrascoso, pieno di complicazioni, e di pericoli;
 6. Così raccomandasi alle Ostetrici di non assistere mai senza direzion Medica, e Cerusica quelle infelici, che vi saranno soggette, salvo qualora la distanza de' Professori vo le costringessero.
 7. In tal caso le Ostetrici debbono saper fare una relazione chiara ed esatta dello stato in cui sarassi trovata, e troverassi la Puerpera, sulla quale il Medico, e il Cerusico possano somministrar loro a bocca, o in iscritto gli avvisi, i suggerimenti, i consigli opportuni.



MILANO. MDCCXCI.

NELLA STAMPERIA DI GIACOMO BARELLE.

005646261

